



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ALOPURINOL COMPRIMIDOS 100 mg

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

### **Composición y Presentación:**

Cada comprimido contiene:

Alopurinol 100 mg

Excipientes: Povidona, Glicolato Sódico de Almidón de Papa - Tipo A, Lauril Sulfato de Sodio, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Lactosa monohidrato, c.s.

Envase con 20 comprimidos.

Envase Clínico

### **Clasificación:**

Inhibidor de la xantina oxidasa.

### **Indicación:**

Tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia. Reducción de las manifestaciones clínicas producidas por deposición de ácido úrico/uratos. Profilaxis de litiasis renal por oxalato/fosfato de calcio en pacientes con hiperuricemia y/o hiperuricosuria.

### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Alopurinol es usado para prevenir ataques de gota y no alivia el ataque cuando éste ya ha comenzado.
- La terapia con Alopurinol puede producir letargo, por lo que puede disminuir la habilidad para realizar actividades que requieran de alerta mental.
- La terapia con Alopurinol debe ser suspendida a la primera aparición de rash o algún signo de reacción de hipersensibilidad, ya que una reacción de hipersensibilidad puede ser fatal.
- Administrar con precaución en pacientes con daño renal.

### **Contraindicaciones:**

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Pacientes con hipersensibilidad al Alopurinol o alguno de los componentes de la formulación.
- Embarazo y lactancia.

**Presencia de otras Enfermedades:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: enfermedad cardíaca congestiva, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal.

**Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: Azatioprina, Mercaptopurina, anticoagulantes, Vitamina C, Ciclofosfamida, diuréticos, Pirazinamida, Alcohol.

**Efectos Adversos (no deseados):**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: dificultad para respirar, manos y pies fríos, acortamiento de la respiración, rash, prurito, urticaria, picazón, fiebre, náuseas o vómitos especialmente si ocurre después de rash, heces negras, sangre en heces u orina, úlcera en la boca.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: diarrea, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas o vómitos sin rash, indigestión.

**Forma de Administración:**

Vía oral, usualmente en una dosis única diaria y preferentemente después de las comidas.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 100 mg inicialmente al día, la que puede ser gradualmente aumentada por su Médico.

**Sobredosis:**

Conducir al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.