



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 5 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y Presentación:

Cada comprimido contiene:

Glibenclamida 5 mg

Excipientes: Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Talco, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de Silicio Coloidal, Celulosa Microcristalina, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, c.s.

Envase con 30 y 60 comprimidos.

Clasificación:

Hipoglicemiante oral.

Indicación:

Diabetes Mellitus del adulto, que no puede controlarse sólo con dieta.

Advertencias y Precauciones:

- La administración de Glibenclamida se asocia con una dieta y ejercicios planificados, por lo que un cambio importante en estos parámetros debe ser notificado al Médico.
- Ud. se debe realizar controles periódicos de glicemia.
- Ud. debe solicitar a su Médico que lo instruya en como reconocer los síntomas de hipoglicemia e hiperglicemia.
- Evite la exposición al sol mientras tome este medicamento, ya que la piel estará más sensible a la luz solar.
- Administrar con precaución en pacientes ancianos, con enfermedad renal, hepática o cardíaca, fiebre alta, diarrea continua, insuficiencia suprarrenal, hipo o hipertiroidismo no controlados apropiadamente.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Acidosis, cetoacidosis, quemaduras severas, coma diabético, infección severa.
- Alergia a Glibenclamida, otras sulfonilureas, sulfas o diuréticos tiazídicos.
- Diabetes juvenil o insulino dependiente.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico o Farmacéutico si está tomando otros medicamentos, especialmente si se trata de: corticoides, anticoagulantes, Ranitidina, Aspirina, salicilatos, Ciclosporina, bloqueadores β -adrenérgicos, Cloranfenicol, inhibidores de la MAO, Litio. Ud. no debe ingerir Alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: convulsiones, inconciencia, ansiedad, escalofríos, confusión, visión borrosa, piel pálida y fría, alucinaciones, rash, taquicardia.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: cambios en el sentido del gusto, constipación, diarrea, somnolencia, mareos, mayor frecuencia o cantidad de orina, aumento o pérdida de apetito, náuseas, dolor de cabeza, irritación gástrica, mayor sensibilidad de la piel al sol.

Forma de Administración:

Vía Oral.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es al inicio de la terapia 2.5 a 5 mg. Al día junto con el desayuno o la primera comida del día, se recomienda entonces aumentar la dosis en intervalos de 2.5 mg. A intervalos semanales dependiendo de la respuesta del paciente, la dosis máxima recomendada es de 20 mg. Al día.

Sobredosis:

En caso de intoxicación, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.