



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ISTEFRAL® CÁPSULAS 50 mg SULPIRIDA

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y Presentación:

Istefral cápsulas 50 mg

Cada cápsula contiene:

Sulpirida 50 mg

Excipientes: Almidón de Maíz, Croscarmelosa Sódica, Lauril Sulfato de Sodio, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, Gelatina, Colorante FD&C Amarillo N° 5, Colorante FD&C Azul N° 1, Dióxido de Titanio, c.s.

Envase con 2 y 30 Cápsulas.

Clasificación:

Antipsicótico, antidepressivo.

Indicación:

Estados ansioso-depresivos y depresivo-reactivos; depresión del anciano; colopatía funcional; cefalea psicógena.

Advertencias y Precauciones:

Se debe tener precaución en pacientes con:

- Enfermedad cardiovascular, manía o hipomaníacos (pueden aumentar los síntomas).
- Insuficiencia Renal (disminuye la dosis).
- Epilepsia, Hipertiroidismo, enfermedad pulmonar, retención urinaria, hipersensibilidad previa a otro derivado benzamínico (Metoclopramida, Tiapiride o Sulfopiride).
- Pacientes ancianos (aumenta el riesgo de efectos adversos).
- Produce sedación y alteración en la vigilia.
- Precaución en la conducción y uso de máquinas.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad a Sulpirida.
- Pacientes con Feocromocitoma.
- Pacientes con Enfermedad de Parkinson.
- Embarazo y lactancia.
- Hipertensión.
- Cuadros maniacos.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, especialmente si se trata de: Antiácidos (disminuye la absorción de Sulpirida), Sucralfato (disminuye la absorción de Sulpirida). No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: enfermedad cardiovascular, manía o hipomaniacos, insuficiencia renal, epilepsia, hipertiroidismo, enfermedad pulmonar o con retención urinaria.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: palpitaciones, sedación, adormecimiento, mareos, depresión, disturbios en el sueño, dolor de cabeza, inquietud, distonias agudas y tardías, galactorrea, xerostomía, náuseas, vómitos, constipación, anorexia, desórdenes menstruales, visión borrosa, entre otros.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a propiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

Manejo de la esquizofrenia: 200-400 mg dos veces al día, la cual según la respuesta del paciente puede ser aumentada a un máximo de 1.2g Diarios. Se recomienda tomar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.