



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE TRELIBEC® FORTE COMPRIMIDOS

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

Composición y Presentación:

Trelibec® Forte Comprimidos:

Cada comprimido contiene:

Sulfametoxazol 800 mg

Trimetoprima 160 mg

Excipientes: Almidón de Maíz, Lauril Sulfato de Sodio, Croscarmelosa Sódica, Estearato deMagnesio, Celulosa Microcristalina, c.s.

Clasificación:

Envase con 20 comprimidos.

Bactericida.

Indicación:

Tratamiento de infecciones urinarias, gastrointestinales, otitis media aguda e infecciones del tractorespiratorio superior producidas por organismos susceptibles.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Usar con precaución en pacientes con daño renal o hepático, asma bronquial, deficiencia defolato, discracias sanguíneas, ancianos.
- Es importante administrar Trelibec® por el tiempo completo de tratamiento prescrito. Trelibec® puede aumentar la sensibilidad de la piel a los rayos solares.
- No debe ser usado en neonatos ni niños menores de 2 años.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo y lactancia.
- Alergia a Sulfametoxazol, otra Sulfonamida, Trimetoprima, o a cualquier componente de la formulación.

- Pacientes con enfermedad hepática o renal severa, con deficiencia de glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos(interacciones). Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de: Fenitoína, Ácido Valproico, Metotrexato, Metildopa, Rifampicina, antidiabéticos orales, anticoagulantes orales, Fenotiazinas. No olvidemencionar que esta tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otrasrazones, o en caso que se someta a algún examen.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: prurito, urticaria, dermatitis, rash cutáneo, hinchazón de la cara o boca, problemas para respirar, dolor al pecho, fiebre, insomnio.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de apetito, fotosensibilidad.

Forma de Administración:

Via oral.

Dosis:El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular.No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 1 comprimido 2 veces al día.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria, conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.