

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDOS 100 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición:

Cada comprimido de Ácido Acetilsalicílico Comprimidos 100 mg contiene:

Ácido Acetilsalicílico 100 mg

Excipientes c.s. Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz, Esencia de Vainilla Polvo, Esencia de Frutilla Polvo, Sucralosa, Celulosa Microcristalina.

Clasificación:

Antiangregante Plaquetario.

Indicaciones:

Para reducir el riesgo de mortalidad en pacientes con sospecha de infarto de miocardio agudo, para reducir el riesgo de morbilidad en pacientes con infarto al miocardio.

Para la prevención secundaria del accidente cerebrovascular.

Para reducir el riesgo de ataques isquémicos transitorios (TIA) y accidente cerebrovascular en pacientes con TIA.

Para reducir el riesgo de morbilidad y muerte en pacientes con angina pectoris estable e inestable.

Para prevención del tromboembolismo después de cirugía o intervenciones vasculares, vale decir, PTCA, CABG, endarterectomía de carótida, shunts arteriovenosos.

Para profilaxis de trombosis de vena profunda y embolismo pulmonar después de inmovilización prolongada, por ejemplo después de cirugía mayor.

Para reducir el riesgo de primer infarto de miocardio en personas con factores de riesgo cardiovascular por ejemplo, diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipertensión, obesidad, tabaquismo, edad avanzada.

Advertencias y Precauciones:

• Usted debe consultar a su médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca).

• Ácido Acetilsalicílico aumenta el riesgo de ulceración gastrointestinal durante el período de embarazo. Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

• Usar con precaución en la lactancia.

• Suspender el Ácido Acetilsalicílico al menos 1 semana antes de una intervención quirúrgica.

Contraindicaciones:

Pacientes con hipersensibilidad a los salicilatos.

No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

Interacciones:

Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Anticoagulantes orales como la Warfarina, Heparina, Clorpropamida, Tolbutamida, Penicilinas y Cefalosporinas, Ácido Valproico, Agentes uricosúricos, Metotrexato, Fenitoína, Espironolactona, Alcohol.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al médico o farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: Anemia, Enfermedad renal o hepática, Gota, Asma, Hipertensión.

Efectos adversos: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre: Hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, acidez estomacal, erupciones en la piel, zumbido de oídos, dolor de cabeza continuo o severo. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: malestar gástrico, náuseas.

Dosis:

El médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es un comprimido al día.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un centro de atención médica hospitalario.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940,
Independencia, Santiago - Chile.

V1/550156 / 23.11.20

midab