



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ACIFIN® COMPRIMIDOS MASTICABLES

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y Presentación:

Cada comprimido masticable contiene:

Magaldrato 480 mg

Simeticona 100 mg

Excipientes: Sucralosa, Povidona, Esencia Polvo de Tutti Frutti, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, Sorbitol.

Clasificación:

Antiácido, Antiflatulento.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

¿Para qué se usa?

Acifin está indicado para aliviar temporalmente los síntomas de la acidez, y malestar estomacal. Acifin contiene Magaldrate, el cual es un antiácido y Simeticona, sustancia encargada de la absorción de los gases generados durante la digestión, causantes del malestar.

Modo de Uso:

Se recomienda tomar 1 ó 2 comprimidos masticables luego de las comidas. Y puede también tomarlo en la noche antes de dormir.

Precauciones y Advertencias:

Si al cabo de algunos días los síntomas de la acidez y malestar estomacales continúan, Ud. debe consultar a su Médico.

Junto con el uso de Acifin Ud. debe evitar ingerir alimentos que aumenten la formación de gas, como repollo, granos, legumbres, bebidas gaseosas, etc. Se recomienda usar con precauciones en personas de la tercera edad pues son más susceptibles a experimentar reacciones adversas a los medicamentos, pueden presentar constipación o problemas intestinales, por lo que deben seguir indicaciones de su Médico, durante el uso de este medicamento.

No debe ser utilizado, por periodos prolongados.

No exceder 15 días.

Precaución en pacientes con osteoporosis.

No ingerir más de 10 comprimidos al día.

Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos: En caso de Hipersensibilidad a Simeticona, Magaldrato o alguno de los componentes de la fórmula. En caso de Insuficiencia Renal Grave.

Interacciones:

Usted debe informar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. Este medicamento altera la absorción de otros medicamentos, se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: vitamina D, digoxina, isoniazida, ketoconazol, penicilamina, nitrofurantoina, quinidina, tetraciclina, ciprofloxacino.

Efectos adversos:

El uso de Acifin puede producir rara vez algunos efectos no deseados, pero son severos. Si Ud. presentase alguno de los siguientes síntomas debe acudir al Médico: síntomas de hipersensibilidad como dificultad para respirar, rash, urticaria, inflamación de ojos, boca, lengua, dolor de huesos, constipación, pérdida del apetito, debilidad muscular, cambios de carácter, pérdida de peso inusual, dificultad para orinar, ritmo irregular del corazón.

Embarazo y Lactancia:

Debe consultar con su Médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada. Este medicamento pasa a la leche materna, sin embargo, no se ha observado que su uso durante la lactancia cause daño en el niño.

Uso en Niños y Ancianos:

Debe utilizar con precaución en ancianos ya que éstos pueden ser más proclives a experimentar efectos adversos. No utilizar en ancianos que padezcan de osteoporosis. A menos que su Pediatra lo indique, Ud. no se debe usar antiácidos en niños menores de 6 años. No se recomienda su uso para el tratamiento de cólicos.

Sobredosis:

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos como dificultad para respirar, rash, urticaria, inflamación de ojos, boca, lengua, diarrea, náuseas, vómitos, constipación, confusión, palpitaciones, debilidad, fatiga, dolor de huesos, estupor. Debe recurrir a un Centro Asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el medicamento o el envase de éste que se ha tomado. Sólo es recomendado el tratamiento sintomático de la intoxicación.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**SI LOS SÍNTOMAS NO CEDEN EN LOS DÍAS MENCIONADOS, CONSULTE AL MÉDICO.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO SE AUTOMEDIQUE. NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**