



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ADESNA® COMPRIMIDOS 500 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada comprimido contiene:

Ácido Mefenámico 500 mg

Excipientes: Lauril Sulfato de Sodio, Glicolato Sódico de Almidón de Papa - Tipo A, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Dióxido de Titanio, Dióxido de Silicio Coloidal, Povidona, Lactosa monohidrato, c.s.

Envase con 2 y 10 comprimidos.

Clasificación:

Agente antiinflamatorio no esteroidal.

Indicación:

Dolores leves a moderados de variada etiología.

Alivio sintomático de la dismenorrea primaria y en el dolor post-inserción de DIU.

Advertencias:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar en niños menores de 14 años.
- Usar con precaución en pacientes con enfermedad gastrointestinal.
- Usted debe consultar a su Médico antes de usar este medicamento (AINes) (con excepción del Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca).
- Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

Contraindicaciones:

No usar en:

- Casos de hipersensibilidad a la droga o que han sufrido reacciones de hipersensibilidad a aspirina u otros agentes antiinflamatorios no esteroideos.
- Pacientes con úlcera activa o con inflamación crónica del tracto gastrointestinal alto o bajo.
- En embarazo y lactancia.
- No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, especialmente: anticoagulantes y agentes trombolíticos (aumenta el efecto hipotrombinémico de warfarina), litio (disminuye el clearance renal de litio), corticosteroides (se potencian los efectos gastrointestinales adversos).

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: Diarrea, náuseas, dolor abdominal, anorexia, pirosis, flatulencia, constipación, y úlcera péptica con o sin sangramiento, somnolencia, vértigo, dolor de cabeza, insomnio, visión borrosa, irritación ocular, dolor de oídos, rash, urticaria, palpitaciones, edema facial, disnea y pancreatitis aguda. coronario.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular no obstante, la dosis usual recomendada es:

• Dolor:

Para el alivio del dolor agudo y moderado severo en adultos y niños mayores de 14 años es de 500 mg, seguido de 250mg cada 6 horas, si es necesario. Para el alivio del dolor agudo la terapia no debe extenderse por más de una semana.

• Dismenorrea:

La terapia con Ácido Mefenámico en el tratamiento de las dismenorrea primaria debe comenzarse con el inicio del sangramiento y los síntomas asociados. La terapia no debería ser necesaria por más de 2-3 días. La dosis inicial usual es de 500 mg, seguida de 250 mg cada 6 horas.

Sobredosis:

En caso de ingestión accidental el estómago debe ser vaciado inmediatamente por inducción de emesis lavado gástrico, seguido de la administración de carbón activado. Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médico Hospitalario.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.