



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

ALPRAZOLAM COMPRIMIDOS 0,5 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada comprimido contiene:

Alprazolam 0,5 mg

Excipientes: Almidón de Maiz, Glicolato Sódico de Almidón de Papa - Tipo A, Celulosa Microcristalina, Colorante FD&C Azul N°2-Laca, Estearato de Magnesio, Lauril Sulfato de Sodio, Talco, Lactosa Monohidrato, c.s.

Envase con 30 comprimidos.

Envase clínico.

Clasificación:

Tranquilizante, ansiolítico

Indicación:

Tratamiento de ansiedad, ataques de Pánico y crisis de angustia

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- La administración de Alprazolam por tiempo prolongado o en altas dosis puede causar dependencia física o mental.
- La suspensión de la terapia debe realizarse en forma gradual
- Alprazolam puede afectar su capacidad para realizar actividades que requieran de alerta mental o coordinación física.
- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia pulmonar crónica o apnea del sueño.

Contraindicaciones:

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, ud no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia
- Alergia a Alprazolam, otra benzodiazepina o cualquier componente de la formulación.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que ud. debe informar a su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de depresores del sistema nervioso central, Disulfiram, cimetidina, Ketoconazol, Digoxina, Nefazodona. Ud. no debe ingerir alcohol mientras tome este medicamento.

No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: enfermedades o depresión mental, enfisema, asma, bronquitis u otra enfermedad pulmonar crónica, apnea del sueño, epilepsia, glaucoma, enfermedad renal o hepática, miastenia gravis, porfiria, abuso o dependencia de alcohol o drogas.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.

Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre: Ansiedad, confusión, pérdida de memoria, depresión mental, latidos cardiacos irregulares, agitación, convulsiones, conductas anormales, alucinaciones, rash.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean molestos o se prolonguen en el tiempo: Torpeza, somnolencia, fatiga, dolor o calambres abdominales, mareos, visión borrosa, cambio en el deseo sexual, náuseas, dolor de cabeza, irritación gástrica.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El medico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular no obstante la dosis usual recomendada es: Ansiedad: 0,25 - 0,5 mg 3 veces al día, hasta un máximo de 4 mg diarios administrados en dosis divididas. En adultos mayores la dosis recomendada es 0,25 mg 3 veces al día la que puede ser aumentada si su médico así lo indica. En el caso de crisis de pánico las dosis van desde los 0,5 -1,0 mg 3 veces al día hasta un máximo de 10 mg diarios.

Sobredosis:

Conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.