



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE AMOXICILINA

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación: Amoxicilina Cápsulas 500 mg

Cada cápsula contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato) 500 mg

Excipientes: Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Estearato de Magnesio, Colorante FD&C Amarillo N° 6, Colorante FD&C Rojo N° 40, Dióxido de Titanio, Lactosa Monohidrato c.s.

Amoxicilina Comprimidos 750 mg

Cada comprimido contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato) 750 mg

Excipientes: Dióxido de Silicio Coloidal, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina c.s.

Amoxicilina Polvo para Suspensión Oral 250 mg/5 mL

Cada 5mL de suspensión preparada contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato) 250 mg

Excipientes: Benzoato de Sodio, Goma Xantano, Esencia Tutti Frutti, Dióxido de Silicio Coloidal, Colorante FD&C Rojo N° 40, Aspartamo, Sacarosa c.s.

Amoxicilina Polvo para Suspensión Oral 500 mg/5 mL

Cada 5mL de suspensión preparada contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato) 500 mg

Excipientes: Benzoato de Sodio, Goma Xantano, Esencia Tutti Frutti, Dióxido de Silicio Coloidal, Colorante FD&C Rojo N° 40, Aspartamo, Sacarosa c.s.

Amoxicilina 500 mg: Envase con 21 y 6 Cápsulas

Amoxicilina 750 mg: Envase con 10 comprimidos

Amoxicilina Suspensión oral 500 y 250 mg: Envase con 60 mL

Envase Clínico

Clasificación:

Antibiótico, derivado de Penicilina.

Indicación:

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, piel y tejidos blandos, otitis media y tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

Advertencias y Precauciones

Usese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Si Ud. toma anticonceptivos orales, se recomienda un método adicional de control de embarazo, mientras esté en tratamiento con Amoxicilina.
- Es importante administrar Amoxicilina por el tiempo completo de tratamiento prescrito.
- Su uso en embarazo y lactancia debe ser bajo estricto control médico.
- El tratamiento con Amoxicilina altera la flora normal y puede ocurrir un sobrecrecimiento de organismos no susceptibles, incluyendo hongos.
- Todas las presentaciones de Amoxicilina Polvo para Suspensión Oral contienen Aspartamo, precaución en pacientes fenilcetonúricos.

Contraindicaciones:

No usar en:

- Alergia a Amoxicilina u a otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación.
- Pacientes con mononucleosis.

Interacciones:

- El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de: aminoglicósidos, anticonceptivos orales, Metotrexato, Probenecid, Alopurinol.
- No olvide mencionar que esta tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: alergia, enfermedad cardíaca congestiva, enfermedad renal o hepática, enfermedad gastrointestinal, mononucleosis.

Efectos adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: rash cutáneo, prurito, diarrea severa, fiebre, respiración agitada o irregular, dolor o calambres abdominales, convulsiones, náuseas y vómitos severos. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, diarrea suave, náuseas, vómitos.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: en adultos es de 500 ó 750 mg cada 8 horas y en niños sobre 3 meses, la dosis se basa en el peso corporal del paciente y es de 20 a 40 mg por kg de peso al día, repartido en 3 dosis. En niños menores de 3 meses, la dosis sólo debe ser indicada por el médico.

Sobredosis: Conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.

Amoxicilina Comprimidos 750 mg, Amoxicilina Polvo para Suspensión Oral 250 mg/5mL y Amoxicilina Polvo para Suspensión Oral 500 mg/5mL almacenar a no más de 25°C. Amoxicilina Cápsulas 500 mg almacenar a no más de 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.