



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE BUCOGERM® TOS COMPRIMIDOS MASTICABLES

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido masticable contiene:

Clorhexidina Diclorhidrato 5 mg

Noscapina 10 mg

Excipientes: Aspartamo, Ciclamato de Sodio, Esencia de Menta, Esencia de Limón, Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Sorbitol Cristalino Granular, Celulosa Microcristalina, Lactosa Monohidrato.

Clasificación:

Antitusivo. Antiséptico bucofaringeo.

Indicación:

Coadyuvante en el tratamiento sintomático de las molestias producidas por infecciones bucofaringeas, asociadas a tos irritativa no productiva.

Advertencias y Precauciones:

- Bucogerm® Tos sólo alivia la sintomatología en casos de amigdalitis o faringitis estreptocócica, el microorganismo debe ser erradicado en este caso mediante un tratamiento con antibióticos adecuados.
- Se recomienda no ingerir líquidos o alimentos inmediatamente después de la administración de Bucogerm® Tos.
- Usar con precaución en pacientes con problemas en las encías, como por ejemplo periodontitis.
- Bucogerm® Tos puede manchar los empastes dentales, incluso en forma definitiva, debido a la Clorhexidina de su composición.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Pacientes hipersensibles a Clorhexidina Diclorhidrato, Noscapina o a algún componente de la formulación.
- Embarazo y Lactancia.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que ésta tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente: depresores del Sistema Nervioso Central, ud. no debe beber Alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento.

Reacciones Adversas:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si ocurre: Cualquier signo de reacción alérgica (congestión nasal, problemas para respirar, rash cutáneo, urticaria, picazón, hinchazón de la cara).

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: alteración de la percepción del gusto, irritación bucal, somnolencia.

Forma de administración:

Bucogerm® Tos se administra por vía oral. Se recomienda disolver lentamente el comprimido en la boca.

Dosis:

La dosis usual en adultos es de 1 a 2 comprimidos 4 a 6 veces al día.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener fuera el alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**