



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE BUTON ADULTOS COMPRIMIDOS®

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

Composición y Presentación:

Cada comprimido contiene:

Atropina Sulfato Monohidrato 0,5 mg

Papaverina Clorhidrato 40 mg

Excipientes: Celulosa Microcristalina, Dióxido de Silicio Coloidal, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, c.s.

Envase con 10, 20 y 100 comprimidos.

Clasificación:

Atropina Sulfato Monohidrato es un agente antimuscarínico y Papaverina Clorhidrato es un alcaloide con efecto antiespasmódico.

Indicación:

Tratamiento sintomático de los espasmos intestinales o renales, dismenorrea y salivación o sudoración excesiva.

Advertencia:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Administrar con precaución en pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, colitis ulcerosa, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática o renal, con precaución en pacientes menores de 6 años, hipertensos o senescentes.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad a Atropina Sulfato Monohidrato, Papaverina Clorhidrato o a cualquier componente de la formulación.
- Embarazo y Lactancia.
- Pacientes con obstrucción orgánica del tubo digestivo, dolor intestinal de etiología incierta, hipertrofia prostática, glaucoma de ángulo estrecho, miastenia gravis, colitis ulcerativa.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: Amantadina, Kaolin, Atapulgita, Antiparkinsonianos, antiácidos, Levodopa, antidepresivos tricíclicos, Procainamida, Quinidina. Ud. no debe ingerir Alcohol mientras toma este medicamento.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: glaucoma, sangramiento, fiebre, estenosis pilórica, colitis, angina, insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad hepática o renal.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: confusión, visión borrosa, taquicardia, palpitaciones, rash, urticaria, hipotensión o aumento de la presión sanguínea.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: constipación, sequedad de la boca, nariz o garganta, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, mareos.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado para su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 1 comprimido 3 ó 4 veces al día.

Sobredosis:

Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.