



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 125 MG

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

### **Composición y Presentación:**

Cada comprimido recubierto contiene:

Clonixinato de Lisina 125 mg

Excipientes: Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Lauril Sulfato de Sodio, Polividona K-30, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Hipromelosa, Dióxido de Titanio, Polisorbato 80, Macrogol, c.s.

Envase con 10 comprimidos recubiertos

Envase clínico

### **Clasificación:**

Analgésico no esteroidal.

### **Indicación:**

Tratamiento sintomático del dolor leve a moderado.

### **Advertencias y Precauciones:**

- Administrar con precaución en pacientes con úlcera gástrica o duodenal.
- Administrar con precaución en pacientes con enfermedades hepáticas, renales o cardiovasculares.
- Usted debe consultar a su médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca).
- Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

### **Contraindicaciones**

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Alergia a Clonixinato de Lisina u otro analgésico no esteroidal o a cualquier componente de la formulación.
- No debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

### **Interacciones**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe comunicar al Farmacéutico si está tomando otros medicamentos, especialmente si se trata de: Analgésicos no esteroideos, Metotrexato, corticoides. Ud. no debe ingerir alcohol durante el tratamiento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

### **Efectos Adversos (no deseados):**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.

Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre: depresión, excitación, rash, prurito, enrojecimiento de la piel.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: mareos, pirosis, irritación gástrica, somnolencia, sudoración, escalofríos.

### **Forma de Administración:**

Vía oral.

### **Dosis**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 125 a 250 mg tres veces al día según intensidad del dolor.

### **Sobredosis**

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un centro de Atención Médica.

### **Condiciones de Almacenamiento**

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz, humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

### **NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.