



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CLOXACILINA CÁPSULAS 500 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada cápsula contiene:

Cloxacilina (como Sal Sódica Monohidrato) 500 mg

Excipientes: Estearato de Magnesio, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz Tipo A, Lactosa Monohidrato, Colorante FD&C Rojo N° 40, Colorante FD&C Azul N° 1, Dióxido de Titanio.

Envase con 6 y 12 cápsulas.

Envase Clínico.

Clasificación:

Antibiótico.

Indicación: Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la cloxacilina, incluyendo neumoniaestafilocócica, sinusitis, infecciones de la piel y tejidos blandos producidas por estreptococo betahemolítico del grupo A, Neumococos y estafilococos resistentes a bencilpenicilina; osteomielitisestafilocócica; profilaxis de endocarditis bacteriana.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Es importante administrar Cloxacilina por el tiempo completo de tratamiento prescrito.
- Su uso en embarazo y lactancia debe ser bajo estricto control médico.
- El tratamiento con Cloxacilina altera la flora normal y puede ocurrir un sobrecrecimiento de organismos no susceptibles, incluyendo hongos.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Alergia a Cloxacilina otra Penicilina o Cefalosporina, o algunos de los componentes de la formulación.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de: Aminoglicósidos, Metotrexato, Probenecid, Alopurinol, anticoagulantes, anticonceptivos orales, Paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos.

No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: alergia, sangramiento, enfermedad cardíaca congestiva, enfermedad renal o hepática, antecedentes de enfermedad gastrointestinal.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: rash cutáneo, diarrea severa, fiebre, respiración agitada, dermatitis, dolor o calambres abdominales, convulsiones, náuseas y vómitos severos.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, diarrea suave, náuseas, vómitos.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 500 mg cada 6 horas.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.