



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE DOCIVIN® CÁPSULAS 10 mg DOMPERIDONA

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada cápsula contiene:

Domperidona 10 mg

Excipientes: Talco, Croscarmelosa Sódica, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, Colorante FD&CAzul N° 1, Colorante FD&C Amarillo N° 5, Dióxido de Titanio, Gelatina.

Clasificación:

Antiemético.

Indicaciones:

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos, sensación de ardor en el estómago.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

• Debe administrarse con precaución en pacientes con daño hepático.

• La administración a lactantes debe ser cuidadosamente supervisada por el Médico, debido a la mayor probabilidad de efectos tóxicos centrales, por la inmadurez de la barrera hematoencefálica.

• Domperidona puede inducir un incremento en los niveles plasmáticos de prolactina. En raros casos, esta hiperprolactinemia puede aumentar el riesgo de manifestaciones neuroendocrinológicas como galactorrea y ginecomastia.

Evaluar los antecedentes cardíacos de los pacientes antes de prescribir Domperidona, particularmente si existen antecedentes de prolongación de intervalos de la conducción cardíaca en especial QTc (intervalos QT corregido), trastornos electrolíticos significativos, o enfermedad cardíaca subyacentes, como insuficiencia cardíaca congestiva. Se debe tener precaución al utilizar Domperidona en conjunto con medicamentos que prolonguen el intervalo QT, especialmente en los mismos pacientes descritos en el punto anterior. Iniciar los tratamientos con Domperidona a la menor dosis posible, tanto en adultos como en niños. Se debe tener especial cuidado con el uso de Domperidona en pacientes de edad avanzada o en aquellos que utilicen dosis altas de este medicamento (>30 mg al día). A los pacientes que estén usando Domperidona, se les recomienda consultar a su médico inmediatamente si presentan signos o síntomas de frecuencia cardíaca o ritmo anormal, los que incluyen mareos, palpitaciones, síncope (desmayos) o convulsiones.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:

- Hipersensibilidad a Domperidona.
- Embarazo y lactancia.
- Cuando la estimulación de la motilidad gástrica puede ser peligrosa, por ejemplo en presencia de hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación.
- Pacientes con tumores hipofisiarios liberadores de prolactina.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe informar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: anticolinérgicos, antiácidos, analgésicos opioides, agentes antimuscarínicos, Cimetidina.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud. debe comunicar a su Médico si padece de alguna enfermedad, especialmente: enfermedad hepática o renal, daño en la barrera hematoencefálica, tumores de la hipófisis.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Los siguientes efectos no deseados se pueden presentar en raras ocasiones y requieren atención médica en forma inmediata: rash cutáneo, urticaria. Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su Médico entre estos: cólicos intestinales, manifestaciones extrapiramidales. Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el Médico.

Forma de Administración:

Vía oral. Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la recomendada.

Dosis: La dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 10 mg tres a cuatro veces al día.

Sobredosis: Podrían presentarse los siguientes síntomas: somnolencia, desorientación y síntomas extrapiramidales, principalmente en niños, entre otros. En caso de una sobredosis, o si sospecha de ella, debe trasladar inmediatamente al paciente a un Centro Asistencial y muestre el envase al Médico de turno.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**SI LOS SINTOMAS PERSISTEN COMUNÍQUELO A SU MÉDICO.
NO SE AUTOMEDIQUE.**