



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE FACIMIN® SOLUCIÓN NASAL 0,5 mg/mL

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada 100 mL de solución nasal contiene:

Oximetazolina Clorhidrato 50 mg

Excipientes: Metilparabeno, Fosfato Monobásico de Sodio Dihidrato, Fosfato Dibásico de Sodio Dodecahidrato, Agua Purificada, c.s.

Envase con 5 mL y 10 mL de solución nasal.

Clasificación:

Vasoconstrictor Adrenérgico.

Indicación:

Alivio temporal de la congestión nasal debido al resfriado común, fiebre del heno, sinusitis y algunas alergias de las vías respiratorias.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Su uso prolongado o repetido puede producir irritación en la mucosa nasal, especialmente en niños, produciendo efectos adversos sistémicos.
- La sobredosificación o ingestión casual en niños puede producir depresión profunda en el Sistema Nervioso Central, shock de hipotensión y coma.
- Para evitar la contaminación del dispositivo, limpie con un algodón húmedo antes y después de cada uso.
- No comparta este medicamento con otra persona.

Contraindicaciones:

No usar en pacientes que padecen de:

- Hipertiroidismo.
- Enfermedades cardíacas (incluido angina).
- Hipertensión
- Arterioesclerosis
- Diabetes Mellitus
- Inflamación de la próstata (aumenta la dificultad para orinar).

- Glaucoma.
- Sensibilidad a la droga o a algunos de los componentes de la formulación.
- Conocida sensibilidad a las drogas adrenérgicas.

Uso en Embarazo y Lactancia:

Su seguridad durante el embarazo no ha sido establecida.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, especialmente: antidepresivos tricíclicos, Maprolina o Inhibidores Monoamino Oxidasa.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: hipertiroidismo, enfermedad cardiaca, hipertensión, arterioesclerosis, Diabetes Mellitus, inflamación de la próstata, glaucoma.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: visión borrosa, hipertensión, nerviosismo, náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, temblores, dificultad al dormir, debilidad, palpitaciones o bradicardia refleja. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: sensación de ardor, picazón, sequedad de la mucosa nasal y estornudos.

Forma de Administración:

Vía tópica.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: para adultos y niños mayores de 6 años es 1 ó 2 aplicaciones en cada fosa nasal en la mañana y en la noche.

Úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de su Médico, no use más, con mayor frecuencia o por tiempo más prolongado que lo que se le indica.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener lejos del alcance los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITTA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.