



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE GENIOL® COMPRIMIDOS 500 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada comprimido contiene:

Paracetamol 500 mg

Excipientes: Croscamelosa Sódica, Dióxido Silicio Coloidal, Almidón de Maíz Pregelatinizado, Povidona k-30, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, c.s.

Envase con 20 comprimidos.

Envase clínico

Clasificación:

Analgésico - Antipirético.

Indicación:

Tratamiento sintomático de la gripe y el resfrío, dolores de cabeza, musculares, dentales y lumbago. Indicado especialmente en personas con intolerancia al Ácido Acetilsalicílico, molestias gástricas y tendencia al sangramiento.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- No administrar por más de 5 días en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre, o por más de 2 días en caso de dolor de garganta, sin consultar al Médico.
- El uso prolongado y de altas dosis de Paracetamol puede provocar severo daño hepático.
- Existen muchos medicamentos que contienen Paracetamol en su fórmula. Si Ud. está tomando o administrando otros medicamentos debe verificar que ellos no contengan Paracetamol antes de administrar este producto, para evitar una sobredosificación.
- En caso de efectuarse un examen de azúcar en la sangre se debe mencionar que se está tomando Paracetamol, ya que puede inducir un falso resultado.
- No administrar a menores de 12 años sin consultar la dosis al Médico.
- Paracetamol es un medicamento que se encuentra solo o en combinación con otros principios activos en productos destinados al tratamiento de resfrío, tos, alergia, entre otros. Algunos de estos productos pueden venderse libremente y otros requieren receta médica.
- Paracetamol puede causar, aunque con poca frecuencia, reacciones graves a la piel, que pueden manifestarse con enrojecimiento, erupción cutánea, ampollas, y daños en la superficie de la piel. Si usted desarrolla erupción cutánea u otra reacción a la piel mientras usa paracetamol, deje de tomarlo y acuda al médico inmediatamente.
- Si ya ha tenido reacciones a la piel con Paracetamol, no tome medicamentos que lo contengan.

• Paracetamol puede causar, en dosis superiores a las habituales, graves daños al hígado, que se pueden manifestar con síntomas como fatiga inusual, anorexia, náuseas y/o vómitos, dolor abdominal, ictericia (coloración amarilla de piel y/o de la zona blanca de los ojos), orina oscura, o deposiciones blanquecinas.

En caso de presentar alguno de estos síntomas, suspenda el uso del medicamento y acuda al médico.

• Es importante mantener este medicamento lejos del alcance de los niños y de personas con tendencias suicidas, y acudir por ayuda médica inmediatamente si se ha ingerido una cantidad significativamente superior a la habitual (el doble de la dosis diaria normal o más).

• Precaución: Producto potencialmente hepatotóxico, que puede además causar reacciones graves a la piel.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:

- Alcoholismo.
- Hepatitis, daño hepático o renal severo.
- Alergia al Paracetamol o a algún componente de la fórmula.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco.

- Puede producirse hipotermia severa (baja de la temperatura corporal) en pacientes bajo tratamiento con Fenotiazinas (un tipo de tranquilizantes) o antipiréticos (medicamentos para bajar la temperatura).
- El uso concomitante con alcohol puede producir daño hepático.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud. debe comunicar a su Médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: Alcoholismo, enfermedad severa al riñón, hepatitis u otra enfermedad hepática.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener, Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Deje de tomar el medicamento y consulte inmediatamente al Médico si presenta algunos de los síntomas siguientes: ojos o piel amarilla, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, deposiciones con sangre, dificultad para respirar, sudoración, orina coloreada o turbia, manchas o prurito en la piel.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: en adultos y niños mayores de 12 años 500 mg a 1g. 3 a 4 veces al día. No administrar más de 4 gramos diarios (8 comprimidos).

Sobredosis:

En caso de sospechar una ingestión involuntaria (se pueden producir vómitos, náuseas, dolor de estómago), conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.