



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

GENIOL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS 100 mg/mL

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico-Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada mL de solución contiene:

Paracetamol 100 mg

Excipientes: Macrogol 400, Glicerol, Propilenglicol, sucralosa, Colorante FD & C Rojo N° 40, Esencia frambuesa líquida, agua purificada, c.s

Clasificación:

Paracetamol es Analgésico y Antipirético.

Indicaciones:

Este medicamento se usa para tratar la fiebre y los dolores suaves a moderados.

Advertencias y Precauciones:

- No administrar a menores de 12 años sin consultar dosis al médico.
- No administrar por más de cinco días en caso de dolor, por más de tres días en caso de fiebre, o por más de dos días en caso de dolor de garganta, sin consultar al médico.
- El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol puede provocar severo daño hepático.
- Existen muchos medicamentos que contienen Paracetamol en su fórmula, si Ud. está tomando o administrando otros medicamentos debe verificar que ellos no contengan Paracetamol antes de administrar este producto, para evitar sobredosificación.
- En caso de efectuarse un examen de azúcar en la sangre se debe mencionar que se está tomando Geniol® ya que puede inducir un falso positivo.
- Paracetamol es un medicamento que se encuentra solo o en combinación con otros principios activos en productos destinados al tratamiento del resfrío, tos, alergia, entre otros. Algunos de estos productos pueden venderse libremente y otros requieren receta médica.
- Paracetamol puede causar; aunque con poca frecuencia, reacciones graves a la piel, que pueden manifestarse con enrojecimiento, erupción cutánea, ampollas, y daños en la superficie de la piel. Si usted desarrolla erupción cutánea u otra reacción a la piel mientras usa paracetamol, deje de tomarlo y acuda al médico inmediatamente.
- Si ya ha tenido reacciones a la piel con Paracetamol, no tome medicamentos que los contengan.
- Paracetamol puede causar, en dosis superiores a las habituales, graves daños al hígado, que se pueden manifestar con síntomas como fatiga inusual, anorexia, náuseas y/o vómitos, dolor abdominal, ictericia (coloración amarilla de la piel y/o de la zona blanca de los ojos), orina oscura, o deposiciones blanquecinas. En caso de presentar alguno de estos síntomas, suspenda el uso del medicamento y acuda al médico.

Es importante mantener este medicamento lejos del alcance de los niños y de personas con tendencias suicidas, y acudir por ayuda médica inmediatamente si se ha ingerido una cantidad significativamente superior a la habitual (el doble de la dosis diaria o más).

Contraindicaciones:

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:

- Alcoholismo
- Hepatitis, daño hepático o renal severo.
- Alergia al paracetamol o a algún componente de la fórmula.

Precaución: Producto potencialmente hepatotóxico, que puede además causar reacciones graves a la piel.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

- Puede producirse hipotermia severa (baja de la temperatura corporal) en pacientes bajo tratamiento con fenotiazinas (o tipo de tranquilizantes) o antipiréticos (medicamentos para bajar la temperatura).
- El uso concomitante con alcohol puede producir daño hepático.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud. debe comunicar a su Médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: Alcoholismo, enfermedad severa al riñón, hepatitis u otra enfermedad hepática.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Deje de tomar el medicamento y consulte inmediatamente al Médico si presenta algunos de los síntomas siguientes: ojos o piel amarilla, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, deposiciones con sangre, dificultad para respirar, sudoración, orina coloreada o turbia, manchas o prurito en la piel.

Forma de Administración:

Solución para gotas orales: 1 mL = 22+/-2 gotas. Tomar las gotas con un poco de líquido. No use más o con mayor frecuencia que la que su médico indique.

Posología:

Se debe consultar la dosis con el médico para niños menores de 12 años. Dosis usual es:

- Niños hasta 3 meses: 40 mg (9 gotas), cada 4-6 horas (máximo 200 mg/día).
 - De 4 a 12 meses: 80 mg (18 gotas), cada 4-6 horas (máximo 400 mg/día)
 - De 1 a 2 años: 120 mg (26 gotas), cada 4-6 horas (máximo 600 mg/día)
 - De 2 a 5 años: 160 mg cada 4-6 horas (máximo 750 mg/día)
 - De 6 a 8 años: 320 mg cada 4-6 horas (máximo 1.600 mg/día).
 - De 9 a 12 años: 320 mg a 480 mg, cada 4-6 horas (máximo 2,5 g/día).
 - Adultos y niños mayores de 12 años: 500 mg a 1 g, 3 a 4 veces al día. Máximo (4g) diarios.
- Las dosis en niños menores de 2 años deben ser consultadas al médico.

Sobredosis:

La intoxicación aguda (ingesta masiva del medicamento) se manifiesta a las pocas horas con vómitos, náuseas, falta de apetito y dolor estomacal. Signos de toxicidad hepática aparecen entre 2 a 4 días después (ictericia), pudiendo presentarse muerte entre 2 y 7 días.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**