



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE HASSAPIRIN®

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

• Cada comprimido contiene:

Ácido Acetilsalicílico 500,0 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz, Celulosa Microcristalina.

• Cada comprimido contiene:

Ácido Acetilsalicílico 100,0 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz, Esencia de Vainilla Polvo, Esencia de Frutilla Polvo, Celulosa Microcristalina, Sucralosa.

Clasificación:

Analgésico - antipirético - antiinflamatorio no esteroidal.

Indicaciones:

Este medicamento se usa como analgésico en el tratamiento del dolor leve a moderado asociado a inflamación y para reducir la fiebre.

Advertencias y Precauciones:

- Hassapirin® aumenta el riesgo de ulceración gastrointestinal durante el periodo de embarazo.
- Usar con precaución en lactancia.
- Suspender Hassapirin® al menos 1 semana antes de una intervención quirúrgica.
- Precaución en niños deshidratados por ser éstos preferentemente susceptibles a la intoxicación por salicilatos.
- Si tomando Hassapirin® el dolor continúa por más de 7 días en adultos o 5 días en niños, consulte al Médico.
- Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

Contraindicaciones:

- No administrar en adultos o niños con fiebre mayor a 39°C, que persista por más de 3 días.
- No usar en pacientes con hipersensibilidad a los salicilatos. No usar en niños con varicela o influenza debido al riesgo de la aparición del síndrome de Reye.
- No usar en pacientes con tendencias a hemorragias y úlceras.

Interacciones:

Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Anticoagulantes orales, Heparina, Clorpropamida, Tolbutamida, Penicilinas y Cefalosporinas, Ácido Valproico, Fenitoína, Agentes uricosúricos, Metotrexato, Espironolactona, Alcohol.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: Anemia, Enfermedad renal o hepática, Gota, Asma, Hipertensión.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: Hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, acidez estomacal, erupciones de la piel, zumbido de oídos, dolor de cabeza continuo o severo.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: malestar gástrico, náuseas.

Forma de administración:

Vía oral

Dosis:**Hassapirin® comprimidos 500 mg:**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 ó 2 comprimidos, 3 a 4 veces al día.

En reumatismo, de 6 a 12 y hasta 16 comprimidos en el día. (control médico).

Hassapirin® comprimidos 100 mg:

Niños lactantes según indicación médica.

Niños de 1 a 3 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Niños de 4 a 6 años: 2 comprimidos 3 veces al día.

Niños de 7 a 9 años: 3 comprimidos 3 veces al día.

Consultar la dosis al pediatra para niños menores de 12 años.

Modo de Empleo:

Hassapirin® comprimidos 500 mg: administrar con líquidos o comida.

Hassapirin® comprimidos 100 mg: masticar los comprimidos.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica Hospitalaria.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**