



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

HIDRALAZINA CLORHIDRATO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Hidralazina Clorhidrato 50 mg

Excipientes: Glicolato sódico de almidón de maíz - tipo A, Lactosa Monohidrato, Edetato Disódico, Povidona K-30, Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Hipromelosa, Dióxido de Titanio, Macrogol , Polisorbato 80 , Colorante FD&C Azul N°2 - Laca , Colorante FD&C Amarillo N°5 - Laca, Celulosa Microcristalina, c.s.

Envase con 20 comprimidos recubiertos.

Envase Clínico.

Clasificación: Antihipertensivo.

Indicación:

- Tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Este medicamento puede producir en algunos pacientes somnolencia, precaución al conducir o realizar trabajos que requieran gran alerta.
- Administrar con precaución en pacientes con enfermedad coronaria arterial.

Contraindicaciones:

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo y lactancia.
- Hipersensibilidad a Hidralazina, Aspirina, o a algún componente de la formulación.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente: diuréticos, inhibidores de la monoaminooxidasa, Indometacina, Propranolol, Vitaminas. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso de que se someta a algún examen.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: enfermedad renal, cardíaca o de los vasos sanguíneos, infarto.

Efectos adversos (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: ampollas en la piel, dolor en el pecho, dolor en los músculos o articulaciones, entumecimiento, hormigueo dolor o debilidad de manos o pies, fiebre, rash cutáneo, picazón, sensación general de desconfort o enfermedad. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: diarrea, latidos del corazón acelerados o irregulares, dolor de cabeza, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento.

Forma de Administración: Vía oral.**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: iniciar la terapia con una dosis de 10 mg 4 veces al día, luego de 2 a 4 días la dosis se puede aumentar a 25 mg 4 veces al día, posteriormente la dosis puede ser aumentada dentro de algunas semanas a 50 mg 4 veces al día.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.