Milab

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
LOPREN® - D COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

Composición y Presentación:
Cada comprimido recubierto contiene:
Losartán Potásico 50 mg
Hidroclorotiazida 12,5 mg
Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz Pregelatinizado, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Alcohol Polivinílico parcialmente hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco Venecia, Colorante FD&C Amarillo Nº 5 - Laca, Celulosa Microcristalina, c.s.

Envase con 30 comprimidos recubiertos.
Envase Clínico.

Clasificación: Antihipertensivo.

Indicación:
Tratamiento de la hipertensión arterial en aquellos pacientes que no responden adecuadamente a una monoterapia.

Advertencias y Precauciones:
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.
- Los primeros días de terapia el paciente puede sentirse mareado, aturdido, extenuado, debido a la disminución de la presión sanguínea. Si ocurre esto, debe consultar de inmediato al Médico. La dosis puede ser ajustada o discontinuada, y se debe monitorear la presión sanguínea del paciente mientras esté bajo tratamiento.
- Administrar con precaución en pacientes con enfermedad renal.
- Pueden ocurrir disturbios electrolíticos durante la terapia con este medicamento, por lo que los pacientes deben ser observados por signos de desbalance de electrolitos (Ver Reacciones Adversas). Se recomienda determinar la concentración de electrolitos séricos periódicamente durante la terapia con este medicamento, lo que es especialmente importante en pacientes diabéticos.
- Consulte a su médico / farmacéutico / enfermero, antes de empezar a tomar este producto; si ha tenido cáncer de piel o si le aparece una lesión de la piel inesperada durante el tratamiento.
- El tratamiento con hidroclorotiazida, en particular su uso a largo plazo a dosis altas puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel y labios (cáncer de piel no-melanoma).
- Proteja la piel de la exposición al sol y a los rayos UV mientras esté tomando este medicamento.

Contraindicaciones:
Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:
- Hipersensibilidad conocida a Losartán Potásico, Hidroclorotiazida, derivados de tiazidas o sulfas o a cualquier componente de la formulación.
- Enfermedad hepática o renal severas, con estenosis arterio renal, anuria.
- Embarazo y lactancia.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: antiinflamatorios no esteroidales, Ciclosporina, medicamentos ahorradores de potasio, glicósidos cardiacos, Probenecid, corticoesteroides, medicamentos simpaticomiméticos, Litio, agentes antidiabéticos, Anfotericina B. Ud. no debe ingerir alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso de que se someta a algún examen.

Reacciones Adversas (no deseadas):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: mareos, infección superior respiratoria, cefalea, dolor a la espalda, congestión nasal, insomnio, dolor en el pecho, palpitaciones, edema, rash, arritmias cardiacas, algún síntoma de desbalance de electrolitos (sequedad de la boca, latidos cardiacos irregulares, oliguria, letargo, somnolencia, dolor o calambres musculares), fiebre, cansancio o debilidad no habituales.
Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: irritación gástrica, náuseas, vómitos, diarrea.
Posibles efectos adversos de frecuencia "no conocida": Cáncer de piel y labios (cáncer de piel no-melanoma).

Forma de Administración:
Vía oral. Puede administrarse con o sin alimentos.

Dosis:
El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 1 comprimido una vez al día.
La suspensión del tratamiento debe hacerse en forma gradual para evitar que se produzca un efecto rebote.

Sobredosis:
En caso de intoxicación, el paciente debe ser trasladado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a no más de 25ºC.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA
Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.

V1 / 550238 / 15.02.21

Mintlab