Milab

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE NAPROXENO SODICO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 550 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Presentación y Composición:
Cada comprimido recubierto contiene:
Naproxeno Sódico 550 mg

Excipientes: Celulosa Microcristalina, Povidona K-30, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz tipo A, Talco, Estearato de Magnesio, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Colorante FD&C Azul N°2 - Lacado.

Envase con 10 comprimidos recubiertos.
Envase Clínico.

Clasificación:
Analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroidal.

Indicación:
Alivio del dolor leve a moderado, tratamiento sintomático de la inflamación leve a moderadamente severa, aguda o crónica de tejidos musculares esqueléticos y blando. Dismenorrea.

Advertencias y Precauciones:
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- El uso de Naproxeno Sódico puede aumentar el riesgo de ulceración gastrointestinal.
- No administrar a niños menores de 12 años.
- Administrar con precaución en pacientes ancianos, ya que son más susceptibles de sufrir efectos adversos.
- Ud. debe consultar a su Médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca).
- Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

Contraindicaciones:
Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:
- Embarazo, lactancia.
- Alergia a Naproxeno Sódico u otro analgésico antiinflamatorio no esteroidal.
- No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugia de by-pass coronario.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, especialmente si se trata de: Litio, Fenitoína, Ácido Valproico, anticoagulantes, Heparina, Aspirina, Metotrexato, Ciclosporina, glicósidos cardiacos, Atenolol, diuréticos, Probenecid y Vitaminas. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras enfermedades:
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: úlcera gastroduodenal, colitis, anemia, asma, diabetes, enfermedad renal o hepática, alcoholismo.

Efectos Adversos (no deseados):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: sangramiento, orina con sangre, problemas para respirar, convulsiones, visión borrosa, dolor de cabeza severo.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: somnolencia, mareos, dolor de cabeza suave a moderado, náuseas, irritación gástrica, ardor de estómago, vómitos, cambio en el gusto, fotosensibilidad.

Forma de Administración:
Vía oral. Administrar con mucho líquido o con alimentos.

Dosis:
El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a propiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 550 mg 2 veces al día, máximo 1,5 g/día.

Sobredosis: En caso de ingestión involuntaria, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico Asistencial.

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30ºC.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.

V1 / 550182 / 03.12.20

Mintlab