



# FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## NOSTADEN® COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

### CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca del tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

#### **Composición y Presentación:**

Cada comprimido recubierto contiene:

Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de Silicio Coloidal, Almidón de Maíz Pregelatinizado, Behenato de Glicerilo, Celulosa Microcristalina, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco, c.s.

Envase con 20 comprimidos recubiertos.

Envase clínico.

#### **Clasificación:**

Relajante muscular.

#### **¿Para qué se usa Nostaden?**

Tratamiento sintomático y coadyuvante, tanto en la terapia de reposo como física, para el alivio del espasmo muscular, asociado a condiciones musculoesqueléticas dolorosas y agudas.

#### **¿Cómo tomar Nostaden?**

Vía de Administración: Vía oral. Se recomienda tomar el comprimido recubierto con un vaso lleno de agua.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada para adultos es de 5 mg (un comprimido recubierto) 3 veces al día. Basado en la respuesta individual esta se puede aumentar a 10 mg tres veces al día, la dosis máxima es de 60 mg diarios.

#### **Advertencias y Precauciones:**

- Usar con precaución en pacientes con antecedentes de retención urinaria, glaucoma de ángulo cerrado, aumento de la presión intraocular o en pacientes que reciben drogas anticolinérgicas.
- Debe utilizarse bajo estricta vigilancia médica en niños menores de 15 años.
- Nostaden puede afectar la capacidad para ejecutar actividades que requieren coordinación física o alerta, tales como conducir un automóvil, operar instrumentos o maquinaria.

**Contraindicaciones:**

- En pacientes con alergia a Ciclobenzaprina clorhidrato o algún otro componente de la fórmula.
- Pacientes con hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias y otros desórdenes del bloqueo y conducción cardíaca, durante la recuperación tras un infarto al miocardio.
- Pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa (moclobemida, selegilina) incluso dentro de los 14 días siguientes terminado el tratamiento.

**Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros. Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos que han adquirido sin receta médica. Se han descrito interacciones con: alcohol, depresores SNC, antidepresivos tricíclicos.

Guanetidina.

Inhibidores de monoaminoxidasa. Tomando Ciclobenzaprina mientras se esta tomando o se dejó de tomar hace menos de 2 semanas los inhibidores de la monoaminoxidasa puede aumentar la posibilidad de efectos adversos. Se han reportado casos graves y fatales.

**Efectos Adversos (no deseados):**

Todo medicamento puede producir efectos no deseados. Ciclobenzaprina puede presentar efectos que, por lo general, no son graves y no requieren atención médica: dolor de cabeza, sequedad de boca, somnolencia, confusión, problemas al orinar, timbre o zumbido en los oídos. Estos generalmente ceden entre 1 a 3 días después de iniciado el tratamiento. Otros efectos colaterales de menor frecuencia son: fatiga o cansancio, astenia, dispepsia, náusea, constipación, gusto desagradable, visión borrosa, nerviosismo, entre otros. Consulte a su médico en caso de urticaria o picazón en la piel o cualquier efecto no deseado de importancia que asocie al medicamento.

**Sobredosis:**

Ante la eventualidad de intoxicación o de ingestión accidental debe consultar a su médico o concurrir a un centro de atención médica, llevando este folleto.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de a fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.**

**NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.