



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PROPRANOLOL CLORHIDRATO COMPRIMIDOS 10 MG

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

### **Composición y Presentación:**

Cada comprimido contiene:

Propranolol Clorhidrato 10 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Estearato de Magnesio, Dióxido de Silicio Coloidal, Celulosa Microcristalina, Lactosa Monohidrato, c.s.

Envase con 20 comprimidos

Envase clínico

### **Clasificación:**

Antihipertensivo, bloqueador  $\beta$ -adrenérgico no selectivo.

### **Indicación:**

Tratamiento de angina crónica estable e hipertensión. Tratamiento y profilaxis de arritmias cardíacas.

Profilaxis de reinfarto al miocardio. Manejo de los síntomas en pacientes con feocromocitoma.

### **Contraindicaciones:**

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:

- Pacientes con síndrome de Raynaud's, hipertensión maligna, asma bronquial, bradicardia sinusal, en bloqueo cardíaco y en falla cardíaca congestiva.
- Embarazo y lactancia.
- Miastenia gravis.

### **Advertencias y Precauciones:**

**Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.**

- Propranolol debe administrarse con precaución en pacientes con función miocárdica inadecuada, disfunción del nodo sinusal, bronquitis crónica, enfisema y enfermedad hepática o renal.
- La suspensión de la terapia debe hacerse en forma gradual.
- La eficacia y seguridad no ha sido establecida en menores de 12 años.
- Debe ser usado con precaución en pacientes con Diabetes mellitus, ya que enmascaran los signos y síntomas de hipoglucemia.

**Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones), Ud. debe comunicar a su Médico de todos los medicamentos que esta tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente:

fenotiazinas, Clorpromazina, Haloperidol, Tioridazina, Fluoxetina, agentes simpaticomiméticos, Atropina, Amitriptilina, Cimetidina, antiácidos, diuréticos, hipoglucemiantes orales, Tubocurarina.

No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones o en caso que se someta a algún examen.

**Presencia de otras Enfermedades:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico o farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: enfermedad renal o hepática, Diabetes Mellitus, Asma, enfermedad mental, hipertiroidismo.

**Efectos Adversos (no deseados):**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre:

hipotensión, bradicardia, síncope, angina, mareos, ataxia, disturbios visuales, confusión, fatiga, pesadillas, alucinaciones, insomnio, rash.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: náuseas, vómitos, diarrea leve, estreñimiento, flatulencia, cansancio, mareos, irritación.

**Forma de Administración:**

Vía oral.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Hipertensión: 40 mg. 2 veces al día, esta dosis puede ser aumentada gradualmente según recomendación médica.

Tratamiento de arritmias: 20-40 mg. 2 veces al día la que se puede aumentar a 160 mg. diarios.

Angina: 80 a 160 mg. diarios según prescripción médica.

**Sobredosis:**

La principal manifestación es la bradicardia (latidos cardiacos disminuidos) o hipotensión severa (presión baja). Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención médico.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.