



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

PYRIPED® SUSPENSIÓN ORAL 100 mg / 5 mL

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada 5 mL de suspensión contiene:

Ibuprofeno 100 mg

Excipientes: Goma Xantano, Celulosa Microcristalina y Carmelosa, Polisorbato 80, Benzoato de Sodio, Ácido Citrico Anhidro, Sucralosa, Colorante FD&C Rojo N° 40, Sorbitol, Glicerina, Esencia de Frambuesa Líquida, Propilenglicol, Agua Purificada.

Clasificación:

Analgésico, antiinflamatorio no esteroidal.

Indicación:

Está indicado en el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.

Precauciones y Advertencias:

Para mayor seguridad de uso de este producto, consulte al Químico Farmacéutico.

- El uso prolongado de este medicamento puede producir úlcera gástrica.
- Si los síntomas persisten por más de una semana consulte a su Médico.
- Si se usa este medicamento para bajar la fiebre consulte al Médico si después de 3 días de administración éstanos desaparece.
- Si el niño va a ser sometido a una intervención quirúrgica no olvide decir al Médico o Dentista que está tomando este medicamento.
- Ud. debe consultar a su Médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca).
- Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

Contraindicaciones:

- Alergias: está contraindicado en pacientes con antecedentes de intolerancia conocida a los componentes de la formulación o a otros analgésicos - antiinflamatorios no esteroideos.
- Embarazo y lactancia: al igual que con cualquier medicamento, si usted está embarazada o amamantando, consulte al Médico antes de comenzar con el tratamiento. No administrar durante el primer y tercer trimestre de embarazo, a menos que su Médico le indique lo contrario.
- No se recomienda para niños menores de 6 meses.

- Se recomienda consultar al Médico la dosis antes de administrar este medicamento a menores de 12 años.
- En el anciano se debe utilizar la dosis efectiva más baja, ya que están más expuestos a los efectos no deseados de los antiinflamatorios.
- No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. No administrar conjuntamente con otros productos que contengan Ibuprofeno, Aspirina, otro antiinflamatorio no esterooidal, hidantoinas, anticoagulantes, sulfonilureas, Furosemida, glucósidos cardíacos, Propranolol, Probenecid, Metotrexato, inhibidores ACE, antimicóticos, sales de Litio, Fenitoina, sin indicación médica.

Presencia de otras enfermedades:

Los efectos de un medicamento también pueden modificarse por la presencia de otra enfermedad. Si padece hipertensión, daño hepático o renal, gastritis, trastornos de la coagulación, u otra enfermedad crónica consulte al Médico antes de tomar este medicamento.

Reacciones Adversas:

Todo medicamento puede causar, junto con los efectos benéficos deseados, algunos efectos secundarios. La posibilidad de presentar efectos secundarios con el uso de Ibuprofeno en las dosis recomendadas es muy baja, sin embargo, se pueden presentar efectos no deseados especialmente si se tomara un periodo prolongado de tiempo y/o dosis grandes. Si aparece alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar el medicamento y consulte al Médico. Se ha reportado alergia (picañón y enrojecimiento de la piel, hinchazón de la cara o alrededor de los ojos, molestias al respirar, fiebre o dolor de garganta), heces negras o con sangre, malestar abdominal, dolor epigástrico, disminución de la frecuencia para orinar o en la cantidad de orina.

Pueden ocurrir otros efectos que no requieren atención médica, acidez, cefalea, náuseas, edema periférico suave, vértigo, flatulencias, constipación, diarrea. Estos efectos tienden a desaparecer con el uso del medicamento (adaptación del organismo al medicamento) pero en caso de que persistan o se intensifiquen debe consultar al Médico.

Dosis y Forma de Administración:

Niños de 6 meses a 12 años: la dosificación se debe realizar en base al peso corporal del niño. La dosis usual es de 5 a 10 mg/kg de peso corporal cada 8 horas con un máximo de 40 mg/kg/día. No administrar dosis superiores a las recomendadas.

Agite bien antes de usar:

Administrar junto con las comidas o con un vaso de leche. La duración del tratamiento no debe exceder los 3 días en el caso de fiebre y los 10 días en el tratamiento del dolor. Si la fiebre o el dolor persisten después de estos periodos o aparecen otros síntomas, consulte al Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**