



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PYRIPED® CÁPSULAS BLANDAS 400 mg

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

### **Composición:**

Cada cápsula blanda contiene:

Ibuprofeno 400 mg

Excipientes: Macrogol 600, Hidróxido de Potasio, Lecitina, Gelatina, Solución Sorbitol-Sorbitan, AguaPurificada.

### **Clasificación:**

Antipirético, analgésico y antiinflamatorio no esteroidal.

### **¿Para qué se usa?**

Tratamiento sintomático de estados inflamatorios dolorosos, de leves a moderados y/o estados febriles. Tratamiento de la dismenorrea primaria. Alivio de síntomas signos de artritis reumatoidea y osteoartritis.

### **Vía de Administración:**

Vía Oral.

### **¿Cómo actúa Pyriped Cápsulas Blandas?**

Al igual que otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, Pyriped Cápsulas Blandas debe su efecto antiinflamatorio a la inhibición de la enzima ciclooxigenasa y por ende los precursores del ácido araquidónico, directamente involucrados en la inflamación y el dolor. El efecto antipirético se debe a actuar sobre el hipotálamo, lugar donde el organismo controla la temperatura.

### **Consejo de cómo administrarlo**

Puede tomarlo en conjunto con alimentos, leche o antiácidos para evitar malestar estomacal.

### **Advertencias y Precauciones:**

- No administrar a niños menores de 12 años.
- La administración por más de una semana debe ser con control médico.
- Se debe evitar la automedicación con analgésicos y fármacos reductores de la fiebre mientras estén tratamiento con este producto.

Usted debe consultar a su Médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca). Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

#### **Contraindicaciones:**

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Hipersensibilidad conocida a Ibuprofeno u otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o cualquier componente de la formulación.

Pólipo nasal, angioedema o broncoespasmo desencadenado por otro medicamento como el ácido acetilsalicílico.

Úlcera gastrointestinal, enfermedad hepática o renal severa.

Embarazo y lactancia.

No se debe usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico) en el periodo inmediato a una cirugía de bypass gástrico.

#### **Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Químico Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente: ácido acetilsalicílico u otro analgésico no esteroideo, Litio, Metotrexato, glicósidos cardíacos, Ciclosporina, Fenitoína, Ácido Valproico, diuréticos, hipoglucemiantes, anticoagulantes orales, Heparina, Atenolol y vitaminas. No olvide mencionar que está tomando este medicamento en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso de que se someta a algún examen.

#### **Reacciones Adversas:**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: sangramiento, orina con sangre o turbia, problemas al orinar (dificultad, ardor, dolor), cambios en la visión o visión borrosa, alergia (picaazón, enrojecimiento de la piel, hinchazón de la cara, molestias al respirar, fiebre o dolor de garganta).

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: acidez estomacal, náuseas, diarrea, constipación, mareos, dolor de cabeza, edema periférico suave, aumento de la sensibilidad de los ojos y piel a la luz solar.

#### **Dosis:**

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es de 1 cápsula blanda 3 a 4 veces al día.

#### **Sobredosis:**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y malestar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **Condiciones de Almacenamiento:**

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**