



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

TETRACICLINA CLORHIDRATO CÁPSULAS 500 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación

Cada cápsula contiene:

Tetraciclina Clorhidrato 500 mg

Excipientes: Estearato de Magnesio, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Talco, Colorante FD&C Amarillo N° 6, Colorante FD&C Azul N° 1, Colorante FD&C Rojo N° 40, Dióxido de Titanio, c.s.

Envase con 8 cápsulas

Clasificación:

Antibiótico.

Indicación:

Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, piel y tejidos blandos e infecciones del tracto respiratorio causadas por organismos susceptibles.

Advertencia y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Ud. debe administrar Tetraciclina Clorhidrato por el tiempo completo de tratamiento indicado por su Médico.
- Este medicamento puede aumentar la sensibilidad de la piel a los rayos solares.
- Si Ud. toma anticonceptivos orales, se recomienda un método adicional de control de embarazo durante el tratamiento con Tetraciclina Clorhidrato.
- Si se va a someter a una cirugía, incluyendo cirugía dental, informe a su Médico que está en tratamiento con este medicamento.
- Administrar con precaución en pacientes con enfermedad hepática, renal, Diabetes Mellitus.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Alergia a Tetraciclina Clorhidrato, otra Tetraciclina o alguno de los componentes de la formulación.
- Embarazo y lactancia.
- Niños menores de 8 años, ya que este medicamento puede causar decoloración permanente de los dientes en niños.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de: antiácidos, suplementos de calcio, colestiramina, laxantes, anticonceptivos orales, penicilinas. No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre:

fotosensibilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza, pérdida del apetito, problemas de la visión, piel amarilla.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: diarrea, ardor estomacal, náuseas, vómitos, oscurecimiento o decoloración de la lengua.

Forma de Administración:

Vía oral. Este medicamento se debe administrar con un vaso grande de agua. No debe ingerir leche o derivados lácteos durante las 2 horas previas y posteriores de la hora de administración de Tetraciclina Clorhidrato.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos: 1 a 2 g cada 24 horas en dosis divididas cada 6 o 12 horas dependiendo de la severidad del cuadro.

Niños mayores de 8 años: 25-50 mg/kg divididos en 2 o 4 tomas dependiendo de cada caso. Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. La duración del tratamiento debe continuarse por 24 a 48 horas después que los síntomas han desaparecido. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.