



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE TRIMEBUTINO MALEATO COMPRIMIDOS 100 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada comprimido contiene:

Trimebutino Maleato 100 mg

Excipientes: Povidona, Croscarmelosa Sódica, Lactosa Monohidrato, Lauril Sulfato de Sodio
Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina.

Envase con 20 comprimidos.

Envase Clínico.

Clasificación:

Antiespasmódico.

Indicación:

Indicado en Síndrome de Intestino Irritable, (colopatías funcionales, colon irritable, colon inestable colon espástico) y sus manifestaciones: espasmos intestinales, disfunción cólica, crisis alternantes de diarrea y estreñimiento, meteorismo, dolor y distensión abdominal, constipación, secuelas de gastrectomía, dispepsias.

Advertencias y Precauciones:

- No usar en niños menores de 15 años, sin indicación médica.
- Ud. debe informar a su Médico si padece de desórdenes hepáticos, cardíacos, Renales, hipertensión, glaucoma o es un paciente prostático.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:

- En pacientes con alergia a Trimebutino Maleato u otro componente de la formulación.
- No administrar en embarazo o lactancia, salvo indicación médica.
- Pacientes con miastenia gravis.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco.

- Los efectos de la Cisaprida sobre las contracciones peristálticas son completamente bloqueadas por los anticolinérgicos como el Trimebutino.
- Procaïnamiada administrada concomitantemente con Trimebutino puede aumentar el efecto antivagal en la conducción nodal atrioventricular.
- Antagonistas opiáceos como por ejemplo Naloxona.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Cansancio, Vómitos, náuseas, sensación de frío y calor.

Forma de Administración:

Vía Oral

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado para su caso particular.

No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es :

Inicio: 2 comprimidos 3 veces al día antes de las comidas, durante 10 días.

Mantención: 1 comprimido 3 veces al día, antes de las comidas.

Sobredosis:

El tratamiento en caso de ingestión accidental consiste en la inducción del vómito o lavado gástrico, luego se debe administrar carbón activado para impedir la absorción de cualquier remanente de droga en el organismo. Además se deben aplicar las medidas de soporte general.

Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médico Hospitalario.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.