


Vademécum 2024

Laboratorio Milab,
parte del grupo Femsa Salud.







Introducción

Somos Milab, un Laboratorio internacional con planta en Chile, presente desde hace 34 años en el mercado farmacéutico.

Formamos parte del grupo FEMSA División Salud, abastecemos con nuestros medicamentos a más de 4.000 farmacias en Chile y exportamos a 10 países de la región.

Contamos con más de 400 registros sanitarios, entregando soluciones de primera línea a más de 50 patologías de diferentes líneas terapéuticas.

Somos líderes en la fabricación nacional de medicamentos Bioequivalentes y además, contamos con una de las dos plantas autorizadas en Chile para la fabricación de productos Betalactámicos.

Por esto y más, estamos comprometidos con trabajar día a día para mejorar la vida y salud de las personas, produciendo medicamentos de calidad y accesibles para la población.

Somos Milab, calidad para ti.

IMPORTANTE

La información contenida en el presente vademécum corresponde a lo registrado como prospecto paciente del medicamento y esta orientado a servir de referencia a los profesionales de la salud.

Milab en el mercado

Milab produce una amplia variedad de productos farmacéuticos para satisfacer las necesidades de salud de toda la población de Chile y de Latinoamérica, considerando productos genéricos y de

marcas para mercado público/ privado con diversas formas farmacéuticas (sólidos, semi sólidos y líquidos), teniendo más de 400 registros en Chile y 400 en otros países de LATAM.



**+400
productos**

con autorización de comercialización en Chile por el ISP.

**Tenemos participación en
más de 10 áreas terapéuticas**

(Antibióticos, Sistema Nervioso Central, Cardio Metabólico, Respiratorio, Alergia y Salud Femenina) con productos con fabricación en Chile e importados.



Somos líderes en
Bioequivalentes



**Producimos más de
80 millones**


de unidades por año, somos el segundo laboratorio que más productos BE fabrica en Chile.



Milab está presente en

10 países de LATAM

Somos parte del grupo FEMSA Salud, lo que nos permite estar presente con nuestros medicamentos, en diferentes países de la región.



Contamos con 2 plantas certificadas

de producción en 3.530 m2 de construcción y 2 bodegas con un total de 5.960 m2.



Los productos Milab llevan más de **30 años en el mercado**



Contamos con cerca de 500 colaboradores

que contribuyen diariamente para cumplir con la visión de Milab.

Tipología de medicamentos

MARCA

Los medicamentos de marca hacen referencia al nombre comercial o registro de marca, definido como el nombre registrado de un producto. Este nombre es propiedad privada del fabricante o titular de registro sanitario y se utiliza para distinguir un medicamento entre los competidores del mercado.



GENÉRICOS

Un medicamento genérico funciona de la misma manera y proporciona el mismo beneficio clínico que su versión de marca. A diferencia del medicamento de Marca o similar, no utiliza un nombre comercial.



OTC

Los medicamentos de venta libre (OTC) se distinguen por su disponibilidad sin necesidad de prescripción médica. Estos productos son accesibles directamente para los pacientes.





Índice

MARCA

MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
Alergias	Montelukast	AKAN COM.REC.10MG.30	15
	Montelukast	AKAN COM.REC.4MG.30	15
	Montelukast	AKAN COM.REC.5MG.30	15
	Cetirizina Diclorhidrato	COOLIPS COM.10MG.10	16
	Cetirizina Diclorhidrato	COOLIPS COM.10MG.30	16
	Oximetazolina Clorhidrato	FACIMIN SP.NAS.0,05% 10M	16
	Loratadina	HYSTICLAR JBE.5MG.100ML	16
	Levocetirizina diclorhidrato	LALERGIC BE GOTAS.5MG/ML.20	16
	Levocetirizina diclorhidrato	LALERGIC COM.5MG.30	17
	Levocetirizina diclorhidrato	LALERGIC FTE.SOL.5/5ML100	17
	Desloratadina	NEOHYSTICLAR COM.5MG.30	17
	Desloratadina	NEOHYSTICLAR COM.5MG.60	17
	Desloratadina	NEOHYSTICLAR JBE2,5/5M.90	18
	Clorfenamina Maleato	NIPOLEN COM.4MG.20	18
	Clorfenamina Maleato	NIPOLEN JBE.2,5MG/ML.120ML	18
	Clorfenamina Maleato	NIPOLEN JBE.2,5MG/ML100ML	18
Analgésia	Clonixinato de Lisina	BLONAX COM.125MG.10	20
	Ketorolaco Trometamol	BRODIFAC COM.10MG.10	20
	Diclofenaco Dietilamina	DICOGEL GEL 1.16% 30GR.	20
	Hidroxicloroquina Sulfato	DROLSAN COMREC.200MG.30	21
	Diclofenaco Sódico	ELITIRAN GOTAS.15MG/ML.25ML	21
	Diclofenaco Sódico	ELITIRAN GP	21
	Paracetamol	GENIOL 1/ 1000MG.20	22
	Paracetamol	GENIOL 500MG.20	22
	Paracetamol/Noscapina	GENIOL COMPUESTO DÍA 5G	22
	Clorhidrato/Cafeína		
	Ácido/Ascórbico		
	Paracetamol/Noscapina	GENIOL COMPUESTO NOCHE 5G	23
	Clorhidrato/Cafeína/Ácido Ascórbico/Clorfenamina Maleato		
	Paracetamol/Pseudoefedrina	GENIOL FLU D/N COM.15+5	23
	Sulfato/Clorfenamina Maleato Paracetamol/ Pseudoefedrina Sulfato/ Clorfenamina Maleato	GENIOL FLU JBE. 100ML	23
	Paracetamol	GENIOL GOTAS.100MG/ML.15ML	24
	Paracetamol	GENIOL NINOS COM.160MG.16	24
	Ácido Acetilsalicílico	HASSAPIRIN COM.500MG.20	24
	Ácido Acetilsalicílico	HASSAPIRIN COM.100MG10(10	25
	Salicilato de Metilo/ Mentol Natural	MINTALUB CR.35GR	25
	Tramadol Clorhidrato	NAXODOL GOTAS.100MG/ML 10ML	25
	Ciclobenzaprina Clorhidrato	NOSTADEN COM. 5MG.20	26
	Ciclobenzaprina Clorhidrato	NOSTADEN COM.10MG.20	26
	Ibuprofeno	PYRIPED CAP.400 MG.20	26
	Ibuprofeno	PYRIPED COM.600MG.20	26
	Ibuprofeno	PYRIPED FTE.SUS.200MG.100	27
Ibuprofeno	PYRIPED SUS.100MG.100ML.	27	

Índice

MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
	Ketoprofeno	RELATENE CAP.50MG.10	27
	Ketoprofeno	RELATENE CAP.50MG.20	27
	Ketoprofeno	RELATENE COM.100MG.20	27
	Ketoprofeno	RELATENE COM.100MG.10	27
	Ergotamina Tartrato Metamizol	ULTRIMIN COM.10	28
	Sódico Clorfenamina Maleato		
	Cafeína Anhidra		
Antiinfecciosos	Moxifloxacino	ALMAXOL 400mg 10 COMP. REC. (MSN)	30
	Terbinafina	DONTER COM.250MG.30	30
	Sulfametoxazol/Trimetoprima	TRELIBEC FTE.COM.10	31
Cardiovascular	Enalapril Maleato	DIOTENSIL COM.10MG.30	32
	Enalapril Maleato	DIOTENSIL COM.20MG.30	32
	Losartán potásico	LOPREN COM.50MG.30	32
Dermatología	Clotrimazol	CREMINEM CR.1% 20GR.	34
	Clotrimazol	CREMINEM-B CR.15GR.	34
	Betametasona	CREMIRIT CR.0.05% 15GR	34
	Benzocaína	FRAGIDERM UNGUENTO 30 GR	35
	Aciclovir	LISOVYR CR.5%. 5GR.	35
	Aciclovir	LISOVYR CR.5%.15GR.	35
	Ketoconazol 2 g.	SORIDERMAL CR.2% 20GR	35
Dermocosmética		AC-X JABON BARRA AZUFRE	36
		AC-X JABON BARRA CARBON	36
		AC-X JABON BARRA EXFOLIANTE	36
		AC-X JABON BARRA ANTIESPINILLAS FORTE	37
		ACX GEL SECANTE COLOR PIEL	37
		ACX GEL SECANTE INCOLORO	37
		ACX ESPUMA DE LIMPIEZA FACIAL CORPORAL	38
Gástricas	Magaldrato/Simeticona	ACIFIN COM.MAST.10	40
	Bromuro de Pipenzolato/ Fenobarbital	BALDMIN. GOTAS. 15ML	40
	Atropina Sulfato Monohidrato	BUTON COM. 10	40
	Papaverina Clorhidrato		
	Loperamida Clorhidrato	COLIPER COM.2MG.6	41
	Loperamida Clorhidrato	COLIPER GOTAS.2MG/ML 10ML.	41
	Domperidona	DOCIVIN CAP.10MG. 30	41
	Domperidona	DOCIVIN GOTAS.10MG/ML.15ML	41
Hombres	Tamsulosina clorhidrato	PROSTALIC COMREC.0.4MG.30	43
	Sildenafil	ZILFIC COM. 50MG. 1	43
	Sildenafil	ZILFIC COM. 50MG. 5	43
	Sildenafil	ZILFIC COM. 50MG.10	43
	Sildenafil	ZILFIC COM.100MG. 1	43
	Sildenafil	ZILFIC COM.100MG. 5	43
	Sildenafil	ZILFIC COM.50MG.2	43

Índice

MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
	Sildenafil	ZILFIC COM.100MG.5	43
	Sildenafil	ZILFIC COM.50MG.2	43
Metabólicos	Metformina Clorhidrato	TAVIST XR COMLP.1000MG.30	45
Mujer	Ácido Mefenâmico	ADESNA COM.500MG.10	47
	Lactulosa	AXANT SOL.65%.200ML	47
	Sulpirida	ISTEFRAL CAP.50MG.30	48
	Clormadinona Acetato/ Etinilestradiol	JULIETTE COM2MG/0,03MG.21	48
	Drospirenona/ Etinilestradiol	LADYGEX 20 COM.28	49
	Drospirenona/ Etinilestradiol	LADYGEX COM.28	49
	Nitrofurantoína	MATIDAN CAP.100MG.30	50
	Levonorgestrel / Etinilestradiol	MINEVA E 150/30 21+7 COMP. REC. (MYL) BE	50
	Pargeverina Clorhidrato	PLAZOLIT FTE.GOTAS.10MG/M15	50
	Pargeverina Clorhidrato	PLAZOLIT GOTAS.5MG/ML.15ML	51
	Gestodeno micronizado / Etinilestradiol micronizado	PRENAL 20 COM.REC.21	51
	Orlistat	SAGRAS CAP.120MG.42	52
	Orlistat	SAGRAS CAP.120MG.105	52
	Desogestrel	SOLUNA COM.75MCG.28	52
	Desogestrel	SOLUNA E COM.21	53
	Desogestrel	SOLUNA E20 COM.21	53
	Doxilamina Succinato	VITOMIT COM.10MG/10MG.30	54
	Piridoxina Clorhidrato		
Respiratorio	Salbutamol	ASMAVENT SF INHBUC.200DS	55
	Salbutamol	ASMAVENT-B INH.BUC.200DS.	55
	Bromhexina Clorhidrato/ Clofedianol Clorhidrato	BAUXOL. AD. JBE 100 ML	55
	Bromhexina Clorhidrato	BROMFIN JBE.8MG/5ML.100ML	55
	Hedera hélix	BRONTEC JBE.35MG/5ML.120M	56
	Hedera hélix	BRONTEC JBE.35MG/5ML100ML	56
	Clorhexidina Diclorhidrato/ Noscapina	BUCOGERM TOS COM.10	56
	Ambroxol Clorhidrato	MINTAMOX AD. JBE.30MG.100	56
	Ambroxol Clorhidrato	MINTAMOX PED. JBE.15MG.100	56
	Codeína Fosfato	NASOLVER JBE.100ML	57
	Pseudoefedrina Clorhidrato Clorfenamina Maleato*		
	Cloruro de Sodio	RINOSTERYL SOLNAS.0,9% 30	57
	Oxolamina	TULOX AD. JBE.50MG/5ML100	57
	Oxolamina	TULOX PED. JBE.28MG/5ML100	57

Índice

MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
Sistema nervioso	Sertralina	LOWFIN COM.100MG.30	59
	Duloxetina	NEUROSTAB	59
	Venlafaxina.	NEZEL XR CAP.LP.150MG.30	60
	Venlafaxina.	NEZEL XR CAP.LP.75MG.30	60
	Zopiclona	ZONIX COM.7,5MG. 30	61
Sup. Alimenticios y Edulcorantes	Multivitamico	FORTOTAL ACTIVE+ CAP.30	63
	Vitamina C	MINTAVIT-C COM.100MG.100	63
	Vitamina C	MINTAVIT-C COM.500MG.30	63

GENÉRICOS

MACROCATEGORÍA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
Analgésia	AC ACETILSALICILICO IQA	66
	CLONIXINATO DE LISINA 125mg REC 10 BE	66
	KETOPROFENO 50mg CAP 20 BE	67
	KETOPROFENO TU 200mg REC ENT LIBP 10 BE	67
	KETOROLACO TROMETAMOL 10mg REC 10 BE	67
	MELOXICAM 15mg COM 10 BE	68
	MELOXICAM 7,5mg COM 15 BE	68
	METAMIZOL NA 300mg MONOH COM 20 BE	68
	NAPROXENO NA 550mg REC 10 BE	69
	PARACETAMOL INFANTIL 80mg COM MAST 100	69
	PARACETAMOL INFANTIL 80mg COM MAST 20	69
	TRAMADOL HCL 50mg CAP 10 BE	69
Antialérgico	CLORFENAMINA MALEATO 4mg COM 20 BE	70
	LORATADINA 5mg/5mL SOL ORAL 60mL 25 l BE	70
	LORATADINA 5mg/5mL SOL ORAL 90mL BE	70
	PREDNISONA 5mg COM 20 BE	70
Antiinfecciosos	ACICLOVIR 200mg COM 24 BE	72
	ACICLOVIR 400mg COM 35 BE	72
	ACICLOVIR 5% CREMA 5g	72
	AMOXICILINA 500mg CAP 21 BE	73
	AMOXICILINA 750mg COM 10 BE	73
	AMOXICILINA 750mg COM 500 BE	73
	AZITROMICINA 500mg REC 3 BE	74
	AZITROMICINA 500mg REC 504 BE I	74
	AZITROMICINA 500mg REC 6 BE	74
	BACITRACINA CON NEOMICINA UNGUENTO 15g	75
	CEFRADINA 500mg CAP 8	75
	CIPROFLOXACINO 500mg REC 6 BE	75
	COTRIMOXAZOL 200/40mg/5mL SUSP ORAL 100mL	76

Índice

MACROCATEGORÍA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
	COTRIMOXAZOL COM 20	76
	ERITROMICINA 500mg REC 8	77
	FLUCLOXACILINA 250mg/5mL POLVO 60mL	77
	FLUCLOXACILINA 250mg/5mL POLVO 60mL 25 C	78
	GENTAMICINA 0,1% CREMA 15g	78
	KETOCONAZOL 200mg COM 10	78
	LEVOFLOXACINO 500mg COM 7 BE	79
	LINCOMICINA 500mg CAP 12	79
	MEBENDAZOL 100mg COM MAST 6	79
	NITROFURANTOINA MACROC 100mg CAP 10 BE	80
	TERBINAFINA 250mg COM 30 BE	80
Cardiovascular	ACETAZOLAMIDA 250mg COM 20	81
	AMIODARONA HCL 200mg COM 1005 BE I	81
	AMIODARONA HCL 200mg COM 20 BE	81
	AMLODIPINO 10mg COM 30	82
	AMLODIPINO 10mg COM 60	82
	AMLODIPINO 5mg COM 30 BE	82
	AMLODIPINO 5mg COM 60 BE	82
	ATENOLOL 100mg COM 20 BE	82
	CAPTOPRIL 25mg COM 30 BE	82
	ENALAPRIL 5mg COM 100 I	83
	ENALAPRIL MALEATO 5mg COM 20 BE	83
	ISOSORBIDA DINITRATO 10mg COM 60	83
	PENTOXIFILINA 400mg REC LIBP30	84
	PROPRANOLOL HCL 10mg COM 20 BE	84
	PROPRANOLOL HCL 40mg COM 20 BE	84
Dermatología	TETRACICLINA HCL 500mg CAP 8 BE	86
Gástricas	LOPERAMIDA HCL 2mg COM 6 BE	88
	TRIMEBUTINO MALEATO 100mg COM 20 BE	88
	LACTULOSA 65% SOL ORAL 200mL	89
	METOCLOPRAMIDA 10mg COM 24 BE	89
Metabólicos	ALOPURINOL 100mg COM 20 BE	90
	ALOPURINOL 300mg COM 20 BE	90
	ATORVASTATINA 10mg REC 30 BE	90
	ATORVASTATINA 10mg REC 60	90
	ATORVASTATINA 20mg REC 30 BE	90
	GEMFIBROZILO 300MG COM 30 BE (CD)	91
	GEMFIBROZILO 600mg COM 500 CD BE I	91
	GEMFIBROZILO 600mg COM CD 20 BE	91
	GLIBENCLAMIDA 5mg COM 1005 BE I	91
	GLIBENCLAMIDA 5mg COM 30 BE	91

Índice

MACROCATEGORÍA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
Mujer	LEVONORGEST ETINILESTRIA 150/30 REC 21+7	92
	AC MEFENAMICO 500mg COM 10	92
Respiratorio	AEROCAMARA UNIVERSAL	94
	AMBROXOL 15 mg/5mL SOL ORAL 100mL BE	94
	AMBROXOL 30 mg/5mL SOL ORAL 100mL BE	94
	BROMHEXINA HCL 4mg/5mL SOL ORAL 100mL BE	95
	CEFADROXILO 500MG CAP 504 BE	95
	CEFADROXILO 500mg CAP 8 BE	95
	NOSCAPINA 20mg COM 20	96
	NOSCAPINA 5mg/5mL JBE 100mL BE	96
	OXOLAMINA 28mg/5mL JBE 100mL BE	96
	OXOLAMINA 50mg/5mL JBE 100mL BE	97
	SALBUTAMOL 2mg/5mL JBE 100mL BE	97
	SALBUTAMOL SF 100mcg/DSINH 1 JEWIM	97
	SALBUTAMOL SF 100mcg/DSINH 1 JEWIM L	97
	Sistema nervioso	ALPRAZOLAM 0,5mg COM 30 BE
BROMAZEPAM 3mg COM 30 BE		98
CARBAMAZEPINA 200mg COM 20 BE		98
CICLOBENZAPRINA HCL 10mg REC 20 BE		99
CITALOPRAM 20mg COM 30 BE		99
CITALOPRAM 20mg COM 900 BE I		100
CLONAZEPAM 0,5mg COM 30 BE		100
CLONAZEPAM 2mg COM 30 BE		100
DIAZEPAM 10mg COM 20 BE		101
ESCITALOPRAM 10mg REC 30 BE		101
FLUOXETINA 20mg COM 20 BE		101
MELATONINA 3mg CAP 30 MINTLAB		102
SERTRALINA 100mg REC 30 BE		102
SERTRALINA 50mg REC 30 BE		102
ZOPICLONA 7,5mg REC 30 BE	103	
Sup. Alimenticios y Edulcorantes	BETACAROTENO CAP 100	104

The image features a solid orange background. In the upper left, there are two white circles of different sizes. A large, thin white curved line starts from the top right and sweeps across the middle of the page. Another white curved line starts from the bottom left and curves upwards towards the right. The word "Marca" is written in a white, sans-serif font in the bottom right corner.

Marca

AKAN®**ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Montelukast (como sal sódica) 10mg.

Dosificación

Dosis usual adultos y adolescentes de 15 años de edad o mayores: Para el tratamiento del asma: Akan debe tomarse 1 vez al día, en la noche. La dosis recomendada es de 1 comprimido de 10 mg. Para el tratamiento de la broncoconstricción inducida por el ejercicio: La dosis es de 10 mg de montelukast al menos 2 horas antes del ejercicio. No se debe tomar una nueva dosis dentro de las 24 horas siguientes a la administración. Los pacientes que ya están tomando montelukast para otra indicación (incluyendo asma) no deben tomar una dosis adicional para prevenir la broncoconstricción inducida por el ejercicio. Los pacientes deben tener disponible un β-agonista de acción corta, en caso de crisis asmática.

Para el tratamiento de la rinitis alérgica estacional o perenne: Montelukast debe tomarse 1 vez al día en la noche. La dosis recomendada es de 1 comprimido de 10 mg. Para el tratamiento de la rinitis alérgica perenne, la dosis recomendada es de 1 comprimido de 10 mg.

Indicación

Indicado en la profilaxis y el tratamiento crónico del asma en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. Para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores. Para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores.

Contraindicaciones

Akan esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a Montelukast o a cualquier otro componente de la fórmula.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ECUADOR

HONDURAS

**AKAN®****ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES****Composición**

Cada comprimido masticable contiene: Montelukast (como sal sódica) 4mg / 5mg.

Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento asociado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada para el asma, rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne es:

- Niños de 2 a 5 años: Un comprimido masticable de 4 mg, una vez en el día tomado de preferencia en la noche.
- Niños de 6 a 14 años: Un comprimido masticable de 5mg, una vez en el día tomado de preferencia en la noche.

Indicación

Akan está indicado en la profilaxis y el tratamiento crónico del asma en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. Para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores. Para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores.

Contraindicaciones

Akan esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a Montelukast o a cualquier otro componente de la fórmula.



Comprimidos

COOLIPS®

ENVASES CON 10 Y 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Cetirizina Diclorhidrato 10 mg.

Dosificación

Adultos: 1 comprimido al día.

Indicación

Tratamiento de la congestión nasal, rinorrea y en alergias de diversas etiologías.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. Embarazo y lactancia.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN

**FACIMIN®**

FRASCO CON 10ML DE SOLUCIÓN NASAL

Composición

Cada 100 mL de solución nasal contiene: Oximetazolina Clorhidrato 50 mg.

Dosificación

1 - 2 aplicaciones en cada fosa nasal en la mañana y en la noche, en mayores de 6 años.

Indicación

Alivio temporal de la congestión nasal debida al resfriado común, fiebre del heno, sinusitis y algunas alergias de las vías respiratorias.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Oximetazolina, hipertiroidismo, enfermedad cardíaca, hipertensión, arterioesclerosis, diabetes Mellitus, inflamación de la próstata, glaucoma.



Solución nasal

PRODUCTO DISPONIBLE EN

**HYSTICLAR®**

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe contiene: Loratadina 5 mg.

Dosificación

Niños 2 a 5 años: 5mg / día.

Indicación

Alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional y afecciones dermatológicas alérgicas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al fármaco. Pacientes con insuficiencia hepática o renal. Embarazo.



Solución oral

PRODUCTO DISPONIBLE EN

**LALERGIC GOTAS®**

FRASCO GOTARIO CON 20ML

Composición

Cada 1 mL de solución oral contiene Levocetirizina diclorhidrato 5mg.

Dosificación

Dosis pediátrica recomendada es 2,5mg de Levocetirizina (0,5 mL de solución oral) una vez al día, durante la tarde.

Indicación

Alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional o perenne. Tratamiento de las manifestaciones cutáneas no complicadas.

Contraindicaciones

Alergia hipersensibilidad a levocetirizina u otro ingrediente de este medicamento, o a la cetirizina. Si padece de deterioro grave de la función renal. En niños de 6 meses a 11 años con insuficiencia renal.



Gotas orales



LALERGIC FORTE®

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene Levocetirizina diclorhidrato 5mg.

Dosificación

La dosis recomendada en adultos y mayores de 12 años es de 5mg una vez al día, de preferencia en la tarde.

Indicación

Alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional o perenne. Tratamiento de las manifestaciones cutáneas no complicadas.

Contraindicaciones

Alergia hipersensibilidad a levocetirizina u otro ingrediente de este medicamento, o a la cetirizina. Si padece de deterioro grave de la función renal. En niños de 6 meses a 11 años con insuficiencia renal.



Producto Bioequivalente



Comprimidos recubiertos

**LALERGIC®**

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 mL de solución oral contiene Levocetirizina diclorhidrato 5mg.

Dosificación

La dosis recomendada de Levocetirizina es de 5 mg una vez al día en la tarde. Siempre use este medicamento exactamente como su médico le ha señalado.

Indicación

Alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional o perenne. Tratamiento de las manifestaciones cutáneas no complicadas.

Contraindicaciones

Alergia hipersensibilidad a levocetirizina u otro ingrediente de este medicamento, o a la cetirizina. Si padece de deterioro grave de la función renal. En niños de 6 meses a 11 años con insuficiencia renal.



Solución oral

NEOHYSTICLAR®

ENVASES CON 30 Y 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Desloratadina 5 mg.

Dosificación

Adultos: 1 comprimido recubierto una vez al día.

Indicación

Alivio de los síntomas nasales y no nasales asociados con la rinitis alérgica estacional o perenne. Alivio de los síntomas asociados con la urticaria idiopática crónica, como es el caso del alivio del prurito, disminución de tamaño y número de lesiones urticariales (ronchas).

Contraindicaciones

No usar en pacientes con hipersensibilidad a la Desloratadina, Loratadina o algún componente de la formulación. Embarazo y lactancia.



Producto Bioequivalente



Comprimidos circulares

NEOHYSTICLAR®

FRASCO CON 90 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe contiene:
Desloratadina 2,5 mg.

Dosificación

En niños: de 2 a 5 años: 2,5 ml de jarabe (1,25 mg) una vez al día.
En niños de 6 a 11 años: 5 ml de jarabe (2,5 mg) una vez al día.

Indicación

Alivio de los síntomas nasales y no nasales asociados con la rinitis alérgica estacional o perenne. Alivio de los síntomas asociados con la urticaria idiopática crónica, como es el caso del alivio del prurito, disminución de tamaño y número de lesiones urticariales (ronchas).

Contraindicaciones

No usar en pacientes con hipersensibilidad a la Desloratadina, Loratadina o algún componente de la formulación. Embarazo y lactancia.

**NIPOLEN®**

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene:
Clorfenamina Maleato 4 mg.

Dosificación

Adultos: 4 mg cada 4 - 6 horas, no excediendo de 24 mg al día.

Indicación

Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional o perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, reacciones alérgicas cutáneas no complicadas o leves.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Clorfenamina Maleato. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Embarazo y lactancia.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN

**NIPOLEN®**

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe contiene:
Clorfenamina Maleato 2,5 mg.

Dosificación

Niños de 6 a 12 años: 2.5 a 5 ml/
cada 4 a 6 h; Niños mayores de 12 años y Ads.: 5 a 10 ml/ cada 4 a 6 h.

Indicación

Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional o perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, reacciones alérgicas cutáneas no complicadas o leves.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Clorfenamina Maleato. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Embarazo y lactancia.





BLONAX®**ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg.

Dosificación

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos recubiertos 3 a 4 veces al día. Máximo 6 comprimidos al día.

Indicación

Tratamiento del dolor leve a moderado. Dolor como síntoma principal o secundario, de diversa etiología, intensidad y localización. Alta eficacia en dolor de tipo:

odontológico, traumatológico, reumatológico, ginecológico, urogenital, oncológico, otorrinolaringológico, neurológico, prequirúrgico y posquirúrgico.

Contraindicaciones

Alergia a Clonixinato de Lisina u otro analgésico no esterooidal o a cualquier componente de la formulación. No debe usar AINES con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario. Alcohol durante el tratamiento. Embarazo y lactancia.



Comprimidos

BRODIFAC®**ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Ketorolaco Trometamol 10 mg.

Dosificación

Adultos: 10 mg 3 o 4 veces al día.

Indicación

Alivio durante periodos cortos del dolor moderado a severo post operatorio, incluidos los dolores abdominales, ginecológicos, oftalmológicos, ortopédicos

o cirugía urológica. También se utiliza en el alivio de cólicos renales agudos, dolor asociado con trauma y dolor visceral asociado con cáncer.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ketorolaco Trometamol u otros AINES. Úlcera péptica activa. Embarazo y lactancia. Falla renal. No se debe usar AINES con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario.



Comprimidos

DICOGEL®**POMO CON 30 G DE GEL.****Composición**

Cada 100 g de gel contiene: Diclofenaco Dietilamina 1,16 g (equivalente a 1 g de Diclofenaco Sódico).

Dosificación

Adultos: Aplicar localmente sobre la piel 3 o 4 veces al día, friccionando suavemente.

Indicación

Indicado para el alivio sintomático local del dolor e inflamación.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al Diclofenaco, u otros componentes de la formulación. Pacientes a los que el Ácido Acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos pueden provocarles ataques de asma, urticaria o rinitis aguda. Embarazo y lactancia.



Solución en gel

 PRODUCTO
 DISPONIBLE EN


ECUADOR

PANAMA

DROLSAN®**ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Hidroxicloroquina Sulfato 200 mg.

Dosificación

Artritis reumatoidea: dosis inicial 400 a 600 mg 1 vez al día. Dosis de mantención: se continúa con una dosis que se encuentra en el rango de 200 mg a 400 mg al día. Lupus eritematoso: la dosis inicial es de 400 mg al día 1 ó 2 veces al día. Dependiendo de la respuesta del paciente puede ser reducida a un rango de 200 mg a 400 mg al día.

Indicación

Artritis reumatoidea, artritis juvenil crónica. Condiciones dermatológicas causadas o agravadas por la luz solar. Amebiasis extraintestinal, lupus eritematoso (discoide crónico y sistémico).

Contraindicaciones

Pacientes con Hipersensibilidad a Hidroxicloroquina o a cualquiera de los componentes de la formulación. Alergia a los derivados de la cloroquina. No tomar en embarazo, lactancia, maculopatía preexistente y en niños menores de 6 años.



PRODUCTO DISPONIBLE EN

**ELITIRAN®****FRASCO GOTARIO CON 25ML****Composición**

Cada mL (18 gotas) de suspensión para gotas orales contiene: Diclofenaco Sódico 15 mg.

Dosificación

Niños de 1 a 12 años, se basa en el peso corporal del paciente y es de 0,5 - 2 mg/kg de peso al día, fraccionado en 2 a 3 dosis.

Indicación

Tratamiento sintomático del estado febril y en procesos inflamatorios, dolorosos.

Contraindicaciones

Úlceras gastrointestinales, lupus eritematoso sistémico, discrasias sanguíneas activas o historia de ellas y porfiria hepática. Niños menores de 1 año. No debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario.

**ELITIRAN GP®****ENVASE CON 10 CÁPSULAS CON GRÁNULOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA****Composición**

Cada cápsula con gránulos recubiertos de liberación prolongada contiene: Diclofenaco Sódico 100 mg.

Dosificación

Adultos: una cápsula de 100 mg al día, ingerida sin masticar, durante o después de las comidas. La duración del tratamiento depende de la patología o respuesta clínica.

Indicación

Tratamiento sintomático de procesos inflamatorios y dolorosos. Estado febril.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Clorfenamina Maleato. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Embarazo y lactancia.



GENIOL 1®**ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada comprimido contiene Paracetamol 1000 mg.

Dosificación

Administrar 1 a 2 comprimidos. Puede repetirse la dosis cada 6 a 8 horas, con un máximo de 8 comprimidos. No administrar más de 4 g diarios.

Indicación

Tratamiento sintomático de dolores leves a moderados y estados febriles.

Contraindicaciones

No usar en pacientes alérgicos al Paracetamol o alguno de los componentes del medicamento. Este medicamento no se debe administrar a personas que sufren de enfermedad hepática o renal grave. Una administración repetida de Paracetamol está contraindicada en pacientes con anemia, enfermedad cardíaca o pulmonar grave.



Producto Bioequivalente



Comprimidos recubiertos

**GENIOL®****ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada comprimido contiene: Paracetamol 500 mg.

Dosificación

Adultos y niños mayores de 12 años: 500 mg a 1 g, 3 a 4 veces al día. No administrar más de 4 gramos diarios (8 comprimidos).

Indicación

Gripe, resfrío, dolores de cabeza, musculares, dentales y lumbago.

En adultos con intolerancia al Ácido Acetilsalicílico, molestias gástricas y tendencia al sangramiento.

Contraindicaciones

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones; En personas que sufran de anemia, enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática o renal. Alergia al Paracetamol o a algún componente de la fórmula.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

GENIOL COMPUESTO DÍA®**SOBRE CON 5 G POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL****Composición**

Cada 5 g polvo contiene: Paracetamol 400 mg. Noscapina Clorhidrato (como monohidrato) 10mg; Cafeína 33 mg. Ácido Ascórbico 50 mg.

Dosificación

2 a 3 sobres de GENIOL COMPUESTO (CALIENTE DÍA) durante el día.

Indicación

Alivio de los síntomas de la gripe y el resfrío común.

Contraindicaciones

Enfermedad hepática o renal severa. Alergias a Aminofilina, Teofilina u otras xantinas.



Solución en polvo

GENIOL COMPUESTO NOCHE®

SOBRE CON 5 G POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

Composición

Cada 5 g polvo contiene:
Paracetamol 400 mg, Noscapiña
Clorhidrato (como monohidrato)
10mg; Cafeína 33 mg, Ácido
Ascórbico 50 mg, Clorfenamina
Maleato 4 mg.

Dosificación

1 sobre de GENIOL COMPUESTO con
Clorfenamina (CALIENTE NOCHE)
durante la noche.

Indicación

Alivio de los síntomas de la gripe y el
resfrío común.

Contraindicaciones

Enfermedad hepática o renal
severa. Alergias a Aminofilina,
Teofilina u otras xantinas.

**GENIOL FLU D/N®**ENVASE CON 15 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DÍA +
5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS NOCHE**Composición**

Cada comprimido recubierto DÍA
(amarillo) contiene: Paracetamol
500 mg, Pseudoefedrina Sulfato
60 mg. Cada comprimido
recubierto NOCHE (azul)
contiene: Paracetamol 500 mg,
Pseudoefedrina Sulfato 60 mg,
Clorfenamina Maleato 4 mg.

Dosificación

Adultos: 1 comprimido DÍA
(amarillo) 3 veces al día y 1
comprimido NOCHE (azul) al
acostarse. No administrar más de
4 g diarios de Paracetamol.

Indicación

Tratamiento sintomático de los
estados gripales y resfrío común.

Contraindicaciones

Hipertensión severa, enfermedad
hepática severa, cardiopatía
isquémica. Embarazo y lactancia.

**GENIOL FLU JARABE®**

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene:
Paracetamol 125 mg,
Pseudoefedrina Sulfato 30 mg,
Clorfenamina Maleato 2 mg.

Dosificación

Niños de 3 a 6 años: Es de 5 mL de
jarabe 3 veces al día y en niños de
7 a 12 años es de 7,5 mL de jarabe
3 veces al día.

Indicación

Alivio de los síntomas asociados a
la gripe y al resfrío común, como
fiebre, congestión nasal, dolores
musculares, rinorrea y malestar
general.

Contraindicaciones

Hipertensión severa, anemia,
enfermedad hepática severa,
cardiopatía isquémica. Embarazo
y lactancia. Neonatos.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN



GENIOL INFANTIL GOTAS®

FRASCO GOTARIO CON 15 ML

Composición

Cada mL de solución oral contiene: Paracetamol 100 mg.

Dosificación

3 a 5 veces al día, 2 a 5 años: 180 mg (50 gotas). Máximo diario 750 mg. 6 a 8 años: 320 mg (100 gotas). Máximo diario 1.200 mg. La dosis para niños menores de 2 años debe ser consultada con el Médico.

Indicación

Tratamiento sintomático de la fiebre y dolores de cabeza, musculares y dentales. Indicado en niños que presentan intolerancia al Ácido Acetilsalicílico, molestias gástricas y tendencia al sangramiento.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga o alguno de los componentes de la formulación. No administrar a personas que sufran de enfermedad hepática o renal grave.

**GENIOL INFANTIL COMPRIMIDOS®**

ENVASES CON 16 COMPRIMIDOS MASTICABLES

Composición

Cada comprimido masticable contiene: Paracetamol 80 Mg / 160 Mg.

Dosificación

La dosis a administrar en niños es por kilo de peso corporal, 10 a 15 Mg por kilo de peso, la que debe ser administrada hasta 4 veces al día, con una dosis máxima diaria de 60 Mg por kilo de peso.

Indicación

Tratamiento sintomático de estados dolorosos leves a moderados y febriles.

Contraindicaciones

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones: Hepatitis, daño hepático o renal severo. Alergia al Paracetamol o a algún componente de la fórmula.

**HASSAPIRIN®**

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene: Ácido Acetilsalicílico 500 mg.

Dosificación

1 - 2 comprimidos 3 a 4 veces al día. En reumatismo 6 a 12 y hasta 16 comprimidos al día.

Indicación

Tratamiento del dolor leve a moderado asociado a inflamación. Reduce la fiebre. Reumatismo.

Contraindicaciones

Hipertensión severa, anemia, enfermedad hepática severa, cardiopatía isquémica. Embarazo y lactancia. Neonatos.



HASSAPIRIN 100®

ENVASES CON 20, 30 Y 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES

Composición

Cada comprimido contiene: Ácido Acetilsalicílico 100 mg.

Dosificación

Niños de 1 a 3 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Indicación

Este medicamento se usa como analgésico en el tratamiento del dolor leve a moderado asociado a inflamación y para reducir la fiebre.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico o a otros salicilatos, asma, Úlceras gastrointestinales graves, Insuficiencia renal o hepática grave, último trimestre del embarazo.

**MINTALUB®**

POMO CON 35 G. DE CREMA

Composición

100 g de crema dérmica contiene: Salicilato de Metilo: 12,8 g, Mentol Natural 5,91 gr.

Dosificación

Aplicar con un pequeño masaje en la zona afectada, 3 a 4 veces al día.

Indicación

Alivio de dolores musculares y articulares, causados por esfuerzos físicos, torceduras, tensión muscular y golpes leves.

Contraindicaciones

Alergia a los salicilatos o a otros componentes de la fórmula.

**NAXODOL GOTAS®**

FRASCO GOTARIO CON 10 ML

Composición

Cada ml de solución oral contiene: Tramadol Clorhidrato 100 mg.

Dosificación

Dosis inicial: 15 a 30 gotas diluidas en agua, cada 4 a 6 horas.
Dosis de mantención: 15 a 30 gotas cada 6 a 8 horas.
No exceder los 400 mg por día.

Indicación

Dolor post-operatorio de pacientes que han sufrido diversas cirugías. Alivio del dolor moderado a severo.

Contraindicaciones

Alergia a Tramadol o medicamentos tipo morfina. Si en las últimas dos semanas ha estado tomando inhibidores de la monoaminooxidasa. Epilepsia no controlada. Función renal alterada y/o enfermedad hepática.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



NOSTADEN®**ENVASES CON 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Ciclobenzaprina Clorhidrato 5 ó 10 mg.

Indicación

Tratamiento sintomático y coadyuvante, tanto en la terapia de reposo como física, para el alivio del espasmo muscular, asociado a condiciones musculoesqueléticas dolorosas y agudas.

Dosificación

Adultos: 5 o 10 mg 3 veces al día. La dosis máxima es de 60 mg diarios.

Contraindicaciones

Alergia a Ciclobenzaprina Clorhidrato o algún otro componente de la fórmula. Hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias y otros desórdenes de bloqueo y conducción cardíaca, durante la recuperación tras un infarto al miocardio. Pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa (moclobemida, selegilina) incluso dentro de los 14 días siguientes terminado el tratamiento.

**PYRIPED®****ENVASE CON 20 CÁPSULAS BLANDAS****Composición**

Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 400 mg.

Indicación


Tratamiento sintomático de estados inflamatorios dolorosos, de leves a moderados y/o estados febriles. Tratamiento de la dismenorrea primaria. Alivio de síntomas y signos de artritis reumatoidea y osteoartritis.

Dosificación

1 cápsula blanda 3 a 4 veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a Ibuprofeno u otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o a cualquier componente de la formulación. Pólipo nasal, angioedema o broncoespasmo desencadenado por otro medicamento como el ácido Acetilsalicílico. Úlcera gastrointestinal, enfermedad hepática o renal severa. Embarazo y lactancia. No se debe usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico) en el periodo inmediato a una cirugía de bypass gástrico.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN

**PYRIPED®****FRASCO CON 100 ML JARABE****Composición**

Cada 5 mL de suspensión oral contiene: Ibuprofeno 100 mg.

Dosificación

Niños de 6 meses a 12 años la dosis es en base al peso corporal, siendo de 5 a 10 mg por kilo de peso (2,5 a 5 mL, para 10 kilos de peso) cada 8 horas. La dosis máxima recomendada es 40 mg/kg de peso, en el día.

Indicación

Tratamiento de estados inflamatorios dolorosos leves a moderados y/o estados febriles.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ibuprofeno, a otros AINEs o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia, niños menores de 6 meses. En ancianos, se debe utilizar la dosis efectiva más baja. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario.



PYRIPED FORTE®

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 mL de suspensión oral contiene: Ibuprofeno 200 mg.

Dosificación

Niños de 6 meses a 12 años la dosis es en base al peso corporal del menor, siendo de 5 a 10 mg por kilo de peso cada 8 horas. La dosis máxima recomendada es 40 mg/kg de peso, en el día. Los tratamientos no deben exceder de una semana sin control médico.

Indicación

Tratamiento sintomático de afecciones dolorosas y/o febriles de niños mayores de 6 meses.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ibuprofeno, a otros AINEs o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia, niños menores de 6 meses. En ancianos, se debe utilizar la dosis efectiva más baja. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN



FRANCIA

**RELATENE®**

ENVASES CON 10 Y 20 CÁPSULAS

Composición

Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 50 mg.

Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos y postquirúrgicos.

Dosificación

Una cápsula de 50 mg, 3 o 4 veces al día.

Contraindicaciones

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Embarazo, lactancia, alergia a Ketoprofeno, otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal o a algún componente de la formulación. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, daño renal o hepático severo.



Producto
Bioequivalente



Cápsulas

RELATENE®

ENVASES CON 10 Y 20 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO

Composición

Cada comprimido con recubrimiento entérico contiene: Ketoprofeno 100 mg.

Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos, postquirúrgicos.

Dosificación

1 comprimido 3 veces al día.

Contraindicaciones

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos; Embarazo, lactancia, alergia a Ketoprofeno, otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal o a algún componente de la formulación. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, daño renal o hepático severo.



Comprimidos

ULTRIMIN®**ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Ergotamina Tartrato 1 mg, Metamizol Sódico Monohidrato 300 mg, Clorfenamina Maleato 1 mg, Cafeína Anhidra 100 mg.

Dosificación

1 o 2 comprimidos al aparecer los primeros síntomas de la jaqueca.

Indicación

Tratamiento de la cefalea vascular, cefalea histaminica y condiciones relacionadas donde la distensión de los vasos craneanos parece ser la causa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación, hipertensión arterial, enfermedad vascular periférica, insuficiencia hepática o renal avanzada. Embarazo y lactancia.



Comprimidos





ALMAXOL®**ENVASES CON 7 Y 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Moxifloxacino clorhidrato 436,33 mg (equivalente a 400 mg de Moxifloxacino)

Indicación

Tratamiento de infecciones cutáneas y tejidos blandos. Tratamiento de adultos (18 años de edad o más) con infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores como: sinusitis aguda, exacerbaciones agudas de bronquitis crónicas, neumonía adquirida en la comunidad por microorganismos sensibles. Infecciones intraabdominales complicadas, incluidas infecciones polimicrobianas como la de los abscesos.

Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) no complicada sin un absceso asociado a la trompa de falopio, ovario o pelvis (por ej. infecciones del aparato genital femenino superior incluyendo salpingitis y endometritis).

Dosificación

La dosis recomendada de Moxifloxacino es 400 mg una vez al día (1 comprimido recubierto) para las indicaciones antes mencionadas. Esta dosis no debe ser excedida.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo u otras quinolonas o algún componente de la formulación. Embarazo y periodo de lactancia. Menor de 18 años de edad (adolescentes y niños en etapa de crecimiento).

**DONTER®****ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada comprimido contiene: Terbinafina (como clorhidrato) 250 mg.

Indicación

Tratamiento de infecciones de la piel y uñas causadas por dermatofitos como Trichophyton, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum y Candida.

Dosificación

Adultos y niños de peso superior a 40 kg: Un comprimido al día. La duración del tratamiento varía según la indicación y la severidad de la infección.

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a Terbinafina o a algún componente de la formulación.

**DONTER®****POMO CON 15 G DE CREMA****Composición**

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Terbinafina Clorhidrato 1g.

Indicación

Tratamiento de tinea corporis, tinea cruris y tinea pedis interdigital y plantar, tinea capitis y onicomicosis.

Dosificación

Aplicar 1 a 2 veces al día sobre la piel limpia y seca, una capa delgada de crema y friccionar suavemente sobre el área afectada.

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a Terbinafina o a algún componente de la formulación.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN



ECUADOR

TRELIBEC FORTE®

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido forte contiene:
Sulfametoxazol 800 mg,
Trimetoprima 160 mg.

Indicación

Infecciones urinarias,
gastrointestinales, otitis media
aguda e infecciones del tracto
respiratorio superior producidas
por organismos susceptibles
demostrado por antibiograma.

Dosificación

Adultos: 1 comprimido, 2 veces
al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a
Sulfametoxazol, otra
Sulfonamida, Trimetoprima o
a alguno de los componentes
de la formulación. Pacientes
con insuficiencia renal o
hepática severa, con deficiencia
de glucosa - 6 - fosfato
deshidrogenasa. Embarazo y
lactancia.



Comprimidos

PRODUCTO
DISPONIBLE EN



COSTA RICA



DIOTENSIL®

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS DE 10MG Y 20MG

Composición

Cada comprimido contiene Enalapril Maleato 10 o 20 mg.

Dosificación

La dosis usual está en el rango de 10-40 mg 1 vez al día o repartida en 2 dosis diarias.

Indicación

Tratamiento de la hipertensión esencial cuando los métodos no farmacológicos han fallado o han sido insuficientes. En combinación con otras drogas en falla cardíaca congestiva.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Enalapril Maleato, otro inhibidor de la enzima convertidora de Angiotensina (ECA) o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con antecedentes de angioedema relacionado a inhibidores de la ACE. Embarazo y lactancia.



Comprimidos

LOPREN®

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: losartán potásico 50mg

Dosificación

1 a 2 comprimidos recubiertos al día. La suspensión del tratamiento debe hacerse en forma gradual para evitar que se produzca un efecto rebote.

Indicación

Hipertensión arterial esencial leve a moderada. Insuficiencia cardíaca congestiva.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Losartán Potásico o a cualquier componente de la fórmula. Enfermedad hepática, al riñón o con estenosis arterio renal. Embarazo y lactancia.



Comprimidos



CREMINEM®**POMO CON 20 G DE CREMA****Composición**

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Clotrimazol 1 g.

Dosificación

La dosis varía de acuerdo con la gravedad y extensión de la lesión dérmica. Aplicar una cantidad suficiente de crema para cubrir el área afectada, habitualmente 2 veces al día.

Indicación

Tratamiento tópico de infecciones por hongos como tinea pitiriasis versicolor y candidiasis.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga o alguno de los componentes de la crema. No debe ser usada en los ojos, ni en lesiones ulceradas. Primer trimestre de embarazo.



Crema dérmica

CREMINEM B®**POMO CON 15 G DE CREMA****Composición**

Cada 100 g de crema contiene: Clotrimazol 1 g, Betametasona (como dipropionato) 0,05 g.

Indicación

Tratamiento de infecciones por hongos como tiñas y candidiasis complicadas con inflamación y prurito.

Dosificación

Adultos: 2 aplicaciones diarias sobre el área afectada. La duración de la terapia debe ser máximo 14 días.

Contraindicaciones

Lesiones cutáneas, infecciones bacterianas, virales, parasitarias. Hipersensibilidad a la droga o alguno de los componentes de la crema. Primer trimestre de embarazo. No debe ser usado en los ojos.



Crema dérmica

PRODUCTO
DISPONIBLE EN**CREMIRIT®****POMO CON 15 G DE CREMA****Composición**

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Betametasona (como dipropionato) 0,05 g.

Indicación

Alivio de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden a corticosteroides.

Dosificación

Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el área afectada 1 o 2 veces al día.

Contraindicaciones

Lesiones ulcerosas, acné, rosácea, dermatitis, lesiones de la piel causadas por infecciones virales primarias. Hipersensibilidad a Betametasona u otros corticoides.



Crema dérmica

PRODUCTO
DISPONIBLE EN

FRAGIDERM®**POMO CON 30 G UNGÜENTO****Composición**

100 g de ungüento dérmico contiene: Benzocaina 2 g, Alcohol Bencilico 4 g.

Dosificación

Aplicar sobre la zona afectada 3 o 4 veces al día, según necesidad

Indicación

Alivio del dolor provocado por el eritema solar, quemaduras menores, abrasiones y picaduras de insectos.

Contraindicaciones

Alergia a Benzocaina u otro anestésico de uso tópico. Preservantes o excipientes de la formulación. Si la zona afectada presenta alguna infección. Niños menores de 2 años.



Ungüento dérmico

LISOVYR®**POMO CON 5G Y 15 G DE CREMA****Composición**

Cada 100 g de Crema dérmica contiene: Aciclovir 5 g.

Indicación

Herpes labial y herpes genital inicial y recurrente. Como coadyuvante del Aciclovir oral en el tratamiento de estas infecciones.

Dosificación

Aplicar 4 - 6 veces al día sobre el área afectada.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No aplicar en los ojos. Embarazadas.



Crema dérmica

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ECUADOR

SORIDERMAL®**POMO CON 20 G DE CREMA****Composición**

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Ketoconazol 2 g.

Indicación

Dermatomicosis debidas a dermatofitos (Trichophyton, Microsporum y Epiderphyton) con diferentes localizaciones, balanopostitis, oniquia y paroniquia.

Dosificación

Aplicar la crema sobre el área afectada, 1 a 2 veces al día, por 2 a 4 semanas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ketoconazol o a alguno de los componentes de la formulación. No debe ser usado en el ojo. Embarazo y lactancia.



Crema dérmica



AC X AZUFRE®**JABÓN BARRA 100G****Indicación**

Jabón en barra anti-imperfecciones Azufre, barra de glicerina vegetal efecto antisebo limpia profundamente.

**Dosificación**

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

AC X CARBÓN®**JABÓN BARRA 100G****Indicación**

Jabón en barra anti-imperfecciones Carbón, barra de glicerina vegetal, disminuye la grasa y el brillo, efecto purificante, con carbón y macropartículas exfoliantes.

**Dosificación**

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

AC X® EXFOLIANTE JABÓN BARRA**JABÓN BARRA 100G****Indicación**

Jabón en barra anti-imperfecciones. Exfoliante, barra de glicerina vegetal, con micropartículas exfoliantes, exfolia suavemente.

**Dosificación**

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

AC X® FORTE

JABÓN BARRA 100G

Indicación

Aplicar sobre la piel húmeda reforzando las zonas con más imperfecciones del rostro y cuerpo. Dejar actuar unos minutos y luego enjuagar con abundante agua. Para mejores resultados utilizar 2 veces al día.



Dosificación

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

AC X® GEL SECANTE CON COLOR PIEL

POMO CON 25G DE GEL

Indicación

Gel secante anti-imperfecciones con color. Disminuye rápidamente las imperfecciones localizadas, cubriendo mientras actúa y atenuando el rojo de la imperfección.



Dosificación

Aplicar la cantidad suficiente directamente sobre la imperfección y dejar secar. De preferencia utilizar antes de dormir, de ser necesario repetir aplicación en la mañana.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

AC X® GEL SECANTE INCOLORO

POMO CON 25G DE GEL

Indicación

Gel secante anti-imperfecciones incoloro. Disminuye rápidamente las imperfecciones localizadas, atenuando el rojo de las imperfecciones.



Dosificación

Aplicar cantidad suficiente directamente sobre la imperfección y dejar secar. De preferencia utilizar antes de dormir, de ser necesario repetir aplicación en la mañana.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

AC X® ESPUMA DE LIMPIEZA FACIAL CORPORAL

FRASCO 200 ML ESPUMA DE LIMPIEZA

Indicación

Espuma de limpieza facial y corporal. Limpia tu cara y cuerpo sin reseca piel, además de ayudar a combatir y prevenir imperfecciones.

Dosificación

Aplicar mediante movimientos circulares sobre la piel húmeda reforzando zonas con más imperfecciones del cuerpo y rostro. Dejar actuar unos minutos y luego enjuagar con abundante agua. Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.





ACIFIN®**ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS MASTICABLES****Composición**

Cada comprimido masticable contiene: Magaldrato 480 mg, Simeticona 100 mg.

Indicación

Antiácido, antiflatulento. contiene magaldrate (antiácido) y simeticona, sustancia encargada de la absorción de los gases generados durante la digestión y que son causantes del malestar.

Dosificación

1 o 2 comprimidos masticables luego de las comidas o en la noche antes de dormir.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Simeticona, Magaldrato o alguno de los componentes de su fórmula. En caso de Insuficiencia Renal grave.



Comprimidos masticables

BALDMIN®**FRASCO GOTARIO CON 15ML****Composición**

Cada 100 mL de solución contiene: Bromuro de Pipenzolato 0,4 g, Fenobarbital 0,6 gr.

Indicación

Tratamiento sintomático de los cólicos de origen digestivo, urinario o ginecológico, especialmente en aquellos asociados a estados de ansiedad.

Dosificación

Niños hasta 1 año: 10 a 15 gotas, 3 veces al día; de 1 a 6 años: 20 a 30 gotas, 3 veces al día; mayores de 6 años: 40 gotas, 3 veces al día.

Contraindicaciones

Hipertrofia prostática, obstrucciones del tubo digestivo, glaucoma de ángulo estrecho. Hipersensibilidad a los principios activos.



Gotas orales

BUTON®**ENVASES CON 10 Y 100 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada comprimido contiene Atropina Sulfato Monohidrato 0,50 mg Papaverina Clorhidrato 40,00 mg.

Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado para su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 1 comprimido 3 a 4 veces al día.

Indicación

Tratamiento sintomático de los espasmos intestinales o renales, dismenorrea y salivación o sudoración excesiva.

Contraindicaciones

Glaucoma, retención urinaria, insuficiencia cardíaca, hipersensibilidad a las drogas. Embarazo y lactancia. Pacientes con obstrucción del tubo digestivo, dolor intestinal de etiología incierta, hipertrofia prostática.



Comprimidos

COLIPER®

ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene:
Loperamida Clorhidrato 2 mg.

Dosificación

En diarrea aguda en adultos:
2 comprimidos (4 mg) y luego 1 comprimido (2 mg) después de cada deposición líquida, máximo 16 mg/día.

Indicación

Tratamiento sintomático de la diarrea aguda no específica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga.
Embarazo y lactancia. Pacientes con colitis pseudomembranosa asociada a antibióticos.

**COLIPER GOTAS®**

FRASCO GOTARIO CON 10 ML

Composición

Cada mL contiene: Loperamida Clorhidrato 2 mg.

Indicación

Tratamiento sintomático de la diarrea aguda no específica

Dosificación

En niños de 6 a 11 años: 2 mg (30 gotas) y luego 1 mg (15 gotas) después de cada deposición líquida.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga.
Embarazo y lactancia. Pacientes con colitis pseudomembranosa asociada a antibióticos.

**DOCIVIN®**

ENVASE CON 30 CÁPSULAS

Composición

Cada cápsula contiene:
Domperidona 10 mg.

Indicación

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos, sensación de ardor en el estómago.

Dosificación

En adultos y niños mayores de 12 años es de 10 mg, 3 a 4 veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Domperidona, embarazo y lactancia, presencia de hemorragia intestinal, obstrucción mecánica o perforación, tumores hipofisarios liberadores de prolactina.


 PRODUCTO
DISPONIBLE EN
 
 HUNGRÍA
DOCIVIN GOTAS®

FRASCO GOTARIO CON 15 ML

Composición

Cada 1 mL de suspensión (20 gotas) para gotas orales contiene: Domperidona 10 mg.

Dosificación

Administrar 15 a 30 minutos antes de las comidas. Niños de 1 a 3 años: 2,5 mL 3 veces al día. De 4 a 7 años: 5 gotas, 5 mL 3 veces al día. De 7 a 12 años: 10 gotas, 7,5 mL 3 veces al día. Dosis usual para mayores de 12 años y adultos: 20 gotas, 10 mL 3 veces al día.

Indicación

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos, sensación de ardor estomacal. Reflujo gastroesofágico.

Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. Cuando la estimulación de la motilidad gástrica puede ser peligrosa (hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación) Pacientes con tumores hipofisarios liberadores de prolactina.





PROSTALIC®**30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA****Composición**

Cada Comprimido Recubierto de Liberación Prolongada contiene Tamsulosina clorhidrato 0,4mg.

Dosificación

Dosis usual diaria de 0,4 mg.

Indicación

Tratamiento de los síntomas funcionales de la Hiperplasia Prostática Benigna.

Contraindicaciones

Pacientes con Hipersensibilidad a Tamsulosina o a cualquier componente del producto, Hipotensión Ortostática observada tempranamente (Historia de Hipotensión Ortostática) o Insuficiencia Hepática severa.

**ZILFIC®****ENVASES CON 1, 2, 5 Y 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Sildenafil (como citrato) 50 mg.

Dosificación


1 comprimido de 50 mg 1 a 4 horas antes de la actividad sexual.

Indicación

Tratamiento de la disfunción eréctil.

Contraindicaciones

No usar en pacientes que presenten Fibrosis Caverosa, calcificación o angulación, desórdenes de sangramiento, Falla cardíaca, angina inestable, hipertensión o hipotensión, arritmias, infarto al miocardio. En Enfermedad hepática o cirrosis, Mielomas o leucemia, priapismo, trombocitopenia, enfermedad de la función renal o Retinitis pigmentosa.

**ZILFIC®****ENVASES CON 1 Y 5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Sildenafil (como citrato) 100 mg.

Dosificación

1 comprimido de 100 mg 1 a 4 horas antes de la actividad sexual.

Indicación

Tratamiento de la disfunción eréctil.

Contraindicaciones

No usar en pacientes que presenten Fibrosis Caverosa, calcificación o angulación, desórdenes de sangramiento, Falla cardíaca, angina inestable, hipertensión o hipotensión, arritmias, infarto al miocardio. En Enfermedad hepática o cirrosis, Mielomas o leucemia, priapismo, trombocitopenia, enfermedad de la función renal o Retinitis pigmentosa. Hipersensibilidad a la droga o a alguno de los componentes de la formulación.





TAVIST XR®**30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA****Composición**

Cada comprimido de liberación prolongada contiene Metformina Clorhidrato 500 mg.

Cada comprimido de liberación prolongada contiene Metformina Clorhidrato 1000 mg.

Indicación

Indicado para mejorar el control glicémico en adultos con Diabetes tipo 2.

Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento según el caso particular de cada uno. La dosis máxima recomendada es de 2000 mg / día.

Contraindicaciones

Alergia a la Metformina o a cualquiera de los componentes de la formulación, si padece de Diabetes Mellitus Juvenil (insulina dependiente o tipo I), en Diabetes complicadas con acidosis o cuando existe insuficiencia o disfunción renal (aclaramiento de creatinina < 60 mL / min).





ADESNA®**ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada comprimido contiene: Ácido Mefenámico 500 mg.

Indicación

Dolor leve a moderado de variada etiología. Alivio sintomático de la dismenorrea primaria y en el dolor post-insercción de DIU.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: 500 mg seguidos de 250 mg cada 6 horas, por un período de 2 a 3 días.

Contraindicaciones

No usar en: Casos de hipersensibilidad a la droga o que han sufrido reacciones de hipersensibilidad a aspirina u otros agentes antiinflamatorios no esteroideos. Pacientes con úlcera activa o con inflamación crónica del tracto gastrointestinal alto o bajo. En embarazo y lactancia. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by pass coronario.



Comprimidos

**AXANT®****FRASCO CON 200 ML SOLUCIÓN ORAL 65%****Composición**

Cada 100 ml contiene: Lactulosa al 65% 128,14 g (equivalente a 65 g de lactulosa).

Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

- Constipación crónica: 15 a 30mL al día. Se requieren de 24 a 48 horas para obtener un adecuado movimiento intestinal.
- Encefalopatía portal: inicialmente, 30 a 45mL 3 o 4 veces al día. Luego la dosis debe ser ajustada según los requerimientos de cada paciente hasta obtener 2 a 3 deposiciones con heces blandas al día.

Indicación

Prevención y tratamiento de la encefalopatía portal sistémica y tratamiento sintomático del estreñimiento crónico.

Contraindicaciones

Pacientes con diabetes mellitus o que requieran baja dieta de galactosa, sangramiento rectal no diagnosticado, obstrucción intestinal, falla cardíaca congestiva, hipertensión, apendicitis o síntomas de apendicitis, hipersensibilidad.



Solución oral

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ISTEFRAL®**ENVASE CON 30 CÁPSULAS****Composición**

Cada cápsula contiene: Sulpirida 50 mg.

Indicación

Estados ansioso-depresivos y depresivo-reactivos; depresión del anciano; colopatía funcional; cefálea psicógena.

Dosificación

La dosis usual recomendada es: En estados ansiosos moderados del adulto: 50 mg a 150 mg al día.

Contraindicaciones

Está contraindicado en pacientes que presentan hipersensibilidad al fármaco, en desórdenes hepáticos y extrapiramidales, feocromocitoma, síndrome de excitación psicomotriz y primer trimestre del embarazo.



Cápsulas

JULIETTE®**ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene Clormadinona Acetato 2.00 mg; Etinilestradiol 0.03 mg.

Dosificación

Tome su comprimido de preferencia a la misma hora todos los días, si es necesario con un poco de agua, sin masticarlo. Siga la dirección de las flechas hasta que se haya tomado todos los 21 comprimidos. Durante los 7 días siguientes no tome ningún comprimido.

Indicación

Anticonceptivo hormonal. Tratamiento de acné pápulo-pustular moderado en mujeres para quienes está indicada la anticoncepción hormonal con etinilestradiol/clormadinona acetato.

Contraindicaciones

No se debe utilizar anticonceptivos orales Combinados en presencia de ninguna de las siguientes enfermedades: Riesgo de Tromboembolismo venoso, Cirugía mayor con inmovilización prolongada, riesgo de Tromboembolismo arterial, historial de migraña con síntomas neurológicos focales, hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.



Comprimidos



LADYGEX®**ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada estuche contiene un blister con 28 comprimidos, 21 con principio activo: Drospirenona 3 mg. y Etinilestradiol 30 mcg. 7 comprimidos con placebo.

Dosificación

Los comprimidos deben tomarse por vía oral en el orden indicado en el blister, a la misma hora, todos los días, con líquido si fuera necesario. Se debe iniciar tomando un comprimido de color amarillo pálido, diariamente y de forma consecutiva, durante los primeros 21 días. Al terminar los comprimidos de color amarillo, continuar con la toma de los comprimidos de color blanco, diariamente y de forma consecutiva por 7 días. Al terminar el último comprimido blanco, iniciar al día siguiente un nuevo envase.

Indicación

Es un anticonceptivo oral combinado (AOC) que trabaja principalmente suprimiendo la ovulación. Además, los agentes AOC causan cambios del moco cervical que bloquean la penetración del esperma y cambios endometriales que reducen la probabilidad de implantación.

Contraindicaciones

Trastornos tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas, influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes de Ladygex®.



Comprimidos

**LADYGEX-20®****ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada estuche contiene un blister con 28 comprimidos, 24 con comprimido activo: Drospirenona (Micronizado) 3.00 mg; Etinilestradiol (Micronizado) 0.02 mg. 4 comprimidos con placebo.

Dosificación

Los comprimidos deben tomarse todos los días aproximadamente a la misma hora con un vaso de agua. La toma de comprimidos es continua, se debe tomar un comprimido diariamente durante 28 días consecutivos, primero se deben tomar los 24 comprimidos activos y luego los 4 comprimidos inactivos. Cada nuevo envase se empieza al día siguiente de terminar el último comprimido placebo del envase anterior.

Indicación

Anticonceptivo oral combinado (AOC) que contiene 2 hormonas femeninas (etinilestradiol y drospirenona) presentes en bajas dosis. Hace que el ciclo sea más regular, la menstruación suele ser menos dolorosa y la hemorragia menos intensa, lo cual puede disminuir la incidencia de un déficit de hierro (anemia).

Contraindicaciones

Trastornos tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas, influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes de Ladygex®.



Comprimidos

MATIDAN®**ENVASE CON 30 CAPSULAS CON MACROCRISTALES.****Composición**

Cada cápsula contiene:
Nitrofurantoina 100mg
(macrocristales).

Dosificación

Administrar con las comidas.
Adultos: 100 mg 3 veces/día. La terapia debe prolongarse como mínimo 1 semana y por lo menos 3 días después que se ha logrado la ausencia de bacterias en la orina.

Indicación

Infecciones del tracto urinario causadas por bacterias sensibles a la nitrofurantoina.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Nitrofuranos.
Embarazo y lactancia.
Niños menores de un mes.



Cápsulas

**MINEVA E®****ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada estuche contiene 21 comprimidos activos de color blanco y 7 comprimidos placebo inactivos de color amarillo.
Cada comprimido recubierto activo de color blanco contiene Levonorgestrel (Micronizado) 0,150 mg y Etinilestradiol (Micronizado) 0,030 mg.

Dosificación

Tomar el comprimido recubierto sin masticar, con algo de líquido y siempre a la misma hora. El tratamiento se inicia el 1º día de su ciclo menstrual (1º día de sangrado). Comience con los comprimidos de color blanco (en total 21). Luego de la toma del último comprimido blanco, se inicia con los comprimidos de color amarillo (en total 7) Una vez concluidos los comprimidos de color amarillo debe iniciar la administración de un nuevo envase (haya o no experimentado menstruación).

Indicación

Anticonceptivo oral.

Contraindicaciones

No se debe utilizar en las siguientes condiciones. Si cualquiera de estos cuadros aparece por primera vez durante su uso, se debe suspender inmediatamente el tratamiento. Presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), Presencia o riesgo de tromboembolismo arterial (TEA). Embarazo conocido o sospecha del mismo, hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Hemorragia vaginal no diagnosticada, presencia o antecedentes de tumores hepáticos, sospecha de tumores malignos dependientes de los esteroides sexuales.



Comprimidos

PLAZOLIT®**FRASCO GOTARIO CON 15 ML****Composición**

Cada 100 ml de solución para gotas orales contiene: Pargeverina Clorhidrato 0,50g.

Indicación

Tratamiento de espasmos de origen intestinal, biliar, renal y del aparato genito urinario.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es: 1 mL (30 gotas) 3 a 5 veces al día.

Contraindicaciones

Glaucoma de ángulo abierto, uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, estenosis pilórica, íleo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave, miastenia gravis.



Gotas orales

PRODUCTO DISPONIBLE EN



VENEZUELA

PLAZOLIT® FORTE

FRASCO GOTARIO CON 15 ML

Composición

Cada 100 ml de solución para gotas orales contiene: Pargeverina Clorhidrato 1,000g.

Indicación

Tratamiento de espasmos de origen intestinal, biliar, renal y del aparato genitourinario.

Dosificación

Dosis usual recomendada es 1 mL (30 gotas) 3 a 5 veces al día.

Contraindicaciones

Glaucoma de ángulo abierto, uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, estenosis pilórica, ileo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave, miastenia gravis.

**PRENAL®**

ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Gestodeno micronizado 0,0750mg / Etinilestradiol micronizado 0,0200 mg.

Dosificación

Los comprimidos deben tomarse en el orden indicado todos los días aproximadamente a la misma hora, con un poco de líquido si es necesario. Se tomará un comprimido diario durante 21 días consecutivos. Comenzar a tomar el siguiente envase el día 8.

Indicación

Anticoncepción oral.

Contraindicaciones

Presencia o antecedentes de tromboembolismo (trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar) con o sin factores de riesgo. Presencia o antecedentes de tromboembolismo arterial (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular) o estadios prodrómicos (por ejemplo: ataque isquémico transitorio,

angina de pecho). Predisposición hereditaria o adquirida a trombosis venosa o arterial, tal como proteína C activada falta de APC resistente, deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidicos (anticardiolipina, anticoagulante lúpico). Presencia de factores de riesgo para una trombosis arterial. Hipertensión grave. Diabetes complicada con micro o macroangiopatía. Dislipoproteinemia grave. Enfermedades malignas o sospecha de estas en órganos genitales o mamas dependiente de esteroides sexuales. Presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave mientras los valores de la función hepática no han vuelto a la normalidad. Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). Hemorragia vaginal no diagnosticada. Migraña con sintoma focal neurológico. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.



SAGRAS®**ENVASES CON 42 Y 105 CÁPSULAS****Composición**

Cada cápsula contiene: Orlistat 120 mg.

Indicación

Tratamiento a largo plazo de la obesidad, incluidos aquellos pacientes que presentan factores de riesgo asociados a la obesidad. El tratamiento debe apoyarse en una dieta hipocalórica moderada.

Dosificación

Una cápsula 3 veces al día, tomada inmediatamente antes, durante la misma o hasta una hora después de cada comida principal. Si una comida no contiene grasa, puede omitirse la dosis.

Contraindicaciones

Malabsorción crónica, colestasis, lactancia. Hipersensibilidad al Orlistat o algún otro componente de la formulación. No se recomienda el uso durante el embarazo. No se recomienda su uso junto a vitaminas liposolubles.



Cápsulas

PRODUCTO
DISPONIBLE EN

PARAGUAY

**SOLUNA®****ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada estuche contiene un blister con 28 comprimidos que contienen: Desogestrel 0.075 mg.

Indicación

Anticonceptivo con solo progestágeno. Es más adecuado para utilizarlo durante la lactancia y en mujeres que no pueden o no quieren utilizar estrógenos.

Dosificación

Se debe ingerir el comprimido entero, con agua. Cuando se termine un blister se debe comenzar el blister nuevo al día siguiente, sin interrupción y sin sangrado.

Contraindicaciones

Trastorno tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes de Soluna®.



Comprimidos

SOLUNA E®**ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada estuche contiene un blister con 21 comprimidos que contienen:

Desogestrel 0.150 mg y
Etinilestradiol 0.03 mg.

Indicación

Combinación que principalmente impide la ovulación y produce cambios en el endometrio y el mucus cervical para disminuir la posibilidad de fertilización e implantación.

Dosificación

Un comprimido diariamente por 21 días consecutivos, aproximadamente a la misma hora, si es necesario con un poco de líquido, en el orden que muestre el blister. Cada envase siguiente se debe tomar luego de 7 días sin comprimidos.

Contraindicaciones

Trastorno tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes de Soluna® E.



Comprimidos

**SOLUNA E - 20®****ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS****Composición**

Cada estuche contiene un blister con 21 comprimidos que contienen:

Desogestrel 0.150 mg y
Etinilestradiol 0.02 mg.

Indicación

Este medicamento es un anticonceptivo oral combinado (AOC) que contiene 2 hormonas femeninas (etinilestradiol y desogestrel) presentes en bajas dosis. Se utiliza en anticoncepción oral.

Dosificación

Un comprimido diariamente por 21 días consecutivos, aproximadamente a la misma hora, si es necesario con un poco de líquido, en el orden que muestre el blister. Cada envase siguiente se debe tomar luego de 7 días sin comprimidos.

Contraindicaciones

Trastornos tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas, influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes de Soluna® E-20.



Comprimidos

VITOMIT®**30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO****Composición**

Cada Comprimido con Recubrimiento Entérico contiene:
 Doxilamina Succinato 10,0 mg,
 Piridoxina Clorhidrato 10,0 mg.

Indicación

Alivio de náuseas y vómitos en el embarazo.

Dosificación

Adultos: Si las náuseas son matutinas, tomar 2 comprimidos al acostarse. Si las náuseas se mantienen durante el día se recomienda tomar un comprimido por la mañana y otra a media tarde.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a piridoxina, doxilamina o a cualquiera de los excipientes de la formulación. Hipersensibilidad a algún otro antihistaminico H1. Crisis asmáticas. Porfiria (enfermedad que afecta los glóbulos rojos de la sangre).



Comprimidos

 PRODUCTO
 DISPONIBLE EN


ASMAVENT SF®

INHALADOR BUCAL 200 DOSIS

Composición

Cada dosis-medida contiene:
Salbutamol 100 mcg.

Indicación

Indicado para el tratamiento y prevención del broncoespasmo en pacientes con obstrucción reversible de la vía aérea.

Dosificación

La dosis usual recomendada es de 100 a 200 mcg (1 ó 2 puff) cada 4 - 6 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Salbutamol o algún excipiente de la formulación. Asmavent está contraindicado en pacientes con arritmias cardíacas, insuficiencia coronaria, enfermedad cardíaca isquémica.



PRODUCTO DISPONIBLE EN

**BAUXOL®**

FRASCO CON 100 ML JARABE ADULTO E INFANTIL

Composición

Cada 100 mL de jarabe Adultos contiene: Bromhexina Clorhidrato 40 mg, Clofedianol Clorhidrato 250 mg. Cada 100 mL de jarabe Infantil contiene: Bromhexina Clorhidrato 20 mg, Clofedianol Clorhidrato 140 mg.

Indicación

Afecciones broncopulmonares agudas y crónicas que presentan tos con secreción. Tos recurrente, bronquitis con expectoración, nasofaringitis y faringitis.

Dosificación

Adultos: 10 mL 3 veces al día.
Niños: 5 a 10 mL de jarabe infantil 3 veces al día.

Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. No administrar en forma conjunta con depresores del SNC. Hipersensibilidad a los principios activos, u otro componente de la formulación. En menores de 2 años.

**BROMFIN®**

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene Bromhexina Clorhidrato 8 mg.

Dosificación

Adultos: La dosis oral usual de Bromhexina Clorhidrato en adultos y niños mayores de 12 años es de 8 mg (5 mL; una cucharadita) cada 8 horas.
Niños: La dosis oral usual en niños entre 6-12 años es de 4 mg (2,5 mL; media cucharadita) cada 8 horas. Para niños de 2-6 años, la dosis recomendada es de 4 mg (2,5 mL; media cucharadita) cada 12 horas, o bien 0,5 mg/kg/día, dividido en dosis cada 8 horas.

Indicación

Indicado para el alivio de la tos productiva (con secreción o flema). Tratamiento de bronquitis crónica suave o moderada y otras bronconeumopatías crónicas obstructivas, y bronquitis aguda.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con antecedentes de Úlcera Péptica, en personas que hayan presentado alergia a Bromhexina Clorhidrato, a algún excipiente de la formulación, o alergia a Ambroxol. No se debe utilizar Bromhexina Clorhidrato para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.



BRONTEC®**FRASCO CON 100 ML JARABE****Composición**

Cada 100 mL de Jarabe contiene: Extracto seco de Hedera hélix 0,7 g (equivalente a 45 mg de Hederacóside C.)

Dosificación

Brontec debe agitarse antes de usar. Niños de 1 a 4 años: 2,5 mL 3 veces al día. Niños de 4 y más años: 5 mL 3 veces al día. Adultos: 5 mL 3 a 5 veces al día.

Indicación

Tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias, acompañadas de tos.

Contraindicaciones

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia. Niños menores de un año.



Solución oral

PRODUCTO DISPONIBLE EN

**BUCOGERM®****ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS MASTICABLES****Composición**

Cada comprimido masticable contiene: Clorhexidina Diclorhidrato 5 mg, Noscapina 10 mg.

Indicación

Alivio de la tos no productiva asociada a infecciones bucofaringeas leves.

Dosificación

La dosis usual es de 1 a 2 comprimidos masticables, 4 a 6 veces al día. Se sugiere disolver lentamente en la boca.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad de algún componente de la formulación. Embarazo y lactancia.



Comprimidos masticables

MINTAMOX®**FRASCO CON 100 ML JARABE****Composición**

Cada 5 ml de Jarabe Infantil contiene: Ambroxol Clorhidrato 15 mg.

Cada 5 ml de jarabe Adultos contiene: Ambroxol Clorhidrato 30 mg.

Dosificación

Jarabe infantil: niños de 2 a 5 años: 2,5 mL 3 veces al día; niños de 6 a 12 años: 5ml 3 veces al día.

Jarabe Adultos: adultos y mayores de 12 años: 5ml 3 veces al día.

Indicación

Afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieren tratamiento secretolítico.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ambroxol clorhidrato o a alguno de los componentes de la fórmula. Primer trimestre de embarazo. Precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal o en tratamiento con anticoagulantes.



Solución oral

NASOLVER®

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene:
Codeína Fosfato 10 mg,
Pseudoefedrina Clorhidrato 30mg
Clorfenamina Maleato 2 mg.

Indicación

Alivio de la tos asociada a resfrió común, bronquitis, tos irritativa y tos del fumador.

Dosificación

Niños mayores de 12 años y adultos la dosis usual recomendada es de 10 ml cada 4 a 6 horas (no exceder de 60 ml/día).

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a codeína, pseudoefedrina o clorfenamina maleato o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con hipertensión severa, anemia, cardiopatía isquémica. Embarazo y lactancia.



Solución oral

RINOSTERYL®

FRASCO CON 30 ML

Composición

Cada 100 mL de solución nasal contiene: Cloruro de Sodio 0,9 g.

Indicación

Higiene y lavado de las fosas nasales en niños y adultos, cuando las condiciones fisiológicas lo requieren: congestión nasal, irritación nasal, ardor, obstrucción, resfrios, coriza y heridas nasales.

Dosificación

1 o 2 aplicaciones en cada fosa nasal, según necesidad.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al cloruro de sodio. Problemas de coagulación.



Solución nasal

TULOX®

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe Adulto contiene: Oxolamina (como fosfato) 50mg.
Cada 5 ml de jarabe infantil contiene: Oxolamina (como fosfato) 28mg.

Indicación

Tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

Dosificación

Adultos y niños mayores de 12 años: 5 - 10 ml de jarabe Adultos cada 4 horas.
Niños de 2 a 11 años: 2,5 - 5 ml de jarabe Infantil cada 4 horas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Oxolamina o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia.



Solución oral



LOFWIN®**ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Sertralina (Como Clorhidrato)
50 mg. y 100 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada : 50 mg/ día, en caso de no obtener respuesta la dosis puede ser aumentada paulatinamente hasta llegar a una dosis máxima de 200 mg/día.

Indicación

Tratamiento de los síntomas de depresión mayor. Tratamiento de desórdenes obsesivo compulsivo. Ataques de pánico con o sin agorafobia.

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a antidepresivos IMAO, en terapia con IMAO, depresión con tendencia de suicidio, alteraciones de la función hemodinámica, manía, insuficiencia renal o hepática, anorexia o problemas de peso, embarazo y lactancia.



Comprimidos

NEUROSTAB®**ENVASE CON 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO****Composición**

Cada cápsula con gránulos con recubrimiento entérico contiene 354,000 mg de Duloxetina clorhidrato, equivalente a 60 mg de Duloxetina.

Dosificación

Via oral. La dosis usual recomendada es:

- Para trastorno depresivo mayor, dolor neuropático periférico de origen diabético, fibromialgia y dolor crónico musculoesquelético: 60 mg una vez al día.
- Para trastorno de ansiedad generalizada: La dosis normal de inicio de Duloxetina es de 30 mg una vez al día, después de lo cual el Médico puede aumentarla a 60 mg una vez al día.

Indicación

Trastorno Depresivo Mayor.
Trastorno de Ansiedad Generalizada. Neuropatia Periférica de origen Diabético, Fibromialgia, Dolor Musculoesquelético Crónico.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad, enf. hepática que produzca I.H., I.R. grave, HTA no controlada. En combinación con: IMAO irreversibles no selectivos; inhibidores potentes de CYP1A2 como fluvoxamina, ciprofloxacino o enoxacino. Hipersensibilidad, enf. hepática que produzca I.H., I.R. grave, HTA no controlada. En combinación con: IMAO irreversibles no selectivos; inhibidores potentes de CYP1A2 como fluvoxamina, ciprofloxacino o enoxacino.



Producto Bioequivalente



Cápsulas

NEZEL XR®**ENVASE CON 30 CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA****Composición**

Cada cápsula con gránulos recubiertos de liberación prolongada contiene 167,100 mg de Venlafaxina clorhidrato, equivalente a 75 mg de Venlafaxina.

Dosificación

75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).

Indicación

Depresión mayor. Prevención de recurrencias de episodios depresivos mayores. Además las formas de liberación prolongada en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social y trastorno de pánico con o sin agorafobia.

Contraindicaciones

75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).



Cápsulas LP

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ECUADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NEZEL XR**ENVASE CON 30 CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA****Composición**

Cada cápsula con gránulos recubiertos de liberación prolongada contiene 334,200 mg de Venlafaxina clorhidrato, equivalente a 150 mg de Venlafaxina.

Dosificación

75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).

Indicación

Depresión mayor. Prevención de recurrencias de episodios depresivos mayores. Además las formas de liberación prolongada en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social y trastorno de pánico con o sin agorafobia.

Contraindicaciones

75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).



Cápsulas LP

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ECUADOR

HONDURAS

ZONIX®**ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Zopiclona 7.5 mg.

Indicación

Tratamiento a corto plazo del insomnio, caracterizado por la dificultad que tiene el paciente en quedarse dormido, despertar frecuente en la noche o despertar temprano en la mañana. Cuando comienzan los disturbios al dormir, se pueden presentar síntomas de desorden físico o psiquiátrico, por lo tanto, el paciente debe ser evaluado farmacológicamente antes de iniciar el tratamiento con zopiclona.

Dosificación

En pacientes adultos la dosis es de 7,5 mg a la hora de acostarse. En pacientes geriátricos, pacientes con enfermedad de la función hepática, o en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica la dosis inicial debe ser reducida a la mitad, ya que el clearance puede ser prolongado, y por lo tanto aumentar el potencial de los efectos adversos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo. La zopiclona está contraindicado en insuficiencia respiratoria grave. No se recomienda su empleo en niños menores de 15 años.





FORTOTAL ACTIVE +

ENVASE CON 30 CÁPSULAS BLANDAS

Composición

Cada cápsula blanda contiene:
 Vitamina A 1000 mcg, Vitamina C 61 mg, Vitamina D3 7,5 mcg, Vitamina E 50 mg, Vitamina B1 3 4 mg, Vitamina B2 2 mg, Vitamina B3 20 mg, Vitamina B6 33 mg, Biotina 90 mcg, Hierro 25 mg, Magnesio 76 mg, Zinc 20 mg, Selenio 60 mcg.

Dosificación

Consumir máximo 1 cápsula blanda al día con abundante agua.

Indicación

Estados carenciales de vitaminas y minerales.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad, hipercalcemia o hipercalcúria, I.R. e I.H. grave, enf. hepáticas o colestasis causada por aclaramiento biliar de minerales insuficiente, enf. de Leber, hipervitaminosis de cualquier vit. o exceso de cualquier mineral u oligoelemento incluido en la preparación, osteodistrofia renal con hiperfosfatemia, urolitiasis por fosfato amónico magnésico infectadas. En embarazo: dosis > 100 mg vit. C.



Cápsulas blandas

MINTAVIT CENVASE CON 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES 100 MG
ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES 500 MG**Composición**

Cada comprimido masticable contiene: Vitamina C 100 mg.
 Cada comprimido masticable contiene: Vitamina C 500 mg.

Indicación

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de vitamina C.

Contraindicaciones

Presencia de úlcera gástrica, embarazo, lactancia o uso de cualquier componente de la fórmula.
 Niños mayores de 12 años y niños mayores de 12 años: 500 mg a 1 gramo por día.



Comprimidos masticables



The background is a solid orange color. It features several white geometric elements: a circle in the upper left, a partial circle on the left edge, and two large, sweeping white curves that originate from the top and bottom edges and curve towards the center. The word "Genéricos" is written in white, sans-serif font at the bottom center.

Genéricos

AC ACETILSALICÍLICO

ENVASE CLÍNICO CON 1000 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene: Ácido Acetilsalicílico 100 mg.

Indicación

Estados febriles y para aliviar el dolor leve a moderado de estados inflamatorios como el dolor dental y de oídos, dolores reumáticos y lumbago. También se utiliza para prevenir la formación de coágulos en pacientes con riesgo cardiovascular elevado (riesgo de infarto al miocardio o accidente cerebro vascular).

Dosificación

Dosis recomendadas en niños son: Niños entre 1 a 3 años se recomienda 1 comprimido de 100 mg, 3 veces al día. Niños entre 4 a 6 años se recomiendan hasta 2 comprimidos de 100 mg, 3 veces al día. Niños entre 7 a 9

años se recomiendan hasta 3 comprimidos de 100 mg, 3 veces al día. Se recomienda administrar después de las comidas para evitar la aparición de molestias gastrointestinales.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, a otros salicilatos, a antiinflamatorios no esteroideos o a la tartrazina (reacción cruzada) o a alguno de los excipientes incluidos. Úlcera gastroduodenal aguda, crónica o recurrente; molestias gástricas de repetición. Antecedentes de hemorragia o perforación gástrica tras el tratamiento con ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos. Pacientes con pólipos nasales asociados a asma que sean inducidos o exacerbados por el ácido acetilsalicílico.



Producto Bioequivalente



Comprimidos



CLONIXINATO DE LISINA

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg.

Indicación

Tratamiento del dolor leve a moderado. Dolor como sintoma principal o secundario, de diversa etiología, intensidad y localización. Alta eficacia en dolor de tipo: odontológico, traumatológico, reumatológico, ginecológico, urogenital, oncológico, otorrinolaringológico, neurológico, quirúrgico y posquirúrgico.

Dosificación

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos recubiertos 3 a 4 veces al día. Máximo 6 comprimidos al día.

Contraindicaciones

Alergia a Clonixinato de Lisina u otro analgésico no esterooidal o a cualquier componente de la formulación. No debe usar AINES con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario. Alcohol durante el tratamiento. Embarazo y lactancia.



Comprimidos recubiertos

KETOPROFENO

ENVASE CON 20 CÁPSULAS

Composición

Cada cápsula contiene:
Ketoprofeno 50 mg.

Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos y postquirúrgicos.

Dosificación

Una cápsula de 50 mg, 3 o 4 veces al día.

Contraindicaciones

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Embarazo, lactancia, alergia a Ketoprofeno, otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal o a algún componente de la formulación. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, daño renal o hepático severo.



Cápsulas

KETOPROFENO

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROGRAMADA

Composición

Cada comprimido con recubrimiento entérico contiene: Ketoprofeno 200 mg.

Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos y postquirúrgicos.

Dosificación

1 comprimido al día.

Contraindicaciones

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Embarazo, lactancia, alergia a Ketoprofeno, otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal o a algún componente de la formulación. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, daño renal o hepático severo.



Comprimidos LP

KETOROLACO TROMETAMOL

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Ketorolaco Trometamol 10 mg.

Indicación

Alivio durante periodos cortos del dolor moderado a severo post operatorio, incluidos los dolores abdominales, ginecológicos, oftalmológicos, ortopédicos o cirugía urológica. También se utiliza en el alivio de cólicos renales agudos, dolor asociado con trauma y dolor visceral asociado con cáncer.

Dosificación

Adultos: 10 mg 3 o 4 veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ketorolaco Trometamol u otros AINEs. Úlcera péptica activa. Embarazo y lactancia. Falla renal. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario.



Comprimidos recubiertos

MELOXICAM

ENVASE CON 10/15 COMPRIMIDOS BE.

Composición

Cada comprimido contiene:
Meloxicam 15 mg o 7,5 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 7,5 ó 15 mg 1 vez al día.

Indicación

Tratamiento sintomático (dolor e inflamación) de patologías osteoarticulares, especialmente de artritis reumatoidea, osteoartritis dolorosa (artritis, enfermedad articular degenerativa).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al principio activo. Tratamiento con aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos. Úlcera péptica activa. Insuficiencia hepática o renal severa. Embarazo o durante la lactancia. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de by-pass coronario. Uso en embarazo y lactancia: No se recomienda su uso durante el embarazo o la lactancia.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



METAMIZOL

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE.

Composición

Cada comprimido contiene:
Metamizol Sódico Monohidrato 300 mg

Dosificación

Dosis usual recomendada es:
Adultos: 1 a 2 comprimidos 2 a 4 veces/día. Niños: 1/2 a 1 comprimido 3 a 4 veces/día.

Indicación

Cefaleas, neuralgias, reumatismo, lumbago, dolores postoperatorios. Tratamiento sintomático en gripe, resfrios, neumon

Contraindicaciones

Pacientes que sean sensibles (alérgicos) a las pirazolonas (Metamizol Sódico) o a cualquier componente de la fórmula y que sufran de enfermedades metabólicas (porfiria hepática o déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) no deben consumir este medicamento. No debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de by-pass coronario.



NAPROXENO

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE.

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Naproxeno Sódico 550 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 550 mg 2 veces al día.

Indicación

Alivio del dolor leve a moderado, tratamiento sintomático de la inflamación leve a moderadamente severa, aguda o crónica de tejidos musculares esqueléticos y blando. Dismenorrea.

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Naproxeno Sódico u otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

B Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN

		
BOLIVIA	ECUADOR	HONDURAS
		
PARAGUAY		

PARACETAMOL INFANTIL

ENVASE CON 100 O 20 COMPRIMIDOS MASTICABLES

Composición

Cada comprimido masticable contiene Paracetamol 80 mg.

Dosificación

La dosis a administrar en niños es por kilo de peso corporal, 10 a 15 Mg por kilo de peso, la que debe ser administrada hasta 4 veces al día, con una dosis máxima diaria de 60 Mg por kilo de peso.

Indicación

Tratamiento sintomático de estados dolorosos leves a moderados y febriles.

Contraindicaciones

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones: Hepatitis, daño hepático o renal severo. Alergia al Paracetamol o a algún componente de la fórmula.

 Comprimidos masticables

TRAMADOL

ENVASE CON 10 CÁPSULAS BE.

Composición

Cada cápsula contiene: Tramadol Clorhidrato 50 mg.

Dosificación

Dosis inicial recomendada en adultos es de 1 a 2 cápsulas, seguida de 1 a 2 cápsulas cada 6-8 horas, sin sobrepasar la dosis diaria de 400mg (8 cápsulas). La dosis debe ajustarse según el grado del dolor y la respuesta individual de cada paciente.

Indicación

Alivio del dolor moderado a severo. De igual forma se

utiliza para aliviar el dolor postoperatorio de pacientes que han sufrido diversas cirugías.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga o a alguno de los componentes de la formulación. Tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa o durante las 2 primeras semanas de su retirada.

B Producto Bioequivalente  Cápsulas

PRODUCTO DISPONIBLE EN

	
BOLIVIA	ECUADOR

CLORFENAMINA MALEATO

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Clorfenamina Maleato 4 mg.

Indicación

Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional o perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgicas, reacciones alérgicas cutáneas no complicadas o leves como prurito, o por transfusión de sangre, rinorrea, eczema alérgico, dermatitis de contacto y reacciones anafilácticas junto a epinefrina, luego que las manifestaciones agudas han sido controladas.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 4 mg (1 comprimido) cada 4 a 6 horas, no excediéndose de 24 mg (6 comprimidos) en 24 horas.

Contraindicaciones

Alergia a Clorfenamina Maleato o a cualquier componente de la formulación. Embarazo y lactancia. Pacientes que reciben terapia con IMAO.



LORATADINA

FRASCO CON 90/60 ML JARABE BE

Composición

Cada 5 ml de jarabe contiene:
Loratadina 5 mg.

Indicación

Tratamiento de la congestión nasal, estornudos y rinorrea y en alergias de diversos tipos.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 10 mg (10 ml de Jarabe) al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga.
Embarazo.



PREDNISONA

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE.

Composición

Cada comprimido contiene:
Prednisona 5 mg.

Indicación

Tratamiento de variadas enfermedades endocrinas, osteomusculares, del colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratorias, hematológicas, neoplásicas y de otros tipos con respuesta conocida al tratamiento con glucocorticoides.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 5 a 60 mg al día, dependiendo de la condición de cada paciente y de la patología que desea tratar.

Contraindicaciones

Embarazo, mujeres que planean embarazarse y lactancia. Alergia a Prednisona o a cualquier componente de la formulación. Úlcera gastroduodenal activa. Osteoporosis severa. Ciertas alteraciones psiquiátricas.





ACICLOVIR

ENVASE CON 24 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Aciclovir 200 mg.

Dosificación

Dosis oral de 200 mg cada 4 horas.

Indicación

Infecciones por virus herpes simple tipo I y II. Virus varicela zoster.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al fármaco. Evitar uso en embarazo y en lactancia (sólo estricta necesidad).



PRODUCTO DISPONIBLE EN



ACICLOVIR

ENVASE CON 35 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Aciclovir 400 mg.

Dosificación

Dosis oral de 200 mg cada 4 horas.

Indicación

Infecciones por virus herpes simple tipo I y II. Virus varicela zoster.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al fármaco. Evitar uso en embarazo y en lactancia (sólo estricta necesidad).



PRODUCTO DISPONIBLE EN



ACICLOVIR 5% CREMA

POMO CON 5G DE CREMA

Composición

Cada 100 g de Crema dérmica contiene: Aciclovir 5 g.

Dosificación

Aplicar 4 - 6 veces al día sobre el área afectada.

Indicación

Herpes labial y herpes genital inicial y recurrente. Como coadyuvante del Aciclovir oral en el tratamiento de estas infecciones.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No aplicar en los ojos. Embarazadas.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



AMOXICILINA 500mg

ENVASE CON 21 CÁPSULAS BE

Composición

Cada cápsula contiene:
Amoxicilina (como Trihidrato)
500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: en adultos es de 500 a 750 mg cada 8 horas y en niños sobre 3 meses, la dosis se basa en el peso corporal del paciente y es de 20 a 40 mg por kg de peso al día, repartido en 3 dosis. En niños menores de 3 meses, la dosis sólo debe ser indicada por el médico.

Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, piel y tejidos blandos, otitis media y tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

Contraindicaciones

Alergia a Amoxicilina u a otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación. Pacientes con mononucleosis.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



AMOXICILINA 750mg

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Amoxicilina (como Trihidrato)
750 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: en adultos es de 500 a 750 mg cada 8 horas y en niños sobre 3 meses, la dosis se basa en el peso corporal del paciente y es de 20 a 40 mg por kg de peso al día, repartido en 3 dosis. En niños menores de 3 meses, la dosis sólo debe ser indicada por el médico.

Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, piel y tejidos blandos, otitis media y tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

Contraindicaciones

Alergia a Amoxicilina u a otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación. Pacientes con mononucleosis.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



AMOXICILINA 750mg

ENVASE CLÍNICO CON 500 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Amoxicilina (como Trihidrato)
750 mg.

Dosificación

Dosis inicial recomendada en adultos es de 1 a 2 cápsulas, seguida de 1 a 2 cápsulas cada 6-8 horas, sin sobrepasar la dosis diaria de 400mg (8 cápsulas). La dosis debe ajustarse según el grado del dolor y la respuesta individual de cada paciente.

Indicación

Dosis usual recomendada es: en adultos es de 500 a 750 mg cada 8 horas y en niños sobre 3 meses, la dosis se basa en el peso corporal del paciente y es de 20 a 40 mg por kg de peso al día, repartido en 3 dosis. En niños menores de 3 meses, la dosis sólo debe ser indicada por el médico.

Contraindicaciones

Alergia a Amoxicilina u a otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación. Pacientes con mononucleosis.



AZITROMICINA 500mg

ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Azitromicina (como Dihidrato) 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: Adultos: 1,5 g deberá ser administrada como 500 mg diarios por 3 días. Para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual la dosis usual es de 1 gramo administrado como dosis única. La dosis indicada por el Médico, debe tomarse 1 hora antes o 2 horas después de las

comidas, ya que al administrarse con alimentos disminuye su biodisponibilidad.

Indicación

Infecciones causadas por organismos susceptibles. Infecciones del tracto respiratorio inferior y superior (bronquitis, neumonía).

Contraindicaciones

Pacientes con alergia a Azitromicina o cualquier antibiótico macrólido o algún otro componente de la formulación.



Producto Bioequivalente



Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Ecuador



AZITROMICINA 500mg

ENVASE CLÍNICO CON 504 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Azitromicina (como Dihidrato) 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: Adultos: 1,5 g deberá ser administrada como 500 mg diarios por 3 días. Para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual la dosis usual es de 1 gramo administrado como dosis única. La dosis indicada por el Médico, debe tomarse 1 hora antes o 2 horas después de las

comidas, ya que al administrarse con alimentos disminuye su biodisponibilidad.

Indicación

Infecciones causadas por organismos susceptibles. Infecciones del tracto respiratorio inferior y superior (bronquitis, neumonía).

Contraindicaciones

Pacientes con alergia a Azitromicina o cualquier antibiótico macrólido o algún otro componente de la formulación.



Producto Bioequivalente



Comprimidos recubiertos

AZITROMICINA 500mg

ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Azitromicina (como Dihidrato) 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: Adultos: 1,5 g deberá ser administrada como 500 mg diarios por 3 días. Para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual la dosis usual es de 1 gramo administrado como dosis única. La dosis indicada por el Médico, debe tomarse 1 hora antes o 2 horas después de las

comidas, ya que al administrarse con alimentos disminuye su biodisponibilidad.

Indicación

Infecciones causadas por organismos susceptibles. Infecciones del tracto respiratorio inferior y superior (bronquitis, neumonía).

Contraindicaciones

pacientes con alergia a Azitromicina o cualquier antibiótico macrólido o algún otro componente de la formulación.



Producto Bioequivalente



Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Bolivia

Guineal

Haití

BACITRACINA CON NEOMICINA UNGÜENTO 15g

POMO CON 15G DE UNGUENTO

Composición

Cada gramo de ungüento contiene: Bacitracina 500 U.I. Neomicina (como Sulfato) 5,0 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es la aplicación del ungüento sobre el área afectada 2 a 3 veces al día.

Indicación

Infecciones bacterianas de la piel cuando hay heridas menores.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Neomicina, Bacitracina o algún otro componente de la fórmula. • Infecciones mamarias durante la lactancia.



Ungüento

CEFRADINA 500mg

ENVASE CON 8 CÁPSULAS

Composición

Cada comprimido contiene: Cefradina 500 mg.

Dosificación

Adultos: 250-500 mg/dosis. Oral cada 6 horas.

Indicación

Infecciones urinarias. Infecciones respiratorias. Infecciones de piel y tejidos blandos. Osteomielitis. Profilaxis quirúrgica; gastrointestinal; ortopédica; cardiovascular.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a las cefalosporinas.



Cápsulas

CIPROFLOXACINO 500mg

ENVASES CON 6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Ciprofloxacino (como clorhidrato Monohidrato) 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: en adultos es de 250 a 750 mg 2 veces al día.

Indicación

Tratamiento en adultos de infecciones del tracto respiratorio inferior, tracto urinario, prostatitis crónica, piel y su estructura y de infecciones de hueso y articulaciones

producidas por bacterias gram positiva y gram negativa susceptibles.

Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. Hipersensibilidad a Ciprofloxacino u otras quinolonasa a cualquier componente de la formulación. Menores de 18 años.



Producto Bioequivalente



Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



COTRIMOXAZOL 200/40mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5ml de jarabe contiene:
Sulfametoxazol 200 mg;
Trimetoprima 40 mg.

Dosificación

Dosis usuales recomendadas son: Adultos: Infecciones del tracto urinario: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 10-14 días. Tratamiento de crisis aguda de bronquitis crónica: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol cada 12 horas por 14 días. Shigellosis: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 5 días. Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Niños: Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Otitis media e infecciones urinarias:

8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un período de 10 días. Shigellosis: 8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un período de 5 días.

Indicación

Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la asociación demostrados por antibiograma.

Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. Alergia a sulfametoxazol, otra sulfonamida, trimetoprima, o a cualquier componente de la formulación o diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) o clorpropamida o tolbutamida. Pacientes con enfermedad hepática o renal severa, con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.



Solución oral



COTRIMOXAZOL

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene:
Sulfametoxazol 400 mg;
Trimetoprima 80 mg.

Dosificación

Dosis usuales recomendadas son: Adultos: Infecciones del tracto urinario: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 10-14 días. Tratamiento de crisis aguda de bronquitis crónica: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol cada 12 horas por 14 días. Shigellosis: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 5 días. Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Niños: Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Otitis media e infecciones urinarias:

8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un período de 10 días. Shigellosis: 8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un período de 5 días.

Indicación

Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la asociación demostrados por antibiograma.

Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. Alergia a sulfametoxazol, otra sulfonamida, trimetoprima, o a cualquier componente de la formulación o diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) o clorpropamida o tolbutamida. Pacientes con enfermedad hepática o renal severa, con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.



Comprimidos

ERITROMICINA 500mg

ENVASE CON 8 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

cada comprimido recubierto contiene: Eritromicina 500 mg.

Dosificación

Adultos: 250 a 500 mg cada 6 a 8 horas. Niños: 50 mg/kg/día fraccionados cada 6 a 8 horas.

Indicación

Infecciones provocadas por gérmenes sensibles en vía aérea superior e inferior. Eliminación del estado portador de bacilos diftéricos, agudo y crónico.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la eritromicina.



Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Ecuador

**FLUCLOXACILINA 250mg/5ml**

FRASCO CON 60 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe contiene: Flucloxacilina 250 mg.

Dosificación

Niños: 50 mg/kg/día.
Adultos: 500-1000 mg/dosis. Oral cada 6-8 horas.

Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, piel y sus estructuras, oi.

Contraindicaciones

Alergia a Flucloxacilina, otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación.



Solución oral

FLUCLOXACILINA 500mg

ENVASE CON 6 CÁPSULAS

Composición

Cada cápsula contiene: Flucloxacilina (como Sal Sódica Monohidrato) 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 500 mg cada 6 horas.

Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, piel y sus estructuras, oi.

Contraindicaciones

Alergia a Flucloxacilina, otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación.



Cápsulas

FLUCLOXACILINA 500mg

ENVASE CON 12 CÁPSULAS

Composición

Cada cápsula contiene:
Flucloxacilina (como Sal Sódica Monohidrato) 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 500 mg cada 6 horas.

Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, piel y sus estructuras, oi.

Contraindicaciones

Alergia a Flucloxacilina, otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación.



Cápsulas

GENTAMICINA 0,1% CREMA 15g

POMO CON 15 G CREMA

Composición

Cada 1 g de crema contiene: Gentamicina 1 m.

Dosificación

Aplicar tópicamente 3-4 veces al día.

Indicación

Infecciones a la piel por gérmenes sensibles. Dermatitis infecciosa eczematosa, psoriasis pustular, dermatitis seborreica infectada, dermatitis de contacto infectada, quemadura superficial infectada, eritema, excoriación infectada, foliculitis superficial, furun-

culosis, picaduras de insectos infectadas, heridas quirúrgicas menores.



Crema

Contraindicaciones

Si ha presentado síntomas de alergia a gentamicina, amikacina, tobramicina, kanamicina. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

KETOCONAZOL 200mg

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene: Ketoconazol 200 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 200 mg al día.

Indicación

Tratamiento de blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, cromomicosis, y paracoccidioidomicosis, solo en pacientes en los que no pueden usarse otras alternativas de tratamiento.

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Hipersensibilidad a Ketoconazol o a algún componente de la formulación. Ketoconazol en comprimidos está contraindicado en pacientes con disfunción hepática aguda o crónica.



Comprimidos

PRODUCTO
DISPONIBLE EN



ECUADOR

VENEZUELA



LEVOFLOXACINO 500mg

ENVASE CON 7 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene: Levofloxacino (como hemihidrato) 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es 500 mg una vez al día, por 7 a 10 días.

Indicación

Tratamiento de las siguientes infecciones bacterianas sensibles al fármaco: Sinusitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica neumoecócica adquirida en la comunidad, infecciones del tracto urinario

(incluyendo pielonefritis e infecciones complicadas), infecciones de piel y tejido blandos.

Contraindicaciones

No debe usarse en: pacientes con hipersensibilidad a Levofloxacino, a otro medicamento de la misma clase o a cualquiera de los excipientes de la fórmula.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



LINCOMICINA 500mg

ENVASE CON 12 CÁPSULAS

Composición

Cada comprimido contiene: Lincomicina 500 mg.

Dosificación

Infecciones moderadamente graves, 1 cápsula de 500 mg cada 8 horas. Infecciones graves, 1 cápsula de 500 mg cada 6 horas.

Indicación

Infecciones bacterianas graves o moderadamente graves del tracto respiratorio, Osteomielitis. Septicemia. Infecciones de la piel y tejido blando. Artritis séptica. Empiema. Abscesos pulmonares. Acné nodulocístico o pustular.

Contraindicaciones

No usar durante el embarazo y lactancia.



Cápsulas

MEBENDAZOL 100mg

ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS MASTICABLES.

Composición

Cada comprimido masticable contiene: Mebendazol 100 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en oxiuriasis es 100 mg como dosis única, repitiéndola en 2 ó 3 semanas. En trichuriasis y ascariasis es 100 mg 2 veces al día por 3 días, puede repetirse 2 ó 3 semanas después si es necesario.

Indicación

Tratamiento de elección en oxiuriasis, trichuriasis y ascariasis. Tratamiento de infecciones

helmínticas mixtas.

Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a Mebendazol o a cualquier componente de la formulación. Embarazo y lactancia.



Comprimidos masticables

NITROFURANTOINA MACROC 100mg

ENVASE CON 10 CÁPSULAS CON MACROCRISTALES.

Composición

Cada cápsula contiene:
Nitrofurantoina 100mg
(macrocristales).

Indicación

Infecciones del tracto urinario
causadas por bacterias sensibles
a la nitrofurantoina.



Cápsulas

Dosificación

Administrar con las comidas.
Adultos: 100 mg 3 veces/día. La
terapia debe prolongarse como
mínimo 1 semana y por lo menos 3
días después que se ha logrado la
ausencia de bacterias en la orina.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Nitrofuranos.
Embarazo y lactancia. Niños
menores de un mes.

TERBINAFINA 250mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Terbinafina 250 mg.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la
Terbinafina o cualquiera de sus
componentes. Alteraciones
graves al hígado o riñón.

Dosificación

Dosis usual recomendada es 250
mg (un comprimido) una vez al día.

Indicación

Terbinafina es un antimicótico.
Se usa por vía oral en infecciones
de la piel, del cuero cabelludo y de
las uñas provocadas por hongos
(dermatofitos) tales como: tiña
del cuerpo, tiña del pie (pie de
atleta), tiña de la cabeza (del
cuero cabelludo), tiña cruris
(ingle).



Producto
Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO
DISPONIBLE EN



ECUADOR



PARAGUAY

ACETAZOLAMIDA 250mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene:
Acetazolamida 250 mg.

Dosificación

Para diuresis por falla cardíaca se usa en dosis de 250 a 375 mg 1 vez al día en la mañana. Para edema producido por medicamentos la dosis recomendada es 250 a 375 mg 1 vez al día durante 1 ó 2 días alternando con un día de descanso. Tratamiento de glaucoma un rango entre 250 a 500 mg, repartidos en 1 a 4 tomas diarias. Anticonvulsivante un rango entre 8 a 30 mg/kg de peso repartidas en 1 a 4 tomas diarias. Tratamiento del mal de montaña una dosis de 250 mg cada 6 a 12 horas. Para el mal de montaña la dosis recomendada es 500 a 1000 mg diarios en dosis separadas, usando comprimidos o cápsulas

de liberación prolongada, según sea adecuado; es preferible iniciar la dosificación 24 a 48 horas antes del ascenso y continuarlo durante 48 horas posterior al ascenso o más según sea necesario para controlar los malestares..

Indicación

Glaucoma de ángulo abierto, glaucoma secundario. Manejo de edemas secundarios a enfermedad cardíaca, congestiva o terapias con fármacos. Epilepsias tipo ausencias (Petit-Mal), prevención del mal de alturas.

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Acetazolamida, sulfonamidas, diuréticos tiazídicos o alguno de los componentes de la formulación.



AMIODARONA HCL 200mg

ENVASE CLÍNICO CON 1005/20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Amiodarona Clorhidrato 200 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: 600 a 1200 mg al día por un periodo de 1 a 2 semanas. La dosis de mantención suele ser los 400 mg.

Indicación

Tratamiento de arritmias ventriculares y fibrilación ventricular recurrente que ha sido refractaria a las terapias convencionales.

Contraindicaciones

Pacientes con shock cardiogénico, con disfunción nódulo-sinusal severa, con bloqueo auriculoventricular, fibrosis pulmonar, pacientes con episodios de bradicardia, a excepción si se usa en forma concomitante un marcapaso artificial. Hipersensibilidad a Amiodarona clorhidrato o cualquier componente de la formulación. Embarazo y lactancia.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



AMLODIPINO 10mg

ENVASE CON 30/60 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene: Amlodipino (como Besilato) 5 mg o 10 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 2,5 – 10 mg una vez al día. En caso de olvido de una dosis, tómla lo antes posible. Sin embargo, si ya está muy cerca de la siguiente dosis sáltese la dosis olvidada. Nunca duplique la dosis.

Indicación

Tratamiento de la hipertensión arterial, angina crónica estable y angina Prinzmetal.

Contraindicaciones

Pacientes con hipotensión severa. Embarazo y lactancia..



PRODUCTO DISPONIBLE EN



ATENOLOL 100mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene: Atenolol 100 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: Hipertensión arterial: 25 – 50 mg una vez al día.

Indicación

Tratamiento de la hipertensión y angina pectoris.

Contraindicaciones

Pacientes con bradicardia sinusal, bloqueo aurículo-ventricular mayor de primer grado o shock cardiogénico. Embarazo y lactancia. Alergia a Atenolol u otro β -bloqueador.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



CAPTOPRIL 25mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene: Captopril 25 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: Hipertensión arterial: 50-100 mg una dos veces al día, aunque en casos severos de hipertensión a veces es adecuado comenzar el tratamiento con dosis de 150 mg diarios, los que luego se reducen al rango normal de tratamiento. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva: se comienza con dosis de 25 mg al día. Y luego según evolución

se va aumentando la dosis paulatinamente con monitoreo de la presión arterial.

Indicación

Indicado para el control de la hipertensión arterial y para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

Contraindicaciones

Síntomas de alergia a Captopril, benazepril, cilazapril, espirapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril y trandolapril. Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.



ENALAPRIL 5mg

Composición

Cada comprimido contiene: Enalapril Maleato 5 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es al inicio del tratamiento 2,5 a 5 mg una vez al día, según prescripción médica, la dosis usual esta en el rango de 10 - 40 mg una vez al día o repartida en dos dosis diaria. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca la dosis inicial es 2,5 mg dos veces al día, la dosis usual oscila en el rango de los 2,5 - 20 mg dos veces al día. La dosis máxima diaria es de 40 mg en ambos casos.

Indicación

Tratamiento de la hipertensión esencial cuando los métodos no farmacológicos han fallado o han sido insuficientes. En combinación con otras drogas en falla cardiaca congestiva.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Enalapril Maleato, otro inhibidor de la enzima convertidora de Angiotensina (ACE) o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con antecedentes de angioedema relacionado a inhibidores de la ACE. Embarazo y lactancia.



Comprimidos

ENALAPRIL MALEATO 5mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene: Enalapril Maleato 5 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es al inicio del tratamiento 2,5 a 5 mg una vez al día, según prescripción médica, la dosis usual esta en el rango de 10 - 40 mg una vez al día o repartida en dos dosis diaria. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca la dosis inicial es 2,5 mg dos veces al día, la dosis usual oscila en el rango de los 2,5 - 20 mg dos veces al día. La dosis máxima diaria es de 40 mg en ambos casos.

Indicación

Tratamiento de la hipertensión esencial cuando los métodos no farmacológicos han fallado o han sido insuficientes. En combinación con otras drogas en falla cardiaca congestiva.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Enalapril Maleato, otro inhibidor de la enzima convertidora de Angiotensina (ACE) o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con antecedentes de angioedema relacionado a inhibidores de la ACE. Embarazo y lactancia.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

ISOSORBIDA DINITRATO 10mg

ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS

Composición

Cada comprimido contiene: Isosorbida Dinitrato 10mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en angina pectoris es de 5 a 40 mg 3 ó 4 veces al día. En falla cardiaca pueden administrarse dosis por vía oral que varían entre 20-40 mg cada 4 horas.

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Hipersensibilidad a Isosorbida Dinitrato, nitroglicerina o a algún componente de la formulación. Pacientes con infarto, presión sanguínea marcadamente baja, shock, anemia severa.



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



FRANCIA

Indicación

Profilaxis y tratamiento de angina pectoris y de insuficiencia cardiaca congestiva.

PENTOXIFILINA 400mg

30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

Composición

Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene: Pentoxifilina 400mg.

Dosificación

400 mg cada 8-12 horas.

Indicación

Enfermedades oclusivas de las arterias periféricas, claudicación intermitente y alteraciones circulatorias de origen arteriosclerótico, diabético, inflamatorio o funcional; trastornos tróficos.

Contraindicaciones

Arritmias, en dosis elevadas.



Comprimido recubierto LP

PROPRANOLOL HCL 10/40 mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE.

Composición

Cada comprimido contiene: Propranolol Clorhidrato 10 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: Hipertensión: 40 mg 2 veces al día, esta dosis puede ser aumentada gradualmente según recomendación médica. Tratamiento de arritmias: 20 a 40 mg 2 veces al día la que se puede disminuir hasta los 16 mg diarios. Angina: 80 a 160 mg diarios según prescripción médica.

Indicación

Tratamiento de angina crónica estable e hipertensión. Tratamiento y profilaxis de arritmias cardíacas. Profilaxis de reinfarcto al miocardio. Manejo de los síntomas en pacientes con feocromocitoma.

Contraindicaciones

Pacientes con síndrome de Raynaud, hipertensión maligna, asma bronquial, bradicardia sinusal, en bloqueo cardíaco y en falla cardíaca congestiva. Embarazo y lactancia. Miastenia gravis.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN





TETRACICLINA HCL 500mg

ENVASE CON 8 CÁPSULAS BE

Composición

Cada cápsula contiene:
Tetraciclina Clorhidrato 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es :
Adultos: 1 a 2 g cada 24 horas en dosis divididas cada 6 o 12 horas dependiendo de la severidad del cuadro. Niños mayores de 8 años: 25-50 mg/kg divididos en 2 o 4 tomas dependiendo de cada caso.

Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, piel y tejidos blandos e infecciones del tracto respiratorio causadas por organismos susceptibles.

Contraindicaciones

Alergia a Tetraciclina Clorhidrato, otra Tetraciclina o alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia. Niños menores de 8 años, ya que este medicamento puede causar decoloración permanente de los dientes en niños.



Producto Bioequivalente



Cápsulas

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ECUADOR





LOPERAMIDA HCL 2mg

ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Loperamida Clorhidrato 2 mg.

Dosificación

Adultos: diarrea aguda t crónica,
4mg inicialmente y luego 2mg
después de cada evacuación.
Dosis máxima recomendada al
día 16mg.

Indicación

Este medicamento es utilizado
en el tratamiento sintomático de
diarreas agudas no específicas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los
componentes de la fórmula. No
usar si junto a la diarrea hay fiebre
o presencia de sangre o mucus en
las heces. Si la diarrea es por uso
de antibióticos o por disentería.



Producto
Bioequivalente



Comprimidos

TRIMEBUTINO MALEATO 100mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE.

Composición

Cada comprimido contiene:
Trimebutino Maleato 100 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en
adultos es : Inicio: 2 comprimidos
3 veces al día antes de las
comidas, durante 10 días.
Mantención: 1 comprimido 3
veces al día, antes de las comidas.

Indicación

Indicado en Síndrome de
Intestino Irritable (colopatías
funcionales, colon irritable, colon
inestable, colon espástico) y sus
manifestaciones: espasmos
intestinales, disfunción cólica,
crisis alternante de diarrea y
estreñimiento, meteorismo,
dolor y distensión abdominal,
constipación, secuelas de
gastrectomía, dispepsias.

Contraindicaciones

En pacientes con alergia a
Trimebutino Maleato u otro
componente de la formulación.
Embarazo o lactancia, salvo
indicación médica. Pacientes con
miastenia gravis.



Producto
Bioequivalente



Comprimidos

LACTULOSA 65%

FRASCO CON 200 ML SOLUCIÓN ORAL 65%

Composición

Cada 100 ml contiene: Lactulosa al 65% 128,14 g (equivalente a 65 g de lactulosa).

Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: Constipación crónica: 15 a 30 mL al día. Se requieren de 24 a 48 horas para obtener un adecuado movimiento intestinal. Encefalopatía portal: inicialmente, 30 a 45 mL 3 o 4 veces al día. Luego la dosis debe ser ajustada según los requerimientos de cada paciente hasta obtener 2 a 3 deposiciones con heces blandas al día.

Indicación

Prevención y tratamiento de la encefalopatía portal sistémica y tratamiento sintomático del estreñimiento crónico.

Contraindicaciones

Pacientes con diabetes mellitus o que requieran baja dieta de galactosa, sangramiento rectal no diagnosticado, obstrucción intestinal, falla cardíaca congestiva, hipertensión, apendicitis o síntomas de apendicitis, hipersensibilidad. Pacientes con infarto, presión sanguínea marcadamente baja, shock, anemia severa.

 Solución oral

PRODUCTO
DISPONIBLE EN



METOCLOPRAMIDA 10mg

ENVASE CON 24 COMPRIMIDOS BE.

Composición

Cada comprimido contiene: Metoclopramida 10 mg.

Dosificación

10-15 mg hasta 4 veces al día 30 minutos antes de las comidas y antes de acostarse.

Indicación

Tratamiento sintomático de la pirosis pos-prandial y del vaciado gástrico retardado en adultos con reflujo gastroesofágico. Tratamiento de gastroparesia diabética y en la profilaxis de náuseas y vómitos inducida por la quimioterapia y pos-operatorio..

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la metoclopramida o alguno de sus excipientes. Lactancia, menores de 1 año, pacientes con epilepsia. Uso en conjunto con Levodopa y otros fármacos que produzcan reacciones extrapiramidales como fenotiazinas y butirofenonas.

 Comprimidos

PRODUCTO
DISPONIBLE EN



ALOPURINOL 100/300 mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Alopurinol 100/300 mg.

Dosificación

Pacientes con hiperuricemia o gota leve: 200 a 300 mg/día. Para pacientes con hiperuricemia o gota moderada a severa: 400 a 600 mg/día.

Indicación

Gota primaria y secundaria; hiperuricemias asociadas a discrasias sanguíneas; hiperuricemias en nefropatías primarias y secundarias.

Contraindicaciones

No usar durante la lactancia. Administrar con precaución en terapia de anticoagulantes o hipoglicemiantes orales.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



ATORVASTATINA 10 mg

ENVASE CON 30/60 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Atorvastatina (como Sal Cálcica) 10 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es de 10 mg a 80 mg una vez al día.

Indicación

Tratamiento de la hiperlipidemia.

Contraindicaciones

Enfermedad hepática. Enfermedad alcohólica crónica.



ATORVASTATINA 20 mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Atorvastatina (como Sal Cálcica) 20 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es de 10 mg a 80 mg una vez al día.

Indicación

Tratamiento de la hiperlipidemia.

Contraindicaciones

Enfermedad hepática. Enfermedad alcohólica crónica.



GEMFIBROZILLO 300 mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Gemfibrozilo 300 mg.

Dosificación

600 a 1200 mg/día media hora antes de las comidas; 900 mg en la noche antes de la comida.

Indicación

Regulador de lípidos séricos y todas las fracciones de lipoproteínas, indicado en hiperlipidemias asociadas a diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, xantomatosis asociada a hiperlipidemia.

Gemfibrozilo reduce los elevados niveles de colesterol total, triglicéridos, VLDL y LDL y aumenta los niveles HDL, el factor protector contra el desarrollo de aterosclerosis coronaria.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No administrar a pacientes con insuficiencia renal o hepática severa.



Producto Bioequivalente



Compridos

GEMFIBROZILLO 600 mg

ENVASE CLÍNICO CON 20/500 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Gemfibrozilo 600 mg.

Dosificación

600 a 1200 mg/día media hora antes de las comidas; 900 mg en la noche antes de la comida.

Indicación

Regulador de lípidos séricos y todas las fracciones de lipoproteínas, indicado en hiperlipidemias asociadas a diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, xantomatosis asociada a hiperlipidemia.

Gemfibrozilo reduce los elevados niveles de colesterol total, triglicéridos, VLDL y LDL y aumenta los niveles HDL, el factor protector contra el desarrollo de aterosclerosis coronaria.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No administrar a pacientes con insuficiencia renal o hepática severa.



Producto Bioequivalente



Compridos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



HUNGRÍA

ECUADOR

NICARAGUA

GLIBENCLAMIDA 5 mg

ENVASE CON 30/1005 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Glibenclamida 5 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es al inicio de la terapia 2.5 a 5 mg. Al día junto con el desayuno o la primera comida del día, se recomienda entonces aumentarla dosis en intervalos de 2.5 mg. A intervalos semanales dependiendo de la respuesta del paciente, la dosis máxima recomendada es de 20 mg al día.

Indicación

Diabetes Mellitus del adulto, que no puede controlarse solo con dieta.

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Acidosis, cetoacidosis, quemaduras severas, coma diabético, infección severa. Alergia a Glibenclamida, otras sulfonilureas, sulfas o diuréticos tiazídicos. Diabetes juvenil o insulino dependiente.



Producto Bioequivalente



Compridos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



HUNGRÍA

ECUADOR

AC MEFENAMICO 500 mg

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene: Ácido Mefenámico 500 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es: 500 mg seguidos de 250 mg cada 6 horas, por un periodo de 2 a 3 días.

Indicación

Dolor leve a moderado de variada etiología. Alivio sintomático de la dismenorrea primaria y en el dolor post-inserción de DIU.

Contraindicaciones

No usar en: Casos de hipersensibilidad a la droga o que han sufrido reacciones de hipersensibilidad a aspirina u otros agentes antiinflamatorios no esteroideos. Pacientes con úlcera activa o con inflamación crónica del tracto gastrointestinal alto o bajo. En embarazo y lactancia. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de by pass coronario.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

LEVONORGEST ETINILESTRIA 150/30

ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada estuche contiene 21 comprimidos activos de color blanco y 7 comprimidos placebo inactivos de color amarillo. Cada comprimido recubierto activo de color blanco contiene Levonorgestrel (Micronizado) 0,150 mg y Etinilestradiol (Micronizado) 0,030 mg.

Dosificación

Tomar el comprimido recubierto sin masticar, con algo de líquido y siempre a la misma hora. El tratamiento se inicia el 1º día de su ciclo menstrual (1º día de sangrado). Comience con los comprimidos de color blanco (en total 21). Luego de la toma del último comprimido blanco, se inicia con los comprimidos

de color amarillo (en total 7) una vez concluidos los comprimidos de color amarillo debe iniciar la administración de un nuevo envase (haya o no experimentado menstruación).

Indicación

Anticonceptivo oral.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al levonorgestrel, en pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama, sangrado vaginal de origen desconocido, tumores hepáticos, enfermedades trombóticas, migraña, en embarazadas, durante la lactancia, pacientes con antecedentes de embarazo ectópico.



Comprimidos



AEROCÁMARA UNIVERSAL

AEROCAMARA UNIVERSAL NIÑOS/ADULTOS

Composición

1 cámara inhalatoria.

Dosificación

La dosis a usar y el tiempo de tratamiento debe ser indicada por su Médico.

Indicación

Dispositivo médico indicado para mejorar la eficiencia del uso de inhaladores en aerosol. Observaciones: Si tiene indicado más de un puf o disparo esperar 1 a 2 minutos entre uno y otro.

Contraindicaciones

Todos los espaciadores plásticos acumulan electricidad estática, ésta atrae partículas del fármaco (Aerosol) hacia las paredes del espaciador, disminuyendo la efectividad del medicamento. Este problema se soluciona enjuagando la aerocámara universal con agua jabonosa una vez por semana, luego dejar secar. Es normal que las aerocámaras con el uso se tornen levemente opacas.



Aerocámara

AMBROXOL 15 mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de Jarabe Infantil contiene: Ambroxol Clorhidrato 15 mg.

Dosificación

Jarabe infantil: niños de 2 a 5 años: 2,5 mL 3 veces al día; niños de 6 a 12 años: 5ml 3 veces al día.

Indicación

Afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieren tratamiento secretolítico.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ambroxol clorhidrato o a alguno de los componentes de la fórmula. Primer trimestre de embarazo. Precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal o en tratamiento con anticoagulantes.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



AMBROXOL 30 mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe Adultos contiene: Ambroxol Clorhidrato 30 mg.

Dosificación

Jarabe Adultos: adultos y mayores de 12 años: 5ml 3 veces al día.

Indicación

Afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieren tratamiento secretolítico.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ambroxol clorhidrato o a alguno de los componentes de la fórmula. Primer trimestre de embarazo. Precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal o en tratamiento con anticoagulantes.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



BROMHEXINA HCL 4mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 mL de Jarabe contiene Bromhexina Clorhidrato 4 mg.

Dosificación

La dosis oral usual en niños entre 6-12 años es de 4 mg (5ml) cada 8 horas.

Para niños de 2-6 años, la dosis recomendada es de 4 mg (5ml) cada 12 horas, o bien 0,5 mg/kg/día, dividido en dosis cada 8 horas.

Indicación

Está indicada para el alivio de la tos productiva (con secreción o

flema). Tratamiento de bronquitis crónica suave o moderada y otras bronconeumopatías crónicas obstructivas, y bronquitis aguda.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con antecedentes de Úlcera Péptica, en personas que hayan presentado alergia a Bromhexina Clorhidrato, a algún excipiente de la formulación, o alergia a Ambroxol. No se debe utilizar Bromhexina Clorhidrato para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

**CEFADROXILO 500mg**

ENVASE CLÍNICO CON 8/504 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada cápsula contiene: Cefadroxilo (como Monohidrato) 500 mg.

Dosificación

Infecciones del Tracto Urinario: Para infecciones del tracto urinario, inferior no complicadas (es decir, cistitis), la dosis usual es de 1 ó 2 g por día en una dosis única o dividida en dos dosis iguales. Infecciones de la piel y estructura de la piel, la dosis usual es de 1 ó 2 g por día en una dosis única o dividida en dos dosis iguales. Tratamiento para la faringitis y amigdalitis causada por estreptococos betahemolíticos del grupo A-1 g por día en una dosis única o en dos dosis iguales por al

menos 10 días. Infecciones de Tracto Respiratorio Superior e Inferior: Para infecciones leves, la dosis usual es de 1 g por día dividida en dos dosis iguales. Para infecciones moderadas a severas, la dosificación recomendada es de 1 a 2 g diarios dividida en dos dosis iguales.

Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y su estructura y del tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

Contraindicaciones

Alergia a Cefadroxilo, otra Cefalosporina o Penicilina, o alguno de los componentes de la formulación.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Colombia



NOSCAPINA 20mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS.

Composición

Cada comprimido contiene:
Noscapina 20 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es:
Adultos y niños mayores de 12 años: Ingerir 1 a 2 comprimidos cada 6 a 8 horas (3 a 4 veces al día).

Indicación

Alivio de tos seca (sin flema) que aparece con el resfrió.

Contraindicaciones

Embarazo o lactancia, tampoco en mujeres que planeen o que estén en riesgo de embarazarse. Tos asmática o insuficiencia respiratoria (que se caracteriza por cansancio extremo o inusual). Alergia a Noscapina.



Comprimidos

NOSCAPINA 5mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe contiene:
Noscapina 5mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es para adultos: 15 a 20 mg cada 4 horas; y en niños: 5 mg cada 4 horas.

Indicación

Alivio sintomático de tos no productiva debido a irritaciones leves de garganta y bronquios que aparecen con el resfrió y la inhalación de irritantes.

Contraindicaciones

No usar en alergia a noscapina o a cualquier excipiente de la formulación, si padece de tos asmática o insuficiencia respiratoria (caracterizada por cansancio extremo o inusual), enfermedad hepática.



Solución oral

OXOLAMINA 28mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe infantil contiene: Oxolamina (como fosfato) 28mg.

Dosificación

Niños de 2 a 11 años: 2,5 - 5 ml de jarabe Infantil cada 4 horas.

Indicación

Tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Oxolamina o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia.



Solución oral

OXOLAMINA 50mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

Composición

Cada 5 ml de jarabe Adulto contiene: Oxolamina (como fosfato) 50mg.

Dosificación

Adultos y niños mayores de 12 años: 5 - 10 ml de jarabe Adultos cada 4 horas.

Indicación

Tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Oxolamina o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia.



SALBUTAMOL 2mg/5ml

FRASCO CON 100 ML JARABE BE

Composición

Cada 5 ml de jarabe contiene: Salbutamol 2 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 14 años es de 5 ó 10 ml 3 ó 4 veces al día. Para niños de 6 a 13 años la dosis usual recomendada es de 5 ml 3 ó 4 veces al día.

Indicación

Tratamiento y prevención del broncoespasmo en pacientes con obstrucción reversible de la vía aérea.

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Hipersensibilidad a salbutamol o algún componente de la formulación. Pacientes con arritmia cardíaca, insuficiencia coronaria, enfermedad cardíaca isquémica. Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Pacientes con arritmias cardíacas, insuficiencia coronaria, enfermedad cardíaca isquémica.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



SALBUTAMOL SF 100mcg/DS200

INHALADOR BUCAL 200 DOSIS

Composición

Cada dosis-medida contiene: Salbutamol 100 mcg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es de 100 a 200 mcg (1 ó 2 puffs) cada 4-6 horas.

Indicación

Tratamiento y la prevención del broncoespasmo en pacientes con obstrucción reversible de la vía aérea.

Contraindicaciones

Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Asma está contraindicado en pacientes con arritmias cardíacas, insuficiencia coronaria, enfermedad cardíaca isquémica.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



ALPRAZOLAM 0,5mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Alprazolam 0.5 mg.

Dosificación

Dosis habitual: 0.25 a 0.50 mg,
3 veces al día. Dosis máxima: 4
mg/día.

Indicación

Ansiedad sola o asociada a
depresión, intranquilidad,
insomnio, irritabilidad y algunas
formas de somatización como
colon irritable y dispepsia.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga u
otra benzodiazepina. Estados
psicóticos. Primer trimestre del
embarazo.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN



ECUADOR

BROMAZEPAM 3mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Bromazepam 3 mg.

Dosificación

Tratamiento ambulatorio: 1.5-3
mg hasta 3 veces al día. Pacientes
graves, especialmente los
hospitalizados: 6-12 mg 2 ó 3
veces al día.

Indicación

Ansiedad, tensión psíquica y
otros trastornos somáticos
o psiquiátricos asociados al
síndrome de ansiedad. Las
benzodiazepinas están indicadas

únicamente cuando el trastorno
es grave, incapacitante o provoca
una honda ansiedad.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a las
benzodiazepinas. Miastenia
gravis. Insuficiencia respiratoria
severa. Insuficiencia hepática
severa.



CARBAMAZEPINA 200mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Carbamazepina 200 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es:
en adultos es de 1 comprimido 2
veces al día.

Indicación

Tratamiento y profilaxis de crisis
epilépticas. Tratamiento del
dolor asociado a neuralgia del
trigémino.

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia
a Carbamazepina o a otro
componente de la formulación.
No administrar a personas que
padecen porfiria o antecedentes
de depresión de la médula ósea.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN



BOLIVIA



ECUADOR



PARAGUAY

CICLOBENZAPRINA HCL 10mg

ENVASES CON 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Ciclobenzaprina Clorhidrato 10 mg.

Dosificación

Adultos: 10 mg 3 veces al día. La dosis máxima es de 60 mg diarios.

Indicación

Tratamiento sintomático y coadyuvante, tanto en la terapia de reposo como física, para el alivio del espasmo muscular, asociado a condiciones musculoesqueléticas dolorosas y agudas.

Contraindicaciones

Alergia a Ciclobenzaprina Clorhidrato o algún otro componente de la fórmula. Hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias y otros desórdenes de bloqueo y conducción cardíaca, durante la recuperación tras un infarto al miocardio. Pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa (moclobemida, selegilina) incluso dentro de los 14 días siguientes terminado el tratamiento.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



VENEZUELA

CITALOPRAM 20mg

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene: Citalopram (como bromhidrato) 20 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada es 20 mg al día.

Indicación

Tratamiento de la depresión y prevención de su recurrencia. Ataques de pánico con o sin agorafobia. Trastornos obsesivo-compulsivos.

Contraindicaciones

Pacientes que están recibiendo un tratamiento con inhibidores de la MAO. Hipersensibilidad al Citalopram o a cualquier componente de la formulación. Si ha consumido un inhibidor de la MAO o tioridazina en las últimas 2 semanas.



CLONAZEPAM 0,5mg

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Clonazepam 0,5 mg.

Dosificación

0.5 mg 1 vez al día, aumentando la dosis gradualmente hasta 2 ó 3 mg diarios que se reparten en 2 dosis parciales diarias..

Indicación

Ansiedad generalizada. Fobias. Crisis y trastornos de pánico. Ansiedad asociada a depresión y enfermedad afectiva. Ansiedad asociada a stress y trastornos del sueño. Es utilizado como profiláctico en el manejo del síndrome de Lennox-Gastaut (epilepsia Petit Mal) en ataques

mioclónicos y acinéticos. La droga puede ser usada en el manejo de ataques de ausencia (Petit Mal) en pacientes que no han respondido a succinimidas. El clonazepam también ha sido utilizado en otros ataques refractarios incluyendo ataques parciales con múltiple sintomatología. Puede ser utilizado en algunos pacientes con ataques tonico-clónicos (Grand-Mal).

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Clonazepam u otra benzodiazepina, así como a cualquier componente de la fórmula. Miastenia gravis, glaucoma de ángulo estrecho.



CLONAZEPAM 2mg

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Clonazepam 2 mg.

Dosificación

0.5 mg 1 vez al día, aumentando la dosis gradualmente hasta 2 ó 3 mg diarios que se reparten en 2 dosis parciales diarias..

Indicación

Ansiedad generalizada. Fobias. Crisis y trastornos de pánico. Ansiedad asociada a depresión y enfermedad afectiva. Ansiedad asociada a stress y trastornos del sueño. Es utilizado como profiláctico en el manejo del síndrome de Lennox-Gastaut (epilepsia Petit Mal) en ataques

mioclónicos y acinéticos. La droga puede ser usada en el manejo de ataques de ausencia (Petit Mal) en pacientes que no han respondido a succinimidas. El clonazepam también ha sido utilizado en otros ataques refractarios incluyendo ataques parciales con múltiple sintomatología. Puede ser utilizado en algunos pacientes con ataques tonico-clónicos (Grand-Mal).

Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Clonazepam u otra benzodiazepina, así como a cualquier componente de la fórmula. Miastenia gravis, glaucoma de ángulo estrecho.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



DIAZEPAM 10mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Diazepam 10 mg.

Dosificación

Niños: 0.1-0.2 mg/kg/
dosis. Adultos: 5-30 mg/día.

Indicación

Estados de ansiedad.
Coadyuvante en el tratamiento de
síntomas de privación alcohólica.
Procesos músculo-espásticos.

Contraindicaciones

No administrar en embarazo y
lactancia.



ESCITALOPRAM 10mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto
contiene: Escitalopram (como
oxalato) 10 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en
adultos y mayores de 18 años es
10 a 20 mg al día. El tratamiento
no debiera superar las 8 semanas.
Períodos mayores de tiempo
deberán ser supervisados
estrictamente por su Médico,
quien deberá evaluar la dosis y el
efecto farmacológico. La dosis
puede ser consumida con o sin
alimentos.

Indicación

Antidepresivo inhibidor de la
recaptación de serotonina.

Contraindicaciones

Si Ud. está en tratamiento con
Inhibidores de la Mono amino
Oxidasa, incluso si ha dejado
de tomarlos antes de 14 días.
En caso de hipersensibilidad
al Escitalopram o a cualquier
componente de la formulación.



FLUOXETINA 20mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

Composición

Cada comprimido contiene:
Fluoxetina (como Clorhidrato)
20 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en
adultos es de 20 mg una vez al día.

Indicación

Tratamiento de la depresión
con o sin ansiedad asociada,
en desórdenes obsesivo-
compulsivos y de la bulimia
nerviosa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida
a Fluoxetina o cualquier
componente de la formulación.
Embarazo y lactancia.



PRODUCTO
DISPONIBLE EN



PARAGUAY

MELATONINA 3mg

ENVASE CON 30 CÁPSULAS

Composición

Cada cápsula contiene:
Melatonina 3mg.

Dosificación

Dosis habitual es de 1 a 2 comprimidos 1 hora antes de dormir.


Indicación

Regulador del ciclo sueño-vigilia.
Regulador del ciclo del sueño,
inductor del sueño.

Contraindicaciones

Personas que ingieren medicamentos esteroideos, tales como cortisona y dexametasona, ya que la melatonina puede interferir con el efecto de tales medicamentos;

mujeres embarazadas; mujeres que deseen embarazarse, ya que dosis superiores a 10 mg pueden prevenir la ovulación en algunas mujeres; mujeres que amamantan, debido a que pequeñas cantidades de melatonina pasan a través de la leche; personas con severa alergia, ya que la melatonina estimula el sistema inmune y podría manifestarse una respuesta alérgica; personas con enfermedades autoinmunes, debido a que la melatonina estimula el sistema inmunológico y podría exagerarse una respuesta autoinmune; personas con cánceres autoinmunes, tales como: linfoma y leucemia, ya que la melatonina estimula las células inmunitarias.



SERTRALINA 100/50mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Sertralina (como clorhidrato) 100/50 mg.

Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 50 - 100 mg/día.

Indicación

Tratamiento de los síntomas de depresión. Tratamiento de desórdenes obsesivo-compulsivos. Ataques de pánico con o sin agorafobia.

Contraindicaciones

Pacientes que presenten hipersensibilidad a Sertralina. Pacientes que han recibido terapia (2 semanas) con Inhibidores de la Mono Amino Oxidasa.



ZOPICLONA 7,5mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Zopiclona 7,5 mg.

Dosificación

En pacientes adultos la dosis es de 7,5 mg a la hora de acostarse. En pacientes geriátricos, pacientes con enfermedad de la función hepática, o en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica la dosis inicial debe ser reducida a la mitad, ya que el clearance puede ser prolongado, y por lo tanto aumentar el potencial de los efectos adversos.

Indicación

Tratamiento a corto plazo del insomnio. caracterizado por la

dificultad que tiene el paciente en quedarse dormido, despertar frecuente en la noche o despertar temprano en la mañana. Cuando comienzan los disturbios al dormir, se pueden presentar síntomas de desorden físico o psiquiátrico, por lo tanto, el paciente debe ser evaluado farmacológicamente antes de iniciar el tratamiento con zopiclona.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo. La zopiclona está contraindicado en insuficiencia respiratoria grave. No se recomienda su empleo en niños menores de 15 años.



BETACAROTENO

ENVASE CON 100 CÁPSULAS

Composición

Cada cápsula contiene: Aceite de Betacaroteno, Aceite de Soya, Gelatina, Glicerina, Agua Purificada, Dióxido de Silicio. Cada cápsula aporta 6mg de Betacaroteno.

Dosificación

Dosis usual, 2 cápsulas al día.

Indicación

Complemento en estados carenciales de Betacaroteno (vit A).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad, embarazada melatonina estimula las células inmunitarias.



Cápsulas





MiLab
Calidad para ti