


# Vademécum 2024

Laboratorio Milab,  
parte del grupo Femsa Salud.





## Introducción

Somos Milab, un Laboratorio internacional con planta en Chile, presente desde hace 34 años en el mercado farmacéutico.

Formamos parte del grupo FEMSA División Salud, abastecemos con nuestros medicamentos a más de 4.000 farmacias en Chile y exportamos a 10 países de la región.

Contamos con más de 400 registros sanitarios, entregando soluciones de primera línea a más de 50 patologías de diferentes líneas terapéuticas.

Somos líderes en la fabricación nacional de medicamentos Bioequivalentes y además, contamos con una de las dos plantas autorizadas en Chile para la fabricación de productos Betalactámicos.

Por esto y más, estamos comprometidos con trabajar día a día para mejorar la vida y salud de las personas, produciendo medicamentos de calidad y accesibles para la población.

**Somos Milab, calidad para ti.**

### IMPORTANTE

La información contenida en el presente vademécum corresponde a lo registrado como prospecto paciente del medicamento y esta orientado a servir de referencia a los profesionales de la salud.





## Milab en el mercado

Milab produce una amplia variedad de productos farmacéuticos para satisfacer las necesidades de salud de toda la población de Chile y de Latinoamérica, considerando productos genéricos y de

marcas para mercado público/ privado con diversas formas farmacéuticas (sólidos, semi sólidos y líquidos), teniendo más de 400 registros en Chile y 400 en otros países de LATAM.



Milab está presente en

## 10 países de LATAM

Somos parte del grupo FEMSA Salud, lo que nos permite estar presente con nuestros medicamentos, en diferentes países de la región.



**+400  
productos**

con autorización de comercialización en Chile por el ISP.

**Tenemos participación en  
más de 10 áreas terapéuticas**

(Antibióticos, Sistema Nervioso Central, Cardio Metabólico, Respiratorio, Alergia y Salud Femenina) con productos con fabricación en Chile e importados.



Somos líderes en  
**Bioequivalentes**



**Producimos más de  
80 millones**

de unidades por año, somos el segundo laboratorio que más productos BE fabrica en Chile.



**Contamos  
con 2 plantas  
certificadas**

de producción en 3.530 m2 de construcción y 2 bodegas con un total de 5.960 m2.



Los productos Milab llevan más de  
**30 años en el mercado**



**Contamos con cerca de  
500 colaboradores**

que contribuyen diariamente para cumplir con la visión de Milab.

# Tipología de medicamentos

## MARCA

Los medicamentos de marca hacen referencia al nombre comercial o registro de marca, definido como el nombre registrado de un producto. Este nombre es propiedad privada del fabricante o titular de registro sanitario y se utiliza para distinguir un medicamento entre los competidores del mercado.



## GENÉRICOS

Un medicamento genérico funciona de la misma manera y proporciona el mismo beneficio clínico que su versión de marca. A diferencia del medicamento de Marca o similar, no utiliza un nombre comercial.



## OTC

Los medicamentos de venta libre (OTC) se distinguen por su disponibilidad sin necesidad de prescripción médica. Estos productos son accesibles directamente para los pacientes.







# Índice

## MARCA

MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.	MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.	
<b>Antialérgicos</b>	Montelukast	AKAN COM.REC.10MG.30	18	<b>Analgesia</b>	Ketoprofeno	RELATENE COM.100MG. 20	31	
	Montelukast	AKAN COM.REC.4MG.30	18		Ketoprofeno	RELATENE COM.100MG.10	31	
	Montelukast	AKAN COM.REC.5MG.30	18	<b>Antiinfecciosos</b>	Moxifloxacino	ALMAXOL 400mg 10 COMP. REC. (MSN)	34	
	Cetirizina Diclorhidrato	COOLIPS COM.10MG.10	19		Terbinafina	DONTER COM.250MG.30	34	
	Cetirizina Diclorhidrato	COOLIPS COM.10MG.30	19		Terbinafina	DONTER POMO 15 G. CREMA	35	
	Oximetazolina Clorhidrato	FACIMIN SP.NAS.0.05% 10M	19		Sulfametoxazol/Trimetoprima	TRELIBEC FTE.COM.10	35	
	Loratadina	HYSTICLAR JBE.5MG.100ML	19		<b>Cardiovascular</b>	Enalapril Maleato	DIOTENSIL COM.10MG.30	36
	Levocetirizina diclorhidrato	LALERGIC BE GOTAS.5MG/ML.20	20	Enalapril Maleato		DIOTENSIL COM.20MG.30	36	
	Levocetirizina diclorhidrato	LALERGIC COM.5MG.30	20	Losartán potásico		LOPREN COM.50MG.30	36	
	Desloratadina	NEOHYSTICLAR COM.5MG.30	20	<b>Dermatología</b>	Clotrimazol	CREMINEM CR.1% 20GR.	38	
	Desloratadina	NEOHYSTICLAR COM.5MG.60	21		Clotrimazol	CREMINEM-B CR.15GR.	38	
	Desloratadina	NEOHYSTICLAR JBE2,5/5M.90	21		Betametasona	CREMIRIT CR.0.05% 15GR	38	
	Clorfenamina Maleato	NIPOLEN COM.4MG.20	21		Aciclovir	LISOVYR CR.5%. 5GR.	39	
	Clorfenamina Maleato	NIPOLEN JBE.2.5MG/ML100ML	21		Aciclovir	LISOVYR CR.5%.15GR.	39	
	Clonixinato de Lisina	BLONAX COM.125MG.10	24		Ketoconazol 2 g.	SORIDERMAL CR.2% 20GR	39	
	Ketorolaco Trometamol	BRODIFAC COM.10MG.10	24		<b>Dermocosmética</b>	AC-X JABON BARRA AZUFRE	40	
	Diclofenaco Dietilamina	DICOGEL GEL 1.16% 30GR.	24			AC-X JABON BARRA CARBON	40	
Hidroxicloquina Sulfato	DROLSAN COMREC.200MG.30	25	AC-X JABON BARRA EXFOLIANTE			40		
Diclofenaco Sódico	ELITIRAN GOTAS.15MG/ML.25ML	25	AC-X JABON FORTE			41		
Diclofenaco Sódico	ELITIRAN GP	25	ACX GEL SECANTE COLOR PIEL	41				
Paracetamol	GENIOL 1/ 1000MG.20	26	ACX GEL SECANTE INCOLORO	42				
Paracetamol	GENIOL 500MG.20	26	ACX ESPUMA DE LIMPIEZA FACIAL CORPORAL	42				
Paracetamol/Noscapina Clorhidrato/Cafeína	GENIOL COMPUESTO DÍA 5G	26	<b>Gástricas</b>	Magaldrato/Simeticona		ACIFIN COM.MAST.10	44	
Ácido/Ascórbico	GENIOL COMPUESTO NOCHE 5G	27		Atropina Sulfato Monohidrato	BUTON COM. 10	44		
Paracetamol/Noscapina Clorhidrato/Cafeína/Ácido Ascórbico/Clorfenamina Maleato	GENIOL FLU D/N COM.15+5	27		Papaverina Clorhidrato	COLIPER COM.2MG.6	44		
Paracetamol/Pseudoefedrina Sulfato/Clorfenamina Maleato Pa-racetamol/ Pseudoefedrina Sulfato/ Clorfenamina Maleato	GENIOL FLU JBE. 100ML	27		Loperamida Clorhidrato	DOCIVIN CAP.10MG. 30	45		
Paracetamol	GENIOL GOTAS.100MG/ML.15ML	28		Domperidona	DOCIVIN GOTAS.10MG/ML.15ML	45		
Paracetamol	GENIOL NINOS COM.160MG.16	28		<b>Analgesia</b>	Ketoprofeno	RELATENE CAP.50MG.10	31	
Ácido Acetilsalicílico	HASSAPIRIN COM.100MG10(10	29			Ketoprofeno	RELATENE CAP.50MG.20	31	
Salicilato de Metilo/ Mentol Natural	MINTALUB CR.35GR	29			<b>Antialérgicos</b>	Montelukast	AKAN COM.REC.10MG.30	18
Tramadol Clorhidrato	NAXODOL GOTAS.100MG/ML 10ML	29				Montelukast	AKAN COM.REC.4MG.30	18
Ciclobenzaprina Clorhidrato	NOSTADEN COM. 5MG.20	30				Montelukast	AKAN COM.REC.5MG.30	18
Ciclobenzaprina Clorhidrato	NOSTADEN COM.10MG.20	30	Cetirizina Diclorhidrato			COOLIPS COM.10MG.10	19	
Ibuprofeno	PYRIPED CAP.400 MG.20	30	Cetirizina Diclorhidrato			COOLIPS COM.10MG.30	19	
Ibuprofeno	PYRIPED COM.600MG.20	30	Oximetazolina Clorhidrato			FACIMIN SP.NAS.0.05% 10M	19	
Ibuprofeno	PYRIPED FTE.SUS.200MG.100	31	Loratadina			HYSTICLAR JBE.5MG.100ML	19	
Ibuprofeno	PYRIPED FTE.SUS.200MG.100	31	Levocetirizina diclorhidrato			LALERGIC BE GOTAS.5MG/ML.20	20	
Ketoprofeno	RELATENE CAP.50MG.10	31	Levocetirizina diclorhidrato	LALERGIC COM.5MG.30		20		
Ketoprofeno	RELATENE CAP.50MG.20	31	Desloratadina	NEOHYSTICLAR COM.5MG.30		20		

MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
<b>Hombres</b>	Tamsulosina clorhidrato	PROSTALIC COM 0,4 MG 30	48
	Sildenafil	ZILFIC COM. 50MG.10	48
	Sildenafil	ZILFIC COM.100MG. 1	48
	Sildenafil	ZILFIC COM.100MG. 5	48
<b>Metabólicos</b>	Metformina Clorhidrato	TAVIST XR COMLP.1000MG.30	50
<b>Mujer</b>	Ácido Mefenámico	ADESNA COM.500MG.10	52
	Lactulosa	AXANT SOL.65%.200ML	52
	Sulpirida	ISTEFRAL CAP.50MG.30	53
	Clormadinona Acetato/ Etinilestradiol	JULIETTE COM2MG/0,03MG.21	53
	Drospirenona/ Etinilestradiol	LADYGEX 20 COM.28	54
	Drospirenona/ Etinilestradiol	LADYGEX COM.28	54
	Nitrofurantoina	MATIDAN CAP.100MG.30	55
	Levonorgestrel/ Etinilestradiol	MINEVA E 150/30 21+7 COMP. REC. (MYL) BE	55
	Pargeverina Clorhidrato	PLAZOLIT FTE.GOTAS.10MG/M15	56
	Pargeverina Clorhidrato	PLAZOLIT GOTAS.5MG/ML.15ML	56
	Gestodeno micronizado/ Etinilestradiol micronizado	PRENAL 20 COM.REC.21	57
	Orlistat	SAGRAS CAP.120MG. 42	57
	Orlistat	SAGRAS CAP.120MG.105	57
	Desogestrel	SOLUNA COM.75MCG.28	58
	Desogestrel	SOLUNA E COM.21	58
	Desogestrel	SOLUNA E20 COM.21	59
	Doxilamina Succinato Piridoxina Clorhidrato	VITOMIT COM.10MG/10MG.30	59
<b>Respiratorio</b>	Salbutamol	ASMAVENT SF INHBUC.200DS	60
	Bromhexina Clorhidrato	BROMFIN JBE.8MG/5ML.100ML	60
	Hedera hélix	BRONTEC JBE.35MG/5ML100ML	61
	Clorhexidina Diclorhidrato/ Noscapina	BUCOGERM TOS COM.10	61
	Ambroxol Clorhidrato	MINTAMOX AD. JBE.30MG.100	61
	Ambroxol Clorhidrato	MINTAMOX PED. JBE.15MG.100	61
	Codeína Fosfato Pseudoefedrina Clorhidrato Clorfenamina Maleato"	NASOLVER JBE.100ML	62
	Cloruro de Sodio	RINOSTERYL SOLNAS.0,9% 30	62
	Oxolamina	TULOX AD. JBE.50MG/5ML100	62
	Oxolamina	TULOX PED. JBE.28MG/5ML100	62

MACROCATEGORÍA	MOLÉCULA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.
<b>Sistema nervioso</b>	Duloxetine	NEUROSTAB	64
	Venlafaxina.	NEZEL XR CAP.LP.150MG.30	64
	Venlafaxina.	NEZEL XR CAP.LP.75MG.30	65
	Zopiclona	ZONIX COM.7,5MG. 30	65
<b>Sup. Alimenticios y Edulcorantes</b>	Multivitaminico	FORTOTAL ACTIVE+ CAP.30	68
	Vitamina C	MINTAVIT-C COM.100MG.100	68
	Vitamina C	MINTAVIT-C COM.500MG.30	68

## GENÉRICOS

MACROCATEGORÍA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.	
<b>Analgesia</b>	CLONIXINATO DE LISINA 125mg REC 10 BE	74	
	KETOPROFENO 50mg CAP 20 BE	74	
	KETOPROFENO TU 200mg REC ENT LIBP 10 BE	74	
	KETOROLACO TROMETAMOL 10mg REC 10 BE	75	
	MELOXICAM 15mg COM 10 BE	75	
	MELOXICAM 7,5mg COM 15 BE	75	
	METAMIZOL NA 300mg MONOH COM 20 BE	76	
	NAPROXENO NA 550mg REC 10 BE	76	
	TRAMADOL HCL 50mg CAP 10 BE	77	
	<b>Antialérgicos</b>	CLORFENAMINA MALEATO 4mg COM 20 BE	78
		LORATADINA 5mg/5mL SOL ORAL 60mL 25 l BE	78
LORATADINA 5mg/5mL SOL ORAL 90mL BE		78	
PREDNISONA 5mg COM 20 BE		78	
<b>Antiinfecciosos</b>	ACICLOVIR 400mg COM 35 BE	80	
	ACICLOVIR 5% CREMA 5g	80	
	AMOXICILINA 500mg CAP 21 BE	81	
	AMOXICILINA 750mg COM 10 BE	81	
	AZITROMICINA 500mg REC 3 BE	82	
	AZITROMICINA 500mg REC 6 BE	82	
	BACITRACINA CON NEOMICINA UNGUENTO 15g	82	
	CEFRADINA 500mg CAP 8	83	
	CIPROFLOXACINO 500mg REC 6 BE	83	
	COTRIMOXAZOL 200/40mg/5mL SUSP ORAL100mL	84	
	COTRIMOXAZOL COM 20	84	
ERITROMICINA 500mg REC 8	85		
FLUCLOXACILINA 250mg/5mL POLVO 60mL	85		



MACROCATEGORÍA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.	MACROCATEGORÍA	DESCRIPTOR DE MERCADO	PÁG.	
<b>Antiinfecciosos</b>	FLUCLOXACILINA 250mg/5mL POLVO 60mL 25 C	86	<b>Mujer</b>	LEVONORGEST ETINILESTRIA 150/30 REC 21+7	100	
	GENTAMICINA 0,1% CREMA 15g	86		<b>Respiratorio</b>	AEROCAMARA UNIVERSAL	102
	KETOCONAZOL 200mg COM 10	86			CEFADROXILO 500MG CAP 500 BE	102
	LEVOFLOXACINO 500mg COM 7 BE	87			CEFADROXILO 500mg CAP 8 BE	102
	MEBENDAZOL 100mg COM MAST 6	87			NOSCAPINA 20mg COM 20	103
	NITROFURANTOINA MACROC 100mg CAP 10 BE	88			NOSCAPINA 5mg/5mL JBE 100mL BE	103
TERBINAFINA 250mg COM 30 BE	88	OXOLAMINA 28mg/5mL JBE 100mL BE			103	
<b>Cardiovascular</b>	ACETAZOLAMIDA 250mg COM 20	90			OXOLAMINA 50mg/5mL JBE 100mL BE	104
	AMIODARONA HCL 200mg COM 1005 BE I	90			SALBUTAMOL 2mg/5mL JBE 100mL BE	104
	AMIODARONA HCL 200mg COM 20 BE	90			<b>Sistema nervioso</b>	ALPRAZOLAM 0,5mg COM 30 BE
	AMLODIPINO 5mg COM 30 BE	91	BROMAZEPAM 3mg COM 30 BE			106
	AMLODIPINO 5mg COM 60 BE	91	CARBAMAZEPINA 200mg COM 20 BE	106		
	ATENOLOL 100mg COM 20 BE	91	CICLOBENZAPRINA HCL 10mg REC 20 BE	107		
	CAPTOPRIL 25mg COM 30 BE	92	CITALOPRAM 20mg COM 30 BE	107		
	ENALAPRIL MALEATO 5mg COM 20 BE	92	CLONAZEPAM 0,5mg COM 30 BE	108		
	ISOSORBIDA DINITRATO 10mg COM 60	93	CLONAZEPAM 2mg COM 30 BE	108		
	<b>Dermatología</b>	TETRACICLINA HCL 500mg CAP 8 BE	94	DIAZEPAM 10mg COM 20 BE		109
<b>Gástricas</b>		LOPERAMIDA HCL 2mg COM 6 BE	96	ESCITALOPRAM 10mg REC 30 BE		109
		TRIMEBUTINO MALEATO 100mg COM 20 BE	96	FLUOXETINA 20mg COM 20 BE		109
		LACTULOSA 65% SOL ORAL 200mL	97	SERTRALINA 100mg REC 30 BE	109	
	METOCLOPRAMIDA 10mg COM 24 BE	97	SERTRALINA 50mg REC 30 BE	110		
<b>Metabólicos</b>	ALOPURINOL 100mg COM 20 BE	98	ZOPICLONA 7,5mg REC 30 BE	110		
	ALOPURINOL 300mg COM 20 BE	98				
	GEMFIBROZILO 300mg COM 30 BE (CD)	98				
	GEMFIBROZILO 600mg COM 500 CD BE I	98				
	GEMFIBROZILO 600mg COM CD 20 BE	98				
	GLIBENCLAMIDA 5mg COM 30 BE	99				
	AC MEFENÁMICO 500mg 10 COM	99				



Marca



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN 

**AKAN®**  
ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene: Montelukast (como sal sódica) 10mg.

**Dosificación**  
La dosis para el tratamiento del asma en mayores de 15 años recomendada es de 1 comprimido de 10 mg en la noche. Para el tratamiento de la broncoconstricción inducida por el ejercicio: La dosis es de 10 mg de montelukast al menos 2 horas antes del ejercicio. No se debe tomar una nueva dosis dentro de las 24 horas siguientes a la administración. Los pacientes que ya están tomando montelukast para otra indicación (Incluyendo asma) no deben tomar una dosis adicional para prevenir la broncoconstricción inducida por el ejercicio. Los pacientes deben tener disponible un B-agonista de acción corta, en caso de crisis asmática.

Para el tratamiento de la rinitis alérgica estacional o perenne: Montelukast debe tomarse 1 vez al día en la noche. Para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica perenne en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores.

**Indicación**  
Indicado en la profilaxis y el tratamiento crónico del asma en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. Para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores.

**Contraindicaciones**  
Akan esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a Montelukast o a cualquier otro componente de la fórmula.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

**AKAN®**  
ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES

**Composición**  
Cada comprimido masticable contiene: Montelukast (como sal sódica) 4mg / 5mg.

**Dosificación**  
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento asociado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada para el asma, rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne es:

- Niños de 2 a 5 años: Un comprimido masticable de 4 mg, una vez en el día tomado de preferencia en la noche.
- Niños de 6 a 14 años: Un comprimido masticable de 5mg, una vez en el día tomado de preferencia en la noche.

**Indicación**  
Akan está indicado en la profilaxis y el tratamiento crónico del asma en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. Para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica estacional en adultos y pacientes pediátricos de 2 años de edad y mayores.

**Contraindicaciones**  
Akan esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a Montelukast o a cualquier otro componente de la fórmula.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

**COOLIPS®**  
ENVASES CON 10 Y 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene: Cetirizina DiClorhidrato 10 mg.

**Dosificación**  
Adultos: 1 comprimido al día.

**Indicación**  
Tratamiento de la congestión nasal, rinorrea y en alergias de diversas etiologías.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad a la droga. Embarazo y lactancia.



**B** Producto Bioequivalente  Solución nasal

PRODUCTO DISPONIBLE EN 

**FACIMIN®**  
FRASCO CON 10 ML DE SOLUCIÓN NASAL

**Composición**  
Cada 100 mL de solución nasal contiene: Oximetazolina Clorhidrato 50 mg.

**Dosificación**  
1 - 2 aplicaciones en cada fosa nasal en la mañana y en la noche, en mayores de 6 años.

**Indicación**  
Alivio temporal de la congestión nasal debida al resfrío común, fiebre del heno, sinusitis y algunas alergias de las vías respiratorias.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad a Oximetazolina, hipertiroidismo, enfermedad cardíaca, hipertensión, arterioesclerosis, diabetes Mellitus, inflamación de la próstata, glaucoma.



**B** Producto Bioequivalente  Jarabe

**HYSTICLAR®**  
FRASCO CON 100 ML JARABE

**Composición**  
Cada 5 mL de jarabe contiene: Loratadina 5 mg.

**Dosificación**  
Niños 2 a 5 años: 5mL / día.  
Mayores de 12 años: 10mL / día

**Indicación**  
Alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional y afecciones dermatológicas alérgicas.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad al fármaco. Pacientes con insuficiencia hepática o renal. Embarazo.







**LALERGIC GOTAS®**  
FRASCO GOTARIO CON 20 ML

**Composición**  
Cada 1 mL de solución oral contiene Levocetirizina diclorhidrato 5mg.

**Dosificación**  
Dosis pediátrica recomendada es 2,5mg de Levocetirizina (0,5 mL de solución oral) una vez al día, durante la tarde.

**Indicación**  
Alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional o perenne. Tratamiento de las manifestaciones cutáneas no complicadas.

**Contraindicaciones**  
Alergia hipersensibilidad a levocetirizina u otro ingrediente de este medicamento, o a la cetirizina. Si padece de deterioro grave de la función renal. En niños de 6 meses a 11 años con insuficiencia renal.

**B** Producto Bioequivalente Solución oral



**LALERGIC®**  
ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene Levocetirizina diclorhidrato 5mg.

**Dosificación**  
La dosis recomendada en adultos y mayores de 12 años es de 5mg una vez al día, de preferencia en la tarde.

**Indicación**  
Alivio de los síntomas asociados a rinitis alérgica estacional o perenne. Tratamiento de las manifestaciones cutáneas no complicadas.

**Contraindicaciones**  
Alergia hipersensibilidad a levocetirizina u otro ingrediente de este medicamento, o a la cetirizina. Si padece de deterioro grave de la función renal. En niños de 6 meses a 11 años con insuficiencia renal.

**B** Producto Bioequivalente Comprimidos recubiertos



**NEOHYSTICLAR®**  
ENVASES CON 30 Y 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene: Desloratadina 5 mg.

**Dosificación**  
Adultos: 1 comprimido recubierto una vez al día.

**Indicación**  
Alivio de los síntomas relacionados con la rinitis alérgica estacional. Alivio de los síntomas asociados con la urticaria idiopática crónica, como es el caso del alivio del prurito, disminución de tamaño y número de lesiones urticariales (ronchas).

**Contraindicaciones**  
No usar en pacientes con hipersensibilidad a la Desloratadina, Loratadina o algún componente de la formulación. Embarazo y lactancia.

**B** Producto Bioequivalente Comprimidos recubiertos



**NEOHYSTICLAR®**  
FRASCO CON 90 ML JARABE

**Composición**  
Cada 5 mL de jarabe contiene: Desloratadina 2,5 mg.

**Dosificación**  
En niños: de 2 a 5 años: 2,5 mL de jarabe (1,25 mg) una vez al día. En niños de 6 a 11 años: 5 mL de jarabe (2,5 mg) una vez al día.

**Indicación**  
Alivio de los síntomas relacionados con la rinitis alérgica estacional. Alivio de los síntomas asociados con la urticaria idiopática crónica, como es el caso del alivio del prurito, disminución de tamaño y número de lesiones urticariales (ronchas).

**Contraindicaciones**  
No usar en pacientes con hipersensibilidad a la Desloratadina, Loratadina o algún componente de la formulación. Embarazo y lactancia.

**B** Producto Bioequivalente Jarabe



**NIPOLEN®**  
ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

**Composición**  
Cada comprimido contiene: Clorfenamina Maleato 4 mg.

**Dosificación**  
Adultos: 4 mg cada 4 - 6 horas, no excediendo de 24 mg al día.

**Indicación**  
Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional o perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, reacciones alérgicas cutáneas no complicadas o leves.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad a Clorfenamina Maleato. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Embarazo y lactancia.

**B** Producto Bioequivalente Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



**NIPOLEN®**  
FRASCO CON 100 ML JARABE

**Composición**  
Cada 5 mL de jarabe contiene: Clorfenamina Maleato 2,5 mg.

**Dosificación**  
Niños de 6 a 12 años: 2.5 a 5 mL / cada 4 a 6 h; Niños mayores de 12 años y Ads.: 5 a 10 mL / cada 4 a 6 h.

**Indicación**  
Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional o perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, reacciones alérgicas cutáneas no complicadas o leves.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad a Clorfenamina Maleato. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Embarazo y lactancia.

Jarabe





**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

## BLONAX®

### ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

#### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg.

#### Dosificación

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos recubiertos 3 a 4 veces al día. Máximo 6 comprimidos al día.

#### Indicación

Tratamiento del dolor leve a moderado. Alta eficacia en dolor de tipo: odontológico, traumatológico, reumatológico, ginecológico, urogenital, oncológico,

otorrinolaringológico, neurológico, prequirúrgico y posquirúrgico.

#### Contraindicaciones

Alergia a Clonixinato de Lisina u otro analgésico no esteroide o a cualquier componente de la formulación. No debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario. Alcohol durante el tratamiento. Embarazo y lactancia.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## DROLSAN®

### ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

#### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Hidroxicloroquina Sulfato 200 mg.

#### Dosificación

Artritis reumatoidea: dosis inicial 400 a 600 mg 1 vez al día. Dosis de mantención: se continúa con una dosis que se encuentra en el rango de 200 mg a 400 mg al día. Lupus eritematoso: la dosis inicial es de 400 mg 1 ó 2 veces al día. Dependiendo de la respuesta del paciente puede ser reducida a un rango de 200 mg a 400 mg al día.

#### Indicación

Artritis reumatoidea, artritis juvenil crónica. Condiciones dermatológicas causadas o agravadas por la luz solar. Amebiasis extraintestinal, lupus eritematoso (discoide crónico y sistémico).

#### Contraindicaciones

Pacientes con Hipersensibilidad a Hidroxicloroquina o a cualquiera de los componentes de la formulación. Alergia a los derivados de la cloroquina. No tomar en embarazo, lactancia, maculopatía preexistente y en niños menores de 6 años.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

## BRODIFAC®

### ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

#### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Ketorolaco Trometamol 10 mg.

#### Dosificación

Adultos: 10 mg 3 o 4 veces al día.

#### Indicación

Alivio durante periodos cortos del dolor moderado a severo post operatorio, incluidos los dolores abdominales, ginecológicos, oftalmológicos, ortopédicos

o cirugía urológica. También se utiliza en el alivio de cólicos renales agudos, dolor asociado con trauma y dolor visceral asociado con cáncer.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ketorolaco Trometamol u otros AINEs. Úlcera péptica activa. Embarazo y lactancia. Falla renal. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario.



Gotas orales

## ELITIRAN®

### FRASCO GOTARIO CON 25ML

#### Composición

Cada mL (18 gotas) de suspensión para gotas orales contiene: Diclofenaco Sódico 15 mg.

#### Dosificación

Niños de 1 a 12 años, se basa en el peso corporal del paciente y es de 0,5 - 2 mg/kg de peso al día, fraccionado en 2 a 3 dosis.

#### Indicación

Tratamiento sintomático del estado febril y en procesos inflamatorios, dolorosos.

#### Contraindicaciones

Úlceras gastrointestinales, lupus eritematoso sistémico, discrasias sanguíneas activas o historia de ellas y porfiria hepática. Niños menores de 1 año. No debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario.



Solución en gel

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## DICOCEL®

### POMO CON 30 G DE GEL.

#### Composición

Cada 100 g de gel contiene: Diclofenaco Dietilamina 1,16 g (equivalente a 1 g de Diclofenaco Sódico).

#### Dosificación

Adultos: Aplicar localmente sobre la piel 3 o 4 veces al día, friccionando suavemente.

#### Indicación

Indicado para el alivio sintomático local del dolor e inflamación.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad al Diclofenaco, u otros componentes de la formulación. Pacientes a los que el Ácido Acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos pueden provocarles ataques de asma, urticaria o rinitis aguda. Embarazo y lactancia.



Cápsulas LP

## ELITIRAN GP®

### ENVASE CON 10 CÁPSULAS CON GRÁNULOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

#### Composición

Cada cápsula con gránulos recubiertos de liberación prolongada contiene: Diclofenaco Sódico 100 mg.

#### Dosificación

Adultos: una cápsula de 100 mg al día, ingerida sin masticar, durante o después de las comidas. La duración del tratamiento depende de la patología o respuesta clínica.

#### Indicación

Tratamiento sintomático de procesos inflamatorios y dolorosos. Estado febril.

#### Contraindicaciones

Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Embarazo y lactancia.





**B** Producto Bioequivalente Compridos recubiertos

### GENIOL 1®

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

#### Composición

Cada comprimido contiene Paracetamol 1000 mg.

#### Dosificación

Administrar 1 a 2 comprimidos. Puede repetirse la dosis cada 6 a 8 horas, con un máximo de 8 comprimidos. No administrar más de 4 g diarios.

#### Indicación

Tratamiento sintomático de dolores leves a moderados y estados febriles.

#### Contraindicaciones

No usar en pacientes alérgicos al Paracetamol o alguno de los componentes del medicamento. Este medicamento no se debe administrar a personas que sufren de enfermedad hepática o renal grave. Una administración repetida de Paracetamol está contraindicada en pacientes con anemia, enfermedad cardíaca o pulmonar grave.



Solución en polvo

### GENIOL COMPUESTO NOCHE®

SOBRE CON 5 G POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

#### Composición

Cada 5 g polvo contiene: Paracetamol 400 mg, Noscapina Clorhidrato (como monohidrato) 10mg; Cafeína 33 mg, Ácido Ascórbico 50 mg, Clorfenamina Maleato 4 mg.

#### Dosificación

1 sobre de GENIOL COMPUESTO con Clorfenamina (CALIENTE NOCHE) durante la noche.

#### Indicación

Alivio de los síntomas de la gripe y el resfrío común.

#### Contraindicaciones

Enfermedad hepática o renal severa. Alergias a Aminofilina, Teofilina u otras xantinas.



**B** Producto Bioequivalente Compridos

### GENIOL®

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

#### Composición

Cada comprimido contiene: Paracetamol 500 mg.

#### Dosificación

Adultos y niños mayores de 12 años: 500 mg a 1 g, 3 a 4 veces al día. No administrar más de 4 gramos diarios (8 comprimidos).

#### Indicación

Gripe, resfrío, dolores de cabeza, musculares, dentales

y lumbago. En adultos con intolerancia al ácido, salicílico, molestias gástricas y tendencia al sangramiento.

#### Contraindicaciones

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones: En personas que sufran de anemia, enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática o renal. Alergia al Paracetamol o algún componente de la fórmula.



Compridos recubiertos

### GENIOL FLU D/N®

ENVASE CON 15 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DÍA + 5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS NOCHE

#### Composición

Cada comprimido recubierto DÍA (amarillo) contiene: Paracetamol 500 mg, Pseudoefedrina Sulfato 60 mg. Cada comprimido recubierto NOCHE (azul) contiene: Paracetamol 500 mg, Pseudoefedrina Sulfato 60 mg, Clorfenamina Maleato 4 mg.

#### Dosificación

Adultos: 1 comprimido DÍA (amarillo) 3 veces al día y 1 comprimido NOCHE (azul) al acostarse. No administrar más de 4 g diarios de Paracetamol.

#### Indicación

Tratamiento sintomático de los estados gripales y resfrío común.

#### Contraindicaciones

Hipertensión severa, enfermedad hepática severa, cardiopatía isquémica. Embarazo y lactancia.



**B** Producto Bioequivalente Solución en polvo

### GENIOL COMPUESTO DÍA®

SOBRE CON 5 G POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

#### Composición

Cada 5 g polvo contiene: Paracetamol 400 mg, Noscapina Clorhidrato (como monohidrato) 10mg; Cafeína 33 mg, Ácido Ascórbico 50 mg.

#### Dosificación

2 a 3 sobres de GENIOL COMPUESTO (CALIENTE DÍA) durante el día.

#### Indicación

Alivio de los síntomas de la gripe y el resfrío común.

#### Contraindicaciones

Enfermedad hepática o renal severa. Alergias a Aminofilina, Teofilina u otras xantinas.



Jarabe

### GENIOL FLU JARABE®

FRASCO CON 100 ML JARABE

#### Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene: Paracetamol 125 mg, Pseudoefedrina Sulfato 30 mg, Clorfenamina Maleato 2 mg.

#### Dosificación

Niños de 3 a 6 años: Es de 5 mL de jarabe 3 veces al día y en niños de 7 a 12 años es de 7,5 mL de jarabe 3 veces al día.

#### Indicación

Alivio de los síntomas asociados a la gripe y al resfrío común, como fiebre, congestión nasal, dolores musculares, rinorrea y malestar general.

#### Contraindicaciones

Hipertensión severa, anemia, enfermedad hepática severa, cardiopatía isquémica. Embarazo y lactancia. Neonatos.

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Ecuador

Gotas  
orales**GENIOL INFANTIL GOTAS®**

FRASCO GOTARIO CON 15 ML

**Composición**

Cada mL de solución oral contiene: Paracetamol 100 mg.

**Dosificación**


3 a 5 veces al día, 2 a 5 años: 180 mg (50 gotas). Máximo diario 750 mg. 6 a 8 años: 320 mg (100 gotas). Máximo diario 1.200 mg. La dosis para niños menores de 2 años debe ser consultada con el Médico.

**Indicación**

Tratamiento sintomático de la fiebre y dolores de cabeza, musculares y dentales. Indicado en niños que presentan intolerancia al Ácido Acetilsalicílico, molestias gástricas y tendencia al sangramiento.

**Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a la droga o alguno de los componentes de la formulación. No administrar a personas que sufran de enfermedad hepática o renal grave.

Comprimidos  
masticables**GENIOL INFANTIL COMPRIMIDOS®**

ENVASES CON 16 COMPRIMIDOS MASTICABLES

**Composición**

Cada comprimido masticable contiene: Paracetamol 80 Mg / 160 Mg.

**Dosificación**

La dosis a administrar en niños es por kilo de peso corporal, 10 a 15 Mg por kilo de peso, la que debe ser administrada hasta 4 veces al día, con una dosis máxima diaria de 60 Mg por kilo de peso.

**Indicación**

Tratamiento sintomático de estados dolorosos leves a moderados y febriles.

**Contraindicaciones**

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones: Hepatitis, daño hepático o renal severo. Alergia al Paracetamol o a algún componente de la fórmula.

Producto  
BioequivalenteComprimidos  
masticables**HASSAPIRIN 100®**

ENVASES CON 20, 30 Y 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES

**Composición**

Cada comprimido contiene: Ácido Acetilsalicílico 100 mg.

**Dosificación**Niños de 1 a 3 años: 1 comprimido 3 veces al día.  
Niños 4 a 6 años: 2 comprimidos 3 veces al día.  
Niños 7 a 9 años: 3 comprimidos 3 veces al día.**Indicación**

Este medicamento se usa como analgésico en el tratamiento del dolor leve a moderado asociado a inflamación y para reducir la fiebre.

**Contraindicaciones**

Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico o a otros salicilatos, asma, Ulceras gastrointestinales graves, Insuficiencia renal o hepática grave, último trimestre del embarazo.

Solución  
en gel**MINTALUB®**

POMO CON 35 G. DE CREMA

**Composición**

100 g de crema dérmica contiene: Salicilato de Metilo: 12,8 g, Mentol Natural 5,91 gr.

**Dosificación**

Aplicar con un pequeño masaje en la zona afectada, 3 a 4 veces al día.

**Indicación**

Alivio de dolores musculares y articulares, causados por esfuerzos físicos, torceduras, tensión muscular y golpes leves.

**Contraindicaciones**

Alergia a los salicilatos o a otros componentes de la fórmula.

Producto  
BioequivalenteGotas  
orales**NAXODOL GOTAS®**

FRASCO GOTARIO CON 10 ML

**Composición**

Cada mL de solución oral contiene: Tramadol Clorhidrato 100 mg.

**Dosificación**Dosis inicial: 15 a 30 gotas diluidas en agua, con 1 cucharadita de azúcar cada 4 a 6 horas.  
Dosis de mantención: 15 a 30 gotas cada 6 a 8 horas.  
No exceder los 400 mg por día.**Indicación**

Dolor post-operatorio de pacientes que han sufrido diversas cirugías. Alivio del dolor moderado a severo.

**Contraindicaciones**

Alergia a Tramadol o medicamentos tipo morfina. Si en las últimas dos semanas ha estado tomando inhibidores de la monoaminoxidasa. Epilepsia no controlada. Función renal alterada y/o enfermedad hepática.

PRODUCTO  
DISPONIBLE EN

continúa



**B** Producto Bioequivalente  Compridos recubiertos

## NOSTADEN®

ENVASES CON 20 COMPRIDOS RECUBIERTOS

### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Ciclobenzaprina Clorhidrato 5 ó 10 mg.

### Indicación

Tratamiento sintomático y coadyuvante, tanto en la terapia de reposo como física, para el alivio del espasmo muscular, asociado a condiciones musculoesqueléticas dolorosas y agudas.

### Dosificación

Adultos: 5 o 10 mg 3 veces al día. La dosis máxima es de 60 mg diarios.

### Contraindicaciones

Alergia a Ciclobenzaprina Clorhidrato o algún otro componente de la fórmula. Hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias y otros desórdenes de bloqueo y conducción cardíaca, durante la recuperación tras un infarto al miocardio. Pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa (moclobemida, selegilina) incluso dentro de los 14 días siguientes terminado el tratamiento.



**B** Producto Bioequivalente  Cápsulas blandas

PRODUCTO DISPONIBLE EN

## PYRIPED®

ENVASE CON 20 CÁPSULAS BLANDAS

### Composición

Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 400 mg.

### Indicación


Tratamiento sintomático de estados inflamatorios dolorosos, de leves a moderados y/o estados febriles. Tratamiento de la dismenorrea primaria. Alivio de síntomas y signos de artritis reumatoidea y osteoartritis.

### Dosificación

1 cápsula blanda 3 a 4 veces al día.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a Ibuprofeno u otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o a cualquier componente de la formulación. Pólipo nasal, angioedema o broncoespasmo desencadenado por otro medicamento como el ácido Acetilsalicílico. Úlcera gastrointestinal, enfermedad hepática o renal severa. Embarazo y lactancia. No se debe usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico) en el periodo inmediato a una cirugía de bypass gástrico.



## PYRIPED®

FRASCO CON 100 ML JARABE

### Composición

Cada 5 mL de suspensión oral contiene: Ibuprofeno 100 mg.

### Dosificación

Niños de 6 meses a 12 años la dosis es en base al peso corporal, siendo de 5 a 10 mg por kilo de peso (2,5 a 5 mL, para 10 kilos de peso) cada 8 horas. La dosis máxima recomendada es 40 mg/kg de peso, en el día.

### Indicación

Tratamiento de estados inflamatorios dolorosos leves a moderados y/o estados febriles.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ibuprofeno, a otros AINEs o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia, niños menores de 6 meses. En ancianos, se debe utilizar la dosis efectiva más baja. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario.



PRODUCTO DISPONIBLE EN

## PYRIPED FORTE®

FRASCO CON 100 ML JARABE

### Composición

Cada 5 mL de suspensión oral contiene: Ibuprofeno 200 mg.

### Dosificación

Niños de 6 meses a 12 años la dosis es en base al peso corporal del menor, siendo de 5 a 10 mg por kilo de peso cada 8 horas. La dosis máxima recomendada es 40 mg/kg de peso, en el día. Los tratamientos no deben exceder de una semana sin control médico.

### Indicación

Tratamiento sintomático de afecciones dolorosas y/o febriles de niños mayores de 6 meses.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ibuprofeno, a otros AINEs o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia, niños menores de 6 meses. En ancianos, se debe utilizar la dosis efectiva más baja. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario.



**B** Producto Bioequivalente  Cápsulas

## RELATENE®

ENVASES CON 10 Y 20 CÁPSULAS

### Composición

Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 50 mg.

### Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos y postquirúrgicos.

### Dosificación

Una cápsula de 50 mg, 3 o 4 veces al día.

### Contraindicaciones

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Embarazo, lactancia, alergia a Ketoprofeno, otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal o a algún componente de la formulación. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, daño renal o hepático severo.



**B** Producto Bioequivalente  Compridos recubiertos

## RELATENE®

ENVASES CON 10 Y 20 COMPRIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO

### Composición

Cada comprimido con recubrimiento entérico contiene: Ketoprofeno 100 mg.

### Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos, postquirúrgicos.

### Dosificación


1 comprimido 3 veces al día.

### Contraindicaciones

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Embarazo, lactancia, traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos, postquirúrgicos. En ancianos, se debe utilizar la dosis efectiva más baja. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de bypass coronario.







**ALMAXOL®**

ENVASES CON 7 Y 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Moxifloxacin clorhidrato 436,33 mg (equivalente a 400 mg de Moxifloxacin)

**Indicación**

Tratamiento de infecciones cutáneas y tejidos blandos. Tratamiento de adultos (18 años de edad o más) con infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores como: sinusitis aguda, exacerbaciones agudas de bronquitis crónicas, neumonía adquirida en la comunidad por microorganismos sensibles. Infecciones intraabdominales complicadas, incluidas infecciones polimicrobianas como la de los abscesos.

Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) no complicada sin un absceso asociado a la trompa de falopio, ovario o pelvis (por ej. infecciones del aparato genital femenino superior incluyendo salpingitis y endometritis).

**Dosificación**

La dosis recomendada de Moxifloxacin es 400 mg una vez al día (1 comprimido recubierto) para las indicaciones antes mencionadas. Esta dosis no debe ser excedida.

**Contraindicaciones**

Hipersensibilidad al principio activo u otras quinolonas o algún componente de la formulación. Embarazo y período de lactancia. Menor de 18 años de edad (adolescentes y niños en etapa de crecimiento).

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos



**DONTER®**

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS

**Composición**

Cada comprimido contiene: Terbinafina (como clorhidrato) 250 mg.

**Indicación**

Tratamiento de infecciones de la piel y uñas causadas por dermatofitos como Trichophyton, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum y Candida.

**Dosificación**

Adultos y niños de peso superior a 40 kg: Un comprimido al día. La duración del tratamiento varía según la indicación y la severidad de la infección.

**Contraindicaciones**

Pacientes con hipersensibilidad a Terbinafina o a algún componente de la formulación.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos



**DONTER®**

POMO CON 15 G DE CREMA

**Composición**

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Terbinafina Clorhidrato 1 g.

**Indicación**

Tratamiento de tinea corporis, tinea cruris y tinea pedis interdigital y plantar, tinea capitis y onicomicosis.

**Dosificación**

Aplicar 1 a 2 veces al día sobre la piel limpia y seca, una capa delgada de crema y friccionar suavemente sobre el área afectada.

**Contraindicaciones**

Pacientes con hipersensibilidad a Terbinafina o a algún componente de la formulación.

Crema

PRODUCTO DISPONIBLE EN



**TRELIBEC FORTE®**

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS

**Composición**

Cada comprimido fuerte contiene: Sulfametoxazol 800 mg, Trimetoprima 160 mg.

**Indicación**

Infecciones urinarias, gastrointestinales, otitis media aguda e infecciones del tracto respiratorio superior producidas por organismos susceptibles demostrado por antibiograma.

**Dosificación**

Adultos: 1 comprimido, 2 veces al día.

**Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a Sulfametoxazol, otra Sulfonamida, Trimetoprima o a alguno de los componentes de la formulación. Pacientes con insuficiencia renal o hepática severa, con deficiencia de glucosa - 6 - fosfato deshidrogenasa. Embarazo y lactancia.

Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN





**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

## DIOTENSIL®

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS DE 10MG Y 20MG

### Composición

Cada comprimido contiene Enalapril Maleato 10 o 20 mg.

### Dosificación

La dosis usual está en el rango de 10-40 mg 1 vez al día o repartida en 2 dosis diarias.

### Indicación

Tratamiento de la hipertensión esencial cuando los métodos no farmacológicos han fallado o han sido insuficientes. En combinación con otras drogas en falla cardíaca congestiva.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Enalapril Maleato, otro inhibidor de la enzima convertidora de Angiotensina (ECA) o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con antecedentes de angioedema relacionado a inhibidores de la ACE. Embarazo y lactancia.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

## LOPREN®

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: losartán potásico 50mg

### Dosificación

1 a 2 comprimidos recubiertos al día. La suspensión del tratamiento debe hacerse en forma gradual para evitar que se produzca un efecto rebote.

### Indicación

Hipertensión arterial esencial leve a moderada. Insuficiencia cardíaca congestiva.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Losartán Potásico o a cualquier componente de la fórmula. Enfermedad hepática, al riñón o con estenosis arterio renal. Embarazo y lactancia.





Crema  
dérmica

### CREMINEM®

POMO CON 20 G DE CREMA

#### Composición

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Clotrimazol 1 g.

#### Dosificación

La dosis varía de acuerdo con la gravedad y extensión de la lesión dérmica. Aplicar una cantidad suficiente de crema para cubrir el área afectada, habitualmente 2 veces al día.

#### Indicación

Tratamiento tópico de infecciones por hongos como tinea pitiriasis versicolor y candidiasis.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga o alguno de los componentes de la crema. No debe ser usada en los ojos, ni en lesiones ulceradas. Primer trimestre de embarazo.



Crema  
dérmica

### CREMINEM B®

POMO CON 15 G DE CREMA

#### Composición

Cada 100 g de crema contiene: Clotrimazol 1 g, Betametasona (como dipropionato) 0,05 g.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones por hongos como tiñas y candidiasis complicadas con inflamación y prurito.

#### Dosificación

Adultos: 2 aplicaciones diarias sobre el área afectada. La duración de la terapia debe ser máximo 14 días.

#### Contraindicaciones

Lesiones cutáneas, infecciones bacterianas, virales, parasitarias. Hipersensibilidad a la droga o alguno de los componentes de la crema. Primer trimestre de embarazo. No debe ser usado en los ojos.

PRODUCTO  
DISPONIBLE EN



Crema  
dérmica

### CREMIRIT®

POMO CON 15 G DE CREMA

#### Composición

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Betametasona (como dipropionato) 0,05 g.

#### Indicación

Alivio de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden a corticoesteroides.

#### Dosificación

Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el área afectada 1 o 2 veces al día.

#### Contraindicaciones

Lesiones ulcerosas, acné, rosácea, dermatitis, lesiones de la piel causadas por infecciones virales primarias. Hipersensibilidad a Betametasona u otros corticoides.

PRODUCTO  
DISPONIBLE EN



Crema  
dérmica

### LISOVYR®

POMO CON 5G Y 15 G DE CREMA

#### Composición

Cada 100 g de Crema dérmica contiene: Aciclovir 5 g.

#### Indicación

Herpes labial y herpes genital inicial y recurrente. Como coadyuvante del Aciclovir oral en el tratamiento de estas infecciones.

#### Dosificación

Aplicar 4 - 6 veces al día sobre el área afectada.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No aplicar en los ojos. Embarazadas.

PRODUCTO  
DISPONIBLE EN



Crema  
dérmica

### SORIDERMAL®

POMO CON 20 G DE CREMA

#### Composición

Cada 100 g de crema dérmica contiene: Ketoconazol 2 g.

#### Indicación

Dermatomicosis debidas a dermatofitos (Trichophyton, Microsporum y Epiderphyton) con diferentes localizaciones, balanopostitis, oniquia y paroniquia.

#### Dosificación

Aplicar la crema sobre el área afectada, 1 a 2 veces al día, por 2 a 4 semanas.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ketoconazol o a alguno de los componentes de la formulación. No debe ser usado en el ojo. Embarazo y lactancia.



Jabón  
en barra

### ACX AZUFRE®

JABÓN BARRA 100G

#### Indicación

Jabón en barra anti-imperfecciones Azufre, barra de glicerina vegetal efecto antisebo limpia profundamente.

#### Dosificación

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.



Jabón  
en barra

### ACX CARBÓN®

JABÓN BARRA 100G

#### Indicación

Jabón en barra anti-imperfecciones Carbón, barra de glicerina vegetal, disminuye la grasa y el brillo, efecto purificante, con carbón y macropartículas exfoliantes.

#### Dosificación

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.



Jabón  
en barra

### ACX® EXFOLIANTE JABÓN BARRA

JABÓN BARRA 100G

#### Indicación

Jabón en barra anti-imperfecciones. Exfoliante, barra de glicerina vegetal, con micropartículas exfoliantes, exfolia suavemente.

#### Dosificación

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.



Jabón  
en barra

### ACX® FORTE

JABÓN BARRA 100G

#### Indicación

Aplicar sobre la piel humeda reforzando las zonas con más imperfecciones del rostro y cuerpo. Dejar actuar unos minutos y luego enjuagar con abundante agua. Para mejores resultados utilizar 2 veces al día.

#### Dosificación

Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.



Gel

### ACX® GEL SECANTE CON COLOR PIEL

POMO CON 25G DE GEL

#### Indicación

Gel secante anti-imperfecciones con color. Disminuye rápidamente las imperfecciones localizadas, cubriendo mientras actúa y atenuando el rojo de la imperfección.

#### Dosificación

Aplicar la cantidad suficiente directamente sobre la imperfección y dejar secar. De preferencia utilizar antes de dormir, de ser necesario repetir aplicación en la mañana.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.





Gel

## ACX® GEL SECANTE INCOLORO

POMO CON 25G DE GEL

### Indicación

Gel secante anti-imperfecciones incoloro. Disminuye rápidamente las imperfecciones localizadas, atenuando el rojo de las imperfecciones.

### Dosificación

Aplicar cantidad suficiente directamente sobre la imperfección y dejar secar. De preferencia utilizar antes de dormir, de ser necesario repetir aplicación en la mañana.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.



Espuma

## ACX® ESPUMA DE LIMPIEZA FACIAL CORPORAL

FRASCO 200 ML ESPUMA DE LIMPIEZA

### Indicación

Espuma de limpieza facial y corporal. Limpia tu cara y cuerpo sin reseca piel, además de ayudar a combatir y prevenir imperfecciones.

### Dosificación

Aplicar mediante movimientos circulares sobre la piel húmeda reforzando zonas con más imperfecciones del cuerpo y rostro. Dejar actuar unos minutos y luego enjuagar con abundante agua. Para mejores resultados, utilizar dos veces al día.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.







Comprimidos masticables

## ACIFIN®

### ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS MASTICABLES

#### Composición

Cada comprimido masticable contiene: Magaldrato 480 mg, Simeticona 100 mg.

#### Indicación

Antiácido, antiflatulento, contiene magaldrate (antiácido) y simeticona, sustancia encargada de la absorción de los gases generados durante la digestión que son causantes del malestar.

#### Dosificación

1 o 2 comprimidos masticables luego de las comidas o en la noche antes de dormir.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Simeticona, Magaldrato o alguno de los componentes de su fórmula. En caso de Insuficiencia Renal grave.



Comprimidos

## BUTON®

### ENVASES CON 10 Y 100 COMPRIMIDOS

#### Composición

Cada comprimido contiene Atropina Sulfato Monohidrato 0,50 mg Papaverina Clorhidrato 40,00 mg.

#### Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado para su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 1 comprimido 3 a 4 veces al día.

#### Indicación

Tratamiento sintomático de los espasmos intestinales o renales, dismenorrea y salivación o sudoración excesiva.

#### Contraindicaciones

Glaucoma, retención urinaria, insuficiencia cardíaca, hipersensibilidad a las drogas. Embarazo y lactancia. Pacientes con obstrucción del tubo digestivo, dolor intestinal de etiología incierta, hipertrofia prostática.



Producto Bioequivalente Comprimidos

## COLIPER®

### ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS

#### Composición

Cada comprimido contiene: Loperamida Clorhidrato 2 mg.

#### Dosificación

En diarrea aguda en adultos: 2 comprimidos (4 mg) y luego 1 comprimido (2 mg) después de cada deposición líquida, máximo 16 mg/día.

#### Indicación

Tratamiento sintomático de la diarrea aguda no específica.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. Embarazo y lactancia. Pacientes con colitis pseudomembranosa asociada a antibióticos.



Producto Bioequivalente Cápsulas

PRODUCTO DISPONIBLE EN HUNGRÍA

## DOCIVIN®

### ENVASE CON 30 CÁPSULAS

#### Composición

Cada cápsula contiene: Domperidona 10 mg.

#### Indicación

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos, sensación de ardor en el estómago.

#### Dosificación

En adultos y niños mayores de 12 años es de 10 mg, 3 a 4 veces al día.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Domperidona, embarazo y lactancia, presencia de hemorragia intestinal, obstrucción mecánica o perforación, tumores hipofisiarios liberadores de prolactina.



Gotas orales

## DOCIVIN GOTAS®

### FRASCO GOTARIO CON 15 ML

#### Composición

Cada 1 mL de suspensión (20 gotas) para gotas orales contiene: Domperidona 10 mg.

#### Dosificación

Administrar 15 a 30 minutos antes de las comidas. Niños de 1 a 3 años: 2,5 mL 3 veces al día. De 4 a 7 años: 5 gotas, 5 mL 3 veces al día. De 7 a 12 años: 10 gotas, 7,5 mL 3 veces al día. Dosis usual para mayores de 12 años y adultos: 20 gotas, 10 mL 3 veces al día.

#### Indicación

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos, sensación de ardor estomacal. Reflujo gastroesofágico.

#### Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. Cuando la estimulación de la motilidad gástrica puede ser peligrosa (hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación) Pacientes con tumores hipofisiarios liberadores de prolactina.







Comprimidos recubiertos LP

PRODUCTO DISPONIBLE EN



**PROSTALIC®**

30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

**Composición**

Cada Comprimido Recubierto de Liberación Prolongada contiene Tamsulosina clorhidrato 0,4mg.

**Dosificación**

Dosis usual diaria de 0,4 mg.

**Indicación**

Tratamiento de los síntomas funcionales de la Hiperplasia Prostática Benigna.

**Contraindicaciones**

Pacientes con Hipersensibilidad a Tamsulosina o a cualquier componente del producto, Hipotensión Ortostática observada tempranamente (Historia de Hipotensión Ortostática) o Insuficiencia Hepática severa.



Producto Bioequivalente

Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



**ZILFIC®**

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Sildenafil (como citrato) 50 mg.

**Dosificación**

1 comprimido de 50 mg 1 a 4 horas antes de la actividad sexual.

**Indicación**

Tratamiento de la disfunción eréctil.

**Contraindicaciones**

No usar en pacientes que presenten Fibrosis Cavernosa, calcificación o angulación, desórdenes de sangramiento, Falla cardíaca, angina inestable, hipertensión o hipotensión, arritmias, infarto al miocardio. En Enfermedad hepática o cirrosis, Mielomas o leucemia, priapismo, trombocitopenia, enfermedad de la función renal o Retinitis pigmentosa.



Producto Bioequivalente

Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



**ZILFIC®**

ENVASES CON 1 Y 5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**

Cada comprimido recubierto contiene: Sildenafil (como citrato) 100 mg.

**Dosificación**

1 comprimido de 100 mg 1 a 4 horas antes de la actividad sexual.

**Indicación**

Tratamiento de la disfunción eréctil.

**Contraindicaciones**

No usar en pacientes que presenten Fibrosis Cavernosa, calcificación o angulación, desórdenes de sangramiento, Falla cardíaca, angina inestable, hipertensión o hipotensión, arritmias, infarto al miocardio. En Enfermedad hepática o cirrosis, Mielomas o leucemia, priapismo, trombocitopenia, enfermedad de la función renal o Retinitis pigmentosa. Hipersensibilidad a la droga o a alguno de los componentes de la formulación.





**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos LP

## TAVIST XR®

### 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

#### Composición

Cada comprimido de liberación prolongada contiene Metformina Clorhidrato 500 mg.  
Cada comprimido de liberación prolongada contiene Metformina Clorhidrato 1000 mg.

#### Indicación

Indicado para mejorar el control glicémico en adultos con Diabetes tipo 2.

#### Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento según el caso particular de cada uno. La dosis máxima recomendada es de 2000 mg / día.

#### Contraindicaciones

Alergia a la Metformina o a cualquiera de los componentes de la formulación, si padece de Diabetes Mellitus Juvenil (insulina dependiente o tipo I), en Diabetes complicadas con acidosis o cuando existe insuficiencia o disfunción renal (aclaramiento de creatinina < 60 mL / min).





**ADESNA®**  
ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS

**Composición**  
Cada comprimido contiene: Ácido Mefenámico 500 mg.

**Indicación**  
Dolor leve a moderado de variada etiología. Alivio sintomático de la dismenorrea primaria y en el dolor post-inserción de DIU.

**Dosificación**  
Dosis usual recomendada es: 500 mg seguidos de 250 mg cada 6 horas, por un periodo de 2 a 3 días.

**Contraindicaciones**  
No usar en: Casos de hipersensibilidad a la droga o que han sufrido reacciones de hipersensibilidad a aspirina u otros agentes antiinflamatorios no esteroideos. Pacientes con úlcera activa o con inflamación crónica del tracto gastrointestinal alto o bajo. En embarazo y lactancia. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de by pass coronario.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos



**AXANT®**  
FRASCO CON 200 ML SOLUCIÓN ORAL 65%

**Composición**  
Cada 100 mL contiene: Lactulosa al 65% 128,14 g (equivalente a 65 g de lactulosa).

**Dosificación**  
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:  
•Constipación crónica: 15 a 30mL al día. Se requieren de 24 a 48 horas para obtener un adecuado movimiento intestinal.  
•Encefalopatía portal: inicialmente, 30 a 45mL 3 o 4 veces al día. Luego la dosis debe ser ajustada según los requerimientos de cada paciente hasta obtener 2 a 3 deposiciones con heces blandas al día.

**Indicación**  
Prevención y tratamiento de la encefalopatía portal sistémica y tratamiento sintomático del estreñimiento crónico.

**Contraindicaciones**  
Pacientes con diabetes mellitus o que requieran baja dieta de galactosa, sangramiento rectal no diagnosticado, obstrucción intestinal, falla cardíaca congestiva, hipertensión, apendicitis o síntomas de apendicitis, hipersensibilidad.



Jarabe



PRODUCTO DISPONIBLE EN



**ISTEFRAL®**  
ENVASE CON 30 CÁPSULAS

**Composición**  
Cada cápsula contiene: Sulpirida 50 mg.

**Indicación**  
Estados ansioso-depresivos y depresivo-reactivos; depresión del anciano; colopatía funcional; cefalea psicógena.

**Dosificación**  
La dosis usual recomendada es: En estados ansiosos moderados del adulto: 50 mg a 150 mg al día.

**Contraindicaciones**  
Está contraindicado en pacientes que presentan hipersensibilidad al fármaco, en desórdenes hepáticos y extrapiramidales, feocromocitoma, síndrome de excitación psicomotriz y primer trimestre del embarazo.

**B** Producto Bioequivalente  Cápsulas



**JULIETTE®**  
ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene Clormadinona Acetato 2.00 mg; Etinilestradiol 0.03 mg.

**Dosificación**  
Tome su comprimido de preferencia a la misma hora todos los días, si es necesario con un poco de agua, sin masticarlo. Siga la dirección de las flechas hasta que se haya tomado todos los 21 comprimidos. Durante los 7 días siguientes no tome ningún comprimido.

**Indicación**  
Anticonceptivo hormonal. Tratamiento de acné pápulo-pustular moderado en mujeres para quienes está indicada la anticoncepción hormonal con etinilestradiol/clormadinona acetato.

**Contraindicaciones**  
No se debe utilizar anticonceptivos orales combinados en presencia de ninguna de las siguientes enfermedades: Riesgo de Tromboembolismo venoso, Cirugía mayor con inmovilización prolongada, riesgo de Tromboembolismo arterial, historial de migraña con síntomas neurológicos focales, hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos





**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

**LADYGEX®**  
ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS

**Composición**  
Cada estuche contiene un blister con 28 comprimidos, 21 con principio activo: Drospirenona 3 mg. y Etinilestradiol 30 mcg. 7 comprimidos con placebo.

**Dosificación**  
Los comprimidos deben tomarse por vía oral en el orden indicado en el blister, a la misma hora, todos los días, con líquido si fuera necesario. Se debe iniciar tomando un comprimido de color amarillo pálido, diariamente y de forma consecutiva, durante los primeros 21 días. Al terminar los comprimidos de color amarillo, continuar con la toma de los comprimidos de color blanco, diariamente y de forma consecutiva por 7 días. Al terminar el último comprimido blanco, iniciar al día siguiente un nuevo envase.

**Indicación**  
Es un anticonceptivo oral combinado (AOC) que trabaja principalmente suprimiendo la ovulación. Además, los agentes AOC causan cambios del moco cervical que bloquean la penetración del esperma y cambios endometriales que reducen la probabilidad de implantación.

**Contraindicaciones**  
Trastornos tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas, influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes de Ladygex®.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

**LADYGEX-20®**  
ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS

**Composición**  
Cada estuche contiene un blister con 28 comprimidos, 24 con comprimido activo: Drospirenona (Micronizado) 3.00 mg; Etinilestradiol (Micronizado) 0.02 mg. 4 comprimidos con placebo.

**Dosificación**  
Los comprimidos deben tomarse todos los días aproximadamente a la misma hora con un vaso de agua. La toma de comprimidos es continua, se debe tomar un comprimido diariamente durante 28 días consecutivos, primero se deben tomar los 24 comprimidos activos y luego los 4 comprimidos inactivos. Cada nuevo envase se empieza al día siguiente de terminar el último comprimido placebo del envase anterior.

**Indicación**  
Anticonceptivo oral combinado (AOC) que contiene 2 hormonas femeninas (etinilestradiol y drospirenona) presentes en bajas dosis. Hace que el ciclo sea más regular, la menstruación suele ser menos dolorosa y la hemorragia menos intensa, lo cual puede disminuir la incidencia de un déficit de hierro (anemia).

**Contraindicaciones**  
Trastornos tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas, influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes de Ladygex®.



**B** Producto Bioequivalente  Cápsulas

**MATIDAN®**  
ENVASE CON 30 CAPSULAS CON MACROCRISTALES.

**Composición**  
Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100mg (macrocrisiales).

**Dosificación**  
Administrar con las comidas. Adultos: 100 mg 3 veces/día. La terapia debe prolongarse como mínimo 1 semana y por lo menos 3 días después que se ha logrado la ausencia de bacterias en la orina.

**Indicación**  
Infecciones del tracto urinario causadas por bacterias sensibles a la nitrofurantoina.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad a Nitrofuranos. Embarazo y lactancia. Niños menores de un mes.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

**MINEVA E®**  
ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición**  
Cada estuche contiene 21 comprimidos activos de color blanco y 7 comprimidos placebo inactivos de color amarillo. Cada comprimido recubierto activo de color blanco contiene Levonorgestrel (Micronizado) 0,150 mg y Etinilestradiol (Micronizado) 0,030 mg.

**Dosificación**  
Tomar el comprimido recubierto sin masticar, con algo de líquido y siempre a la misma hora. El tratamiento se inicia el 1° día de su ciclo menstrual (1° día de sangrado). Comience con los comprimidos de color blanco (en total 21). Luego de la toma del último comprimido blanco, se inicia con los comprimidos de color amarillo (en total 7) Una vez concluidos los comprimidos de color amarillo debe iniciar la administración de un nuevo envase (haya o no experimentado menstruación).

**Indicación**  
Anticonceptivo oral.

**Contraindicaciones**  
No se debe utilizar en las siguientes condiciones. Si cualquiera de estos cuadros aparece por primera vez durante su uso, se debe suspender inmediatamente el tratamiento. Presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), Presencia o riesgo de tromboembolismo arterial (TEA). Embarazo conocido o sospecha del mismo, hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Hemorragia vaginal no diagnosticada, presencia o antecedentes de tumores hepáticos, sospecha de tumores malignos dependientes de los esteroides sexuales.





PRODUCTO  
DISPONIBLE EN



## PLAZOLIT®

FRASCO GOTARIO CON 15 ML

### Composición

Cada 1 mL de solución contiene Pargoverina clorhidrato 5 mg.

### Indicación

Tratamiento de espasmos de origen intestinal, biliar, renal y del aparato genito urinario.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es: 1 mL (30 gotas) 3 a 5 veces al día.

### Contraindicaciones

Glaucoma de ángulo abierto, uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, estenosis pilórica, ileo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave, miastenia gravis.



## PLAZOLIT® FORTE

FRASCO GOTARIO CON 15 ML

### Composición

Cada 1 mL de solución oral, contiene Pargoverina clorhidrato 10 mg.

### Indicación

Tratamiento de espasmos de origen intestinal, biliar, renal y del aparato genitourinario.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es 1 mL (30 gotas) 3 a 5 veces al día.

### Contraindicaciones

Glaucoma de ángulo abierto, uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, estenosis pilórica, ileo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave, miastenia gravis.



Producto  
Bioequivalente



Comprimidos  
recubiertos

## PRENAL®

ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Gestodeno micronizado 0,0750 mg / Etinilestradiol micronizado 0,0200 mg.

### Dosificación

Los comprimidos deben tomarse en el orden indicado todos los días aproximadamente a la misma hora, con un poco de líquido si es necesario. Se tomará un comprimido diario durante 21 días consecutivos. Comenzar a tomar el siguiente envase el día 8.

### Indicación

Anticoncepción oral.

### Contraindicaciones

Presencia o antecedentes de tromboembolismo (trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar) con o sin factores de riesgo. Presencia o antecedentes de tromboembolismo arterial (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular) o estadios prodrómicos (por ejemplo: ataque isquémico transitorio,

angina de pecho). Predisposición hereditaria o adquirida a trombosis venosa o arterial, tal como proteína C activada falta de APC resistente, deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticardiolipina, anticoagulante lúpico). Presencia de factores de riesgo para una trombosis arterial. Hipertensión grave. Diabetes complicada con micro o macroangiopatía. Dislipoproteinemia grave. Enfermedades malignas o sospecha de estas en órganos genitales o mamas dependiente de esteroides sexuales. Presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave mientras los valores de la función hepática no han vuelto a la normalidad. Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). Hemorragia vaginal no diagnosticada. Migraña con sintoma focal neurológico. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.



PRODUCTO  
DISPONIBLE EN



## SAGRAS®

ENVASES CON 42 Y 105 CÁPSULAS

### Composición

Cada cápsula contiene: Orlistat 120 mg.

### Indicación

Tratamiento a largo plazo de la obesidad, incluidos aquellos pacientes que presentan factores de riesgo asociados a la obesidad. El tratamiento debe apoyarse en una dieta hipocalórica moderada.

### Dosificación

Una cápsula 3 veces al día, tomada inmediatamente antes, durante la misma o hasta una hora después de cada comida principal. Si una comida no contiene grasa, puede omitirse la dosis.

### Contraindicaciones

Malabsorción crónica, colestasis, lactancia. Hipersensibilidad al Orlistat o algún otro componente de la formulación. No se recomienda el uso durante el embarazo. No se recomienda su uso junto a vitaminas liposolubles.

**SOLUNA®**

ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS

**Composición**

Cada estuche contiene un blister con 28 comprimidos que contienen:  
Desogestrel 0.075 mg.

**Indicación**

Anticonceptivo con solo progestágeno. Es más adecuado para utilizarlo durante la lactancia y en mujeres que no pueden o no quieren utilizar estrógenos.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

**Dosificación**

Se debe ingerir el comprimido entero, con agua. Cuando se termine un blister se debe comenzar el blister nuevo al día siguiente, sin interrupción y sin sangrado.

**Contraindicaciones**

Trastorno tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes de Soluna®.

**SOLUNA E - 20®**

ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS

**Composición**

Cada estuche contiene un blister con 21 comprimidos que contienen:  
Desogestrel 0.150 mg y  
Etinilestradiol 0.02 mg.

**Indicación**

Este medicamento es un anticonceptivo oral combinado (AOC) que contiene 2 hormonas femeninas (etinilestradiol y desogestrel) presentes en bajas dosis. Se utiliza en anticoncepción oral.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

**Dosificación**

Un comprimido diariamente por 21 días consecutivos, aproximadamente a la misma hora, si es necesario con un poco de líquido, en el orden que muestre el blister. Cada envase siguiente se debe tomar luego de 7 días sin comprimidos.

**Contraindicaciones**

Trastornos tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas, influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes de Soluna® E-20.

**SOLUNA E®**

ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS

**Composición**

Cada estuche contiene un blister con 21 comprimidos que contienen:  
Desogestrel 0.150 mg y  
Etinilestradiol 0.03 mg.

**Indicación**

Combinación que principalmente impide la ovulación y produce cambios en el endometrio y el mucus cervical para disminuir la posibilidad de fertilización e implantación.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

**Dosificación**

Un comprimido diariamente por 21 días consecutivos, aproximadamente a la misma hora, si es necesario con un poco de líquido, en el orden que muestre el blister. Cada envase siguiente se debe tomar luego de 7 días sin comprimidos.

**Contraindicaciones**

Trastorno tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes de trastornos hepáticos graves mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. Existencia o sospecha de neoplasias malignas influenciadas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes de Soluna® E.

**VITOMIT®**

30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO

**Composición**

Cada Comprimido con Recubrimiento Entérico contiene:  
Doxilamina Succinato 10,0 mg,  
Piridoxina Clorhidrato 10,0 mg.

**Indicación**

Alivio de náuseas y vómitos en el embarazo.

PRODUCTO DISPONIBLE EN

Comprimidos recubiertos

**Dosificación**

Adultos: Si las náuseas son matutinas, tomar 2 comprimidos al acostarse. Si las náuseas se mantienen durante el día se recomienda tomar un comprimido por la mañana y otra a media tarde.

**Contraindicaciones**

Hipersensibilidad conocida a piridoxina, doxilamina o a cualquiera de los excipientes de la formulación. Hipersensibilidad a algún otro antihistaminico H1. Crisis asmáticas. Porfiria (enfermedad que afecta los glóbulos rojos de la sangre).



## ASMAVENT SF®

### INHALADOR BUCAL 200 DOSIS

#### Composición

Cada dosis-medida contiene:  
Salbutamol 100 mcg.

#### Indicación

Indicado para el tratamiento y prevención del broncoespasmo en pacientes con obstrucción reversible de la vía aérea.



Inhalador

PRODUCTO  
DISPONIBLE EN



## BROMFIN®

### FRASCO CON 100 ML JARABE

#### Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene Bromhexina Clorhidrato 8 mg.

#### Dosificación

Adultos: La dosis oral usual de Bromhexina Clorhidrato en adultos y niños mayores de 12 años es de 8 mg (5 mL; una cucharadita) cada 8 horas.

Niños: La dosis oral usual en niños entre 6-12 años es de 4 mg (2,5 mL; media cucharadita) cada 8 horas. Para niños de 2-6 años, la dosis recomendada es de 4 mg (2,5 mL; media cucharadita) cada 12 horas, o bien 0,5 mg/kg/día, dividido en dosis cada 8 horas.

#### Indicación

Indicado para el alivio de la tos productiva (con secreción o flema). Tratamiento de bronquitis crónica suave o moderada y otras bronconeumopatías crónicas obstructivas, y bronquitis aguda.

#### Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con antecedentes de Úlcera Péptica, en personas que hayan presentado alergia a Bromhexina Clorhidrato, a algún excipiente de la formulación, o alergia a Ambroxol. No se debe utilizar Bromhexina Clorhidrato para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

**B** Producto Bioequivalente



Jarabe



## BRONTEC®

### FRASCO CON 100 ML JARABE

#### Composición

Cada 100 mL de Jarabe contiene: Extracto seco de Hedera hélix 0,7 g (equivalente a 45 mg de Hederacósido C.)

#### Dosificación

Brontec debe agitarse antes de usar. Niños de 1 a 4 años: 2,5 mL 3 veces al día. Niños de 4 y más años: 5 mL 3 veces al día. Adultos: 5 mL 3 a 5 veces al día.

#### Indicación

Tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias, acompañadas de tos.

#### Contraindicaciones

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia. Niños menores de un año.



Jarabe

PRODUCTO  
DISPONIBLE EN



## BUCOGERM®

### ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS MASTICABLES

#### Composición

Cada comprimido masticable contiene: Clorhexidina Diclorhidrato 5 mg, Noscapina 10 mg.

#### Indicación

Alivio de la tos no productiva asociada a infecciones bucofaringeas leves.

#### Dosificación

La dosis usual es de 1 a 2 comprimidos masticables, 4 a 6 veces al día. Se sugiere disolver lentamente en la boca.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad de algún componente de la formulación. Embarazo y lactancia.

○ Comprimidos masticables



## MINTAMOX®

### FRASCO CON 100 ML JARABE

#### Composición

Cada 5 mL de Jarabe Infantil contiene: Ambroxol Clorhidrato 15 mg.

Cada 5 mL de jarabe Adultos contiene: Ambroxol Clorhidrato 30 mg.

#### Dosificación

Jarabe infantil: niños de 2 a 5 años: 2,5 mL 3 veces al día; niños de 6 a 12 años: 5 mL 3 veces al día.

Jarabe Adultos: adultos y mayores de 12 años: 5 mL 3 veces al día.

#### Indicación

Afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieren tratamiento secretolítico.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ambroxol clorhidrato o a alguno de los componentes de la fórmula. Primer trimestre de embarazo. Precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal o en tratamiento con anticoagulantes.



Jarabe



## NASOLVER®

FRASCO CON 100 ML JARABE

### Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene:  
Codeína Fosfato 10 mg,  
Pseudoefedrina Clorhidrato 30mg  
Clorfenamina Maleato 2 mg.

### Indicación

Alivio de la tos asociada a resfriado común, bronquitis, tos irritativa y tos del fumador.

### Dosificación

Niños mayores de 12 años y adultos la dosis usual recomendada es de 10 mL cada 4 a 6 horas (no exceder de 60 mL/día).

### Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a codeína, pseudoefedrina o clorfenamina maleato o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con hipertensión severa, anemia, cardiopatía isquémica. Embarazo y lactancia.



## RINOSTERYL®

FRASCO CON 30 ML

### Composición

Cada 100 mL de solución nasal contiene: Cloruro de Sodio 0,9 g.

### Indicación

Higiene y lavado de las fosas nasales en niños y adultos, cuando las condiciones fisiológicas lo requieren: congestión nasal, irritación nasal, ardor, obstrucción, resfriados, coriza y heridas nasales.

### Dosificación

1 o 2 aplicaciones en cada fosa nasal, según necesidad.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad al cloruro de sodio. Problemas de coagulación.



## TULOX®

FRASCO CON 100 ML JARABE

### Composición

Cada 5 mL de jarabe Adulto contiene: Oxolamina (como fosfato) 50mg.  
Cada 5 mL de jarabe infantil contiene: Oxolamina (como fosfato) 28mg.

### Indicación

Tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

### Dosificación

Adultos y niños mayores de 12 años: 5 - 10 mL de jarabe Adultos cada 4 horas.  
Niños de 2 a 11 años: 2,5 - 5 mL de jarabe Infantil cada 4 horas.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Oxolamina o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia.








**NEUROSTAB®**  
**ENVASE CON 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECOBRIMIENTO ENTÉRICO**

**Composición**  
 Cada cápsula con gránulos con recubrimiento entérico contiene 354,000 mg de Duloxetina clorhidrato, equivalente a 60 mg de Duloxetina.

**Dosificación**  
 Via oral. La dosis usual recomendada es:  
 • Para trastorno depresivo mayor, dolor neuropático periférico de origen diabético, fibromialgia y dolor crónico musculoesquelético: 60 mg una vez al día.  
 • Para trastorno de ansiedad generalizada: La dosis normal de inicio de Duloxetina es de 30 mg una vez al día, después de lo cual el Médico puede aumentarla a 60 mg una vez al día.

**Indicación**  
 Trastorno Depresivo Mayor. Trastorno de Ansiedad Generalizada. Neuropatía Periférica de origen Diabético, Fibromialgia, Dolor Musculoesquelético Crónico.

**Contraindicaciones**  
 Hipersensibilidad, enf. hepática que produzca I.H., I.R. grave, HTA no controlada. En combinación con: IMAO irreversibles no selectivos; inhibidores potentes de CYP1A2 como fluvoxamina, ciprofloxacino o enoxacino. Hipersensibilidad, enf. hepática que produzca I.H., I.R. grave, HTA no controlada. En combinación con: IMAO irreversibles no selectivos; inhibidores potentes de CYP1A2 como fluvoxamina, ciprofloxacino o enoxacino.



PRODUCTO DISPONIBLE EN




**NEZEL XR®**  
**ENVASE CON 30 CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA**

**Composición**  
 Cada cápsula con gránulos recubiertos de liberación prolongada contiene 167,100 mg de Venlafaxina clorhidrato, equivalente a 75 mg de Venlafaxina.

**Dosificación**  
 75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).

**Indicación**  
 Depresión mayor. Prevención de recurrencias de episodios depresivos mayores. Además las formas de liberación prolongada en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social y trastorno de pánico con o sin agorafobia.

**Contraindicaciones**  
 75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).



PRODUCTO DISPONIBLE EN



**NEZEL XR®**  
**ENVASE CON 30 CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA**

**Composición**  
 Cada cápsula con gránulos recubiertos de liberación prolongada contiene 334,200 mg de Venlafaxina clorhidrato, equivalente a 150 mg de Venlafaxina.

**Dosificación**  
 75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).

**Indicación**  
 Depresión mayor. Prevención de recurrencias de episodios depresivos mayores. Además las formas de liberación prolongada en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social y trastorno de pánico con o sin agorafobia.

**Contraindicaciones**  
 75 mg 1 vez/día. En trastorno de pánico 37,5 mg/día durante 7 días, entonces aumentar a 75 mg/día. Si no responden incrementar hasta máx. 225 mg/día ó 375 mg/día (depresión mayor). Los incrementos se harán a intervalos de 2 sem o más, pero no < 4 días (depresión mayor).



PRODUCTO DISPONIBLE EN



**ZONIX®**  
**ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS**

**Composición**  
 Cada comprimido recubierto contiene: Zopiclona 7.5 mg.

**Indicación**  
 Tratamiento a corto plazo del insomnio. Caracterizado por la dificultad que tiene el paciente en quedarse dormido, despertar frecuente en la noche o despertar temprano en la mañana. Cuando comienzan los disturbios al dormir, se pueden presentar síntomas de desorden físico o psiquiátrico, por lo tanto, el paciente debe ser evaluado farmacológicamente antes de iniciar el tratamiento con zopiclona.

**Dosificación**  
 En pacientes adultos la dosis es de 7,5 mg a la hora de acostarse. En pacientes geriátricos, pacientes con enfermedad de la función hepática, o en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica la dosis inicial debe ser reducida a la mitad, ya que el clearance puede ser prolongado, y por lo tanto aumentar el potencial de los efectos adversos.

**Contraindicaciones**  
 Hipersensibilidad al principio activo. La zopiclona está contraindicado en insuficiencia respiratoria grave. No se recomienda su empleo en niños menores de 15 años.



PRODUCTO DISPONIBLE EN









Cápsulas blandas

### FORTOTAL® ACTIVE+

ENVASE CON 30 CÁPSULAS BLANDAS

#### Composición

Cada cápsula blanda contiene: Vitamina A 1000 mcg, Vitamina C 61 mg, Vitamina D3 7,5 mcg, Vitamina E 50 mg, Vitamina B13 4 mg, Vitamina B2 2 mg, Vitamina B3 20 mg, Vitamina B6 33 mg, Biotina 90 mcg, Hierro 25 mg, Magnesio 76 mg, Zinc 20 mg, Selenio 60 mcg.

#### Dosificación


Consumir máximo 1 cápsula blanda al día con abundante agua.

#### Indicación

Estados carenciales de vitaminas y minerales.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad, hipercalcemia o hipercalciuria, I.R. e I.H. grave, enf. hepáticas o colestasis causada por aclaramiento biliar de minerales insuficiente, enf. de Leber, hipervitaminosis de cualquier vit. o exceso de cualquier mineral u oligoelemento incluido en la preparación, osteodistrofia renal con hiperfosfatemia, urolitiasis por fosfato amónico magnésico infectadas. En embarazo: dosis > 100 mg vit. C.



Comprimidos masticables

### MINTAVIT® C

ENVASE CON 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES 100 MG  
ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES 500 MG

#### Composición

Cada comprimido masticable contiene: Vitamina C 100 mg. Cada comprimido masticable contiene: Vitamina C 500 mg.

#### Dosificación

Niños de 2 a 12 años 100-300 mg al día.  
Adultos y niños mayores de 12 años: 500 mg a 1 gramo por día.

#### Indicación

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de vitamina C.

#### Contraindicaciones

Pacientes con úlcera gástrica, falla renal o hepática, alérgicos a cualquier componente de la formulación.









Genéricos



### CLONIXINATO DE LISINA

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

#### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Clonixinato de Lisina 125 mg.

#### Indicación

Tratamiento del dolor leve a moderado. Dolor como síntoma principal o secundario, de diversa etiología, intensidad y localización. Alta eficacia en dolor de tipo: odontológico, traumatológico, reumatológico, ginecológico, urogenital, oncológico, otorinolaringológico, neurológico, prequirúrgico y posquirúrgico.

#### Dosificación

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos recubiertos 3 a 4 veces al día. Máximo 6 comprimidos al día.

#### Contraindicaciones

Alergia a Clonixinato de Lisina u otro analgésico no esterooidal o a cualquier componente de la formulación. No debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario. Alcohol durante el tratamiento. Embarazo y lactancia.



### KETOPROFENO

ENVASE CON 20 CÁPSULAS

#### Composición

Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 50 mg.

#### Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos y posquirúrgicos.

#### Dosificación

Una cápsula de 50 mg, 3 o 4 veces al día.

#### Contraindicaciones

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Embarazo, lactancia, alergia a Ketoprofeno, otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal o a algún componente de la formulación. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, daño renal o hepático severo.



### KETOPROFENO T.U.

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONGADA

#### Composición

Cada comprimido con recubrimiento entérico contiene: Ketoprofeno 200 mg.

#### Indicación

Alivio de dolores leves a moderados de distinta etiología: traumatológicos, ginecológicos, reumatológicos y posquirúrgicos.

#### Dosificación

1 comprimido al día.

#### Contraindicaciones

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Embarazo, lactancia, alergia a Ketoprofeno, otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal o a algún componente de la formulación. Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, daño renal o hepático severo.



### KETOROLACO TROMETAMOL

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

#### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Ketorolaco Trometamol 10 mg.

#### Indicación

Alivio durante períodos cortos del dolor moderado a severo post operatorio, incluidos los dolores abdominales, ginecológicos, oftalmológicos, ortopédicos o cirugía urológica. También se utiliza en el alivio de cólicos renales agudos, dolor asociado con trauma y dolor visceral asociado con cáncer.

#### Dosificación

Adultos: 10 mg 3 o 4 veces al día.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Ketorolaco Trometamol u otros AINEs. Úlcera péptica activa. Embarazo y lactancia. Falla renal. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario.



### MELOXICAM

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS BE.

#### Composición

Cada comprimido contiene: Meloxicam 7,5 mg envase con 10 comprimidos.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 7.5 ó 15 mg 1 vez al día.

#### Indicación

Tratamiento sintomático (dolor e inflamación) de patologías osteoarticulares, especialmente de artritis reumatoidea, osteoartritis dolorosa (artritis, enfermedad articular degenerativa).

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al principio activo. Tratamiento con aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos. Úlcera péptica activa. Insuficiencia hepática o renal severa. Embarazo o durante la lactancia. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario. Uso en embarazo y lactancia: No se recomienda su uso durante el embarazo o la lactancia.



PRODUCTO DISPONIBLE EN



### MELOXICAM

ENVASE CON 15 COMPRIMIDOS BE.

#### Composición

Cada comprimido contiene: Meloxicam 15 mg envase con 15 comprimidos.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 7.5 ó 15 mg 1 vez al día.

#### Indicación

Tratamiento sintomático (dolor e inflamación) de patologías osteoarticulares, especialmente de artritis reumatoidea, osteoartritis dolorosa (artritis, enfermedad articular degenerativa).

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al principio activo. Tratamiento con aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos. Úlcera péptica activa. Insuficiencia hepática o renal severa. Embarazo o durante la lactancia. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario. Uso en embarazo y lactancia: No se recomienda su uso durante el embarazo o la lactancia.



PRODUCTO DISPONIBLE EN







## METAMIZOL

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE.

### Composición

Cada comprimido contiene: Metamizol Sódico Monohidrato 300 mg

### Dosificación

Dosis usual recomendada es: Adultos: 1 a 2 comprimidos 2 a 4 veces/día. Niños: 1/2 a 1 comprimido 3 a 4 veces/día.

### Indicación

Cefaleas, neuralgias, reumatismo, lumbago, dolores postoperatorios. Tratamiento sintomático en gripe, resfriados, neumon

### Contraindicaciones

Pacientes que sean sensibles (alérgicos) a las pirazolonas (Metamizol Sódico) o a cualquier componente de la fórmula y que sufran de enfermedades metabólicas (porfiria hepática o déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) no deben consumir este medicamento. No debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos



## NAPROXENO

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE.

### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Naproxeno Sódico 550 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 550 mg 2 veces al día.

### Indicación

Alivio del dolor leve a moderado, tratamiento sintomático de la inflamación leve a moderadamente severa, aguda o crónica de tejidos musculares esqueléticos y blando. Dismenorrea.

### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Naproxeno Sódico u otro analgésico antiinflamatorio no esterooidal. No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## TRAMADOL

ENVASE CON 10 CÁPSULAS BE.

### Composición

Cada cápsula contiene: Tramadol Clorhidrato 50 mg.

### Dosificación

Dosis inicial recomendada en adultos es de 1 a 2 cápsulas, seguida de 1 a 2 cápsulas cada 6-8 horas, sin sobrepasar la dosis diaria de 400mg (8 cápsulas). La dosis debe ajustarse según el grado del dolor y la respuesta individual de cada paciente.

### Indicación

Alivio del dolor moderado a severo. De igual forma se

utiliza para aliviar el dolor postoperatorio de pacientes que han sufrido diversas cirugías.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga o a alguno de los componentes de la formulación. Tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa o durante las 2 primeras semanas de su retirada.

**B** Producto Bioequivalente  Cápsulas

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Producto Bioequivalente  Jarabe

PRODUCTO DISPONIBLE EN



Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## CLORFENAMINA MALEATO

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene:  
Clorfenamina Maleato 4 mg.

### Indicación

Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional o perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgicas, reacciones alérgicas cutáneas no complicadas o leves como prurito, o por transfusión de sangre, rinorrea, eczema alérgico, dermatitis de contacto y reacciones anafilácticas junto a epinefrina, luego que las manifestaciones agudas han sido controladas.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 4 mg (1 comprimido) cada 4 a 6 horas, no excediéndose de 24 mg (6 comprimidos) en 24 horas.

### Contraindicaciones

Alergia a Clorfenamina Maleato o a cualquier componente de la formulación. Embarazo y lactancia. Pacientes que reciben terapia con IMAO.

## LORATADINA

FRASCO CON 90/60 ML JARABE BE

### Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene:  
Loratadina 5 mg.

### Indicación

Tratamiento de la congestión nasal, estornudos y rinorrea y en alergias de diversos tipos.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 10 mg (10 mL de Jarabe) al día.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. Embarazo.

## PREDNISONA

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE.

### Composición

Cada comprimido contiene:  
Prednisona 5 mg.

### Indicación

Tratamiento de variadas enfermedades endocrinas, osteomusculares, del colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratorias, hematológicas, neoplásicas y de otros tipos con respuesta conocida al tratamiento con glucocorticoides.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 5 a 60 mg al día, dependiendo de la condición de cada paciente y de la patología que desea tratar.

### Contraindicaciones

Embarazo, mujeres que planean embarazarse y lactancia. Alergia a Prednisona o a cualquier componente de la formulación. Úlcera gastroduodenal activa. Osteoporosis severa. Ciertas alteraciones psiquiátricas.





### ACICLOVIR

ENVASE CON 35 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Aciclovir 400 mg.

#### Dosificación

Dosis oral de 200 mg cada 4 horas.

#### Indicación

Infecciones por virus herpes simple tipo I y II. Virus varicela zoster.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad al fármaco. Evitar uso en embarazo y en lactancia (sólo estricta necesidad).

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### ACICLOVIR 5% CREMA

POMO CON 5G DE CREMA

#### Composición

Cada 100 g de Crema dérmica contiene: Aciclovir 5 g.

#### Dosificación

Aplicar 4 - 6 veces al día sobre el área afectada.

#### Indicación

Herpes labial y herpes genital inicial y recurrente. Como coadyuvante del Aciclovir oral en el tratamiento de estas infecciones.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No aplicar en los ojos. Embarazadas.



Crema dérmica

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### AMOXICILINA 500mg

ENVASE CON 21 CÁPSULAS BE

#### Composición

Cada cápsula contiene: Amoxicilina (como Trihidrato) 500 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es: en adultos es de 500 a 750 mg cada 8 horas y en niños sobre 3 meses, la dosis se basa en el peso corporal del paciente y es de 20 a 40 mg por kg de peso al día, repartido en 3 dosis. En niños menores de 3 meses, la dosis sólo debe ser indicada por el medico.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, piel y tejidos blandos, otitis media y tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

#### Contraindicaciones

Alergia a Amoxicilina u a otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación. Pacientes con mononucleosis.

**B** Producto Bioequivalente  Cápsulas

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### AMOXICILINA 750mg

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Amoxicilina (como Trihidrato) 750 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es: en adultos es de 500 a 750 mg cada 8 horas y en niños sobre 3 meses, la dosis se basa en el peso corporal del paciente y es de 20 a 40 mg por kg de peso al día, repartido en 3 dosis. En niños menores de 3 meses, la dosis sólo debe ser indicada por el medico.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, piel y tejidos blandos, otitis media y tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

#### Contraindicaciones

Alergia a Amoxicilina u a otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación. Pacientes con mononucleosis.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN







**AZITROMICINA 500mg**  
ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene: Azitromicina (como Dihidrato) 500 mg.

**Dosificación**  
Dosis usual recomendada es: Adultos: 1 comprimido al día durante 3 días. Para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual la dosis usual es de 1 gramo administrado como dosis única. La dosis indicada por el Médico, debe tomarse 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, ya que al administrarse con alimentos disminuye su biodisponibilidad.

**Indicación**  
Infecciones causadas por organismos susceptibles. Infecciones del tracto respiratorio inferior y superior (bronquitis, neumonía).

**Contraindicaciones**  
Pacientes con alergia a Azitromicina o cualquier antibiótico macrólido o algún otro componente de la formulación.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos



PRODUCTO DISPONIBLE EN



**AZITROMICINA 500mg**  
ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene: Azitromicina (como Dihidrato) 500 mg.

**Dosificación**  
Dosis usual recomendada es: Adultos: 1 comprimido al día durante 3 días. Para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual la dosis usual es de 1 gramo administrado como dosis única. La dosis indicada por el Médico, debe tomarse 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, ya que al administrarse con alimentos disminuye su biodisponibilidad.

**Indicación**  
Infecciones causadas por organismos susceptibles. Infecciones del tracto respiratorio inferior y superior (bronquitis, neumonía).

**Contraindicaciones**  
Pacientes con alergia a Azitromicina o cualquier antibiótico macrólido o algún otro componente de la formulación.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos



PRODUCTO DISPONIBLE EN



**BACITRACINA CON NEOMICINA UNGÜENTO 15g**  
POMO CON 15G DE UNGÜENTO

**Composición**  
Cada gramo de ungüento contiene: Bacitracina 500 U.I. Neomicina (como Sulfato) 5,0 mg.

**Dosificación**  
Dosis usual recomendada en adultos es la aplicación del ungüento sobre el área afectada 2 a 3 veces al día.

**Indicación**  
Infecciones bacterianas de la piel cuando hay heridas menores.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad a Neomicina, Bacitracina o algún otro componente de la fórmula. • Infecciones mamarias durante la lactancia.



Ungüento




**CEFRADINA 500mg**  
ENVASE CON 8 CÁPSULAS

**Composición**  
Cada comprimido contiene: Cefradina 500 mg.

**Dosificación**  
Adultos: 250-500 mg/dosis. Oral cada 6 horas.

**Contraindicaciones**  
Hipersensibilidad a las cefalosporinas.

**Indicación**  
Infecciones urinarias. Infecciones respiratorias. Infecciones de piel y tejidos blandos. Osteomielitis. Profilaxis quirúrgica; gastrointestinal; ortopédica; cardiovascular.



Cápsulas



**CIPROFLOXACINO 500mg**  
ENVASES CON 6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

**Composición**  
Cada comprimido recubierto contiene: Ciprofloxacino (como clorhidrato Monohidrato) 500 mg.

**Dosificación**  
Dosis usual recomendada es: en adultos es de 250 a 750 mg 2 veces al día.

producidas por bacterias gram positiva y gram negativa susceptibles.

**Contraindicaciones**  
Embarazo y lactancia. Hipersensibilidad a Ciprofloxacino u otras quinolonas o a cualquier componente de la formulación. Menores de 18 años.

**Indicación**  
Tratamiento en adultos de infecciones del tracto respiratorio inferior, tracto urinario, prostatitis crónica, piel y su estructura y de infecciones de hueso y articulaciones

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos



PRODUCTO DISPONIBLE EN



Jarabe

### COTRIMOXAZOL 200/40mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE

#### Composición

Cada 5mL de jarabe contiene: Sulfametoxazol 200 mg; Trimetoprima 40 mg.

#### Dosificación

Dosis usuales recomendadas son: Adultos: Infecciones del tracto urinario: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 10-40 días. Tratamiento de crisis aguda de bronquitis crónica: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol cada 12 horas por 14 días. Shigelosis: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 5 días. Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Niños: Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Otitis media e infecciones urinarias:

8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un periodo de 10 días. Shigelosis: 8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un periodo de 5 días.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la asociación demostrados por antibiograma.

#### Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. Alergia a sulfametoxazol, otra sulfonamida, trimetoprima, o a cualquier componente de la formulación o diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) o clorpropamida o tolbutamida. Pacientes con enfermedad hepática o renal severa, con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.



Comprimidos

### COTRIMOXAZOL

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

#### Composición

Cada comprimido contiene: Sulfametoxazol 400 mg; Trimetoprima 80 mg.

#### Dosificación

Dosis usuales recomendadas son: Adultos: Infecciones del tracto urinario: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 10-14 días. Tratamiento de crisis aguda de bronquitis crónica: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol cada 12 horas por 14 días. Shigelosis: 160 mg de trimetoprima/800 mg de sulfametoxazol por 5 días. Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Niños: Neumonía por pneumocystis carinni: 20 mg/kg de trimetoprima/100mg/kg de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días. Otitis media e infecciones urinarias:

8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un periodo de 10 días. Shigelosis: 8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un periodo de 5 días.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la asociación demostrados por antibiograma.

#### Contraindicaciones

Embarazo y lactancia. Alergia a sulfametoxazol, otra sulfonamida, trimetoprima, o a cualquier componente de la formulación o diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) o clorpropamida o tolbutamida. Pacientes con enfermedad hepática o renal severa, con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.



Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ECUADOR

### ERITROMICINA 500mg

ENVASE CON 8 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

#### Composición

cada comprimido recubierto contiene: Eritromicina 500 mg.

#### Dosificación

Adultos: 250 a 500 mg cada 6 a 8 horas. Niños: 50 mg/kg/día fraccionados cada 6 a 8 horas.

#### Indicación

Infecciones provocadas por gérmenes sensibles en vía aérea superior e inferior. Eliminación del estado portador de bacilos diftéricos, agudo y crónico.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la eritromicina.



Jarabe

### FLUCLOXACILINA 250mg/5mL

FRASCO CON 60 ML JARABE

#### Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene: Flucloxacilina 250 mg.

#### Dosificación

Niños: 50 mg/kg/día. Adultos: 500-1000 mg/dosis. Oral cada 6-8 horas.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, piel y sus estructuras, oídos, huesos y articulaciones, causadas por organismos susceptibles.

#### Contraindicaciones

Alergia a Flucloxacilina, otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación.



Cápsulas

### FLUCLOXACILINA 500mg

ENVASE CON 6 CÁPSULAS

#### Composición

Cada cápsula contiene: Flucloxacilina (como Sal Sódica Monohidrato) 500 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 500 mg cada 6 horas.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, piel y sus estructuras, oídos, huesos y articulaciones, causadas por organismos susceptibles.

#### Contraindicaciones

Alergia a Flucloxacilina, otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación.



### FLUCLOXACILINA 500mg

ENVASE CON 12 CÁPSULAS

#### Composición

Cada cápsula contiene: Flucloxacilina (como Sal Sódica Monohidrato) 500 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 500 mg cada 6 horas.

#### Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, piel y sus estructuras, oídos, huesos y articulaciones, causadas por organismos susceptibles.

#### Contraindicaciones

Alergia a Flucloxacilina, otra Penicilina o Cefalosporina, o alguno de los componentes de la formulación.



Cápsulas



### GENTAMICINA 0,1% CREMA 15g

POMO CON 15 G CREMA

#### Composición

Cada 1 g de crema contiene: Gentamicina 1 mg.

#### Dosificación

Aplicar tópicamente 3-4 veces al día.

#### Indicación

Infecciones a la piel por gérmenes sensibles. Dermatitis infecciosa eczematosa, psoriasis pustular, dermatitis seborreica

infectada, dermatitis de contacto infectada, quemadura superficial infectada, eritema, excoiación infectada, foliculitis superficial, furunculosis, picaduras de insectos infectadas, heridas quirúrgicas menores.

#### Contraindicaciones

Si ha presentado síntomas de alergia a gentamicina, amikacina, tobramicina, kanamicina. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.



Crema



### KETOCONAZOL 200mg

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS

#### Composición

Cada comprimido contiene: Ketoconazol 200 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 200 mg al día.

#### Indicación

Tratamiento de blastomicosis, coccidioomicosis, histoplasmosis, cromomicosis, y paracoccidioomicosis, solo en pacientes en los que no pueden usarse otras alternativas de tratamiento.

#### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Hipersensibilidad a Ketoconazol o a algún componente de la formulación. Ketoconazol en comprimidos está contraindicado en pacientes con disfunción hepática aguda o crónica.



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### LEVOFLOXACINO 500mg

ENVASE CON 7 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Levofloxacin (como hemihidrato) 500 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es 500 mg una vez al día, por 7 a 10 días.

#### Indicación

Tratamiento de las siguientes infecciones bacterianas sensibles al fármaco: Sinusitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica neumocócica adquirida en la comunidad, infecciones del tracto urinario

(incluyendo pielonefritis e infecciones complicadas), infecciones de piel y tejido blandos.

#### Contraindicaciones

No debe usarse en: pacientes con hipersensibilidad a Levofloxacin, a otro medicamento de la misma clase o a cualquiera de los excipientes de la fórmula.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### MEBENDAZOL 100mg

ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS MASTICABLES.

#### Composición

Cada comprimido masticable contiene: Mebendazol 100 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en oxiuriasis es 100 mg como dosis única, repitiéndola en 2 ó 3 semanas. En trichuriasis y ascariasis es 100 mg 2 veces al día por 3 días, puede repetirse 2 ó 3 semanas después si es necesario.

helmínticas mixtas.

#### Contraindicaciones

Pacientes con hipersensibilidad a Mebendazol o a cualquier componente de la formulación. Embarazo y lactancia.




Comprimidos masticables

#### Indicación

Tratamiento de elección en oxiuriasis, trichuriasis y ascariasis. Tratamiento de infecciones





**B** Producto Bioequivalente  Cápsulas

### NITROFURANTOINA MACROC 100mg

ENVASE CON 10 CÁPSULAS BE CON MACROCRISTALES.

#### Composición

Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100mg (macrocrisiales).

#### Dosificación

Administrar con las comidas. Adultos: 100 mg 3 veces/día. La terapia debe prolongarse como mínimo 1 semana y por lo menos 3 días después que se ha logrado la ausencia de bacterias en la orina.

#### Indicación

Infecciones del tracto urinario causadas por bacterias sensibles a la nitrofurantoina.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Nitrofuranos. Embarazo y lactancia. Niños menores de un mes.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### TERBINAFINA 250mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Terbinafina 250 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es 250 mg (un comprimido) una vez al día.

#### Indicación

Terbinafina es un antimicótico. Se usa por vía oral en infecciones de la piel, del cuero cabelludo y de las uñas provocadas por hongos (dermatofitos) tales como: tiña del cuerpo, tiña del pie (pie de atleta), tiña de la cabeza (del cuero cabelludo), tiña cruris (ingle).

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la Terbinafina o cualquiera de sus componentes. Alteraciones graves al hígado o riñón.





### ACETAZOLAMIDA 250mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS

#### Composición

Cada comprimido contiene: Acetazolamida 250 mg.

#### Dosificación

Para diuresis por falla cardíaca se usa en dosis de 250 a 375 mg 1 vez al día en la mañana. Para edema producido por medicamentos la dosis recomendada es 250 a 375 mg 1 vez al día durante 1 ó 2 días alternando con un día de descanso. Tratamiento de glaucoma un rango entre 250 a 500 mg, repartidos en 1 a 4 tomas diarias. Anticonvulsivante un rango entre 8 a 30 mg/kg de peso repartidas en 1 a 4 tomas diarias. Tratamiento del mal de montaña una dosis de 250 mg cada 6 a 12 horas. Para el mal de montaña la dosis recomendada es 500 a 1000 mg diarios en dosis separadas, usando comprimidos o cápsulas

de liberación prolongada, según sea adecuado; es preferible iniciar la dosificación 24 a 48 horas antes del ascenso y continuarlo durante 48 horas posterior al ascenso o más según sea necesario para controlar los malestares..

#### Indicación

Glaucoma de ángulo abierto, glaucoma secundario. Manejo de edemas secundarios a enfermedad cardíaca, congestiva o terapias con fármacos. Epilepsias tipo ausencias (Petit-Mal), prevención del mal de alturas.

#### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Acetazolamida, sulfonamidas, diuréticos tiazídicos o alguno de los componentes de la formulación.

Comprimidos



### AMIODARONA HCL 200mg

ENVASE CLÍNICO CON 1005/20 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Amiodarona Clorhidrato 200 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es: 600 a 1200 mg al día por un periodo de 1 a 2 semanas. La dosis de mantención suele ser los 400 mg.

#### Contraindicaciones

Pacientes con shock cardiogénico, con disfunción nódulo-sinusal severa, con bloqueo auriculoventricular, fibrosis pulmonar, pacientes con episodios de bradicardia, a excepción si se usa en forma concomitante un marcapaso artificial. Hipersensibilidad a Amiodarona clorhidrato o cualquier componente de la formulación. Embarazo y lactancia.

#### Indicación

Tratamiento de arritmias ventriculares y fibrilación ventricular recurrente que ha sido refractaria a las terapias convencionales.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### AMLODIPINO 10mg

ENVASE CON 30/60 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Amlodipino (como Besilato) 5 mg en envase con 30 comprimidos. Amlodipino (como Besilato) 10 mg en envase con 30 y 60 comprimidos.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 2,5 - 10 mg una vez al día. En caso de olvido de una dosis, tómela lo antes posible. Sin embargo, si ya está muy cerca de la siguiente dosis sátese la dosis olvidada. Nunca duplique la dosis.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### ATENOLOL 100mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Atenolol 100 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es: Hipertensión arterial: 25 - 50 mg una vez al día. Si es necesario se puede aumentar la dosis a 100mg al día.

#### Indicación

Tratamiento de la hipertensión y angina pectoris.

#### Contraindicaciones

Pacientes con bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular mayor de primer grado o shock cardiogénico. Embarazo y lactancia. Alergia a Atenolol u otro β-bloqueador.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

## CAPTOPRIL 25mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Captopril 25 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es: Hipertensión arterial: 50-100 mg una dos veces al día, aunque en casos severos de hipertensión a veces es adecuado comenzar el tratamiento con dosis de 150 mg diarios, los que luego se reducen al rango normal de tratamiento. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva: se comienza con dosis de 25 mg al día. Y luego según evolución

se va aumentando la dosis paulatinamente con monitoreo de la presión arterial.

### Indicación

Indicado para el control de la hipertensión arterial y para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

### Contraindicaciones

Síntomas de alergia a Captopril, benazepril, cilazapril, espirapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril y trandolapril. Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## ISOSORBIDA DINITRATO 10mg

ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Isosorbida Dinitrato 10mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en angina pectoris es de 5 a 40 mg 3 ó 4 veces al día. En falla cardíaca pueden administrarse dosis por vía oral que varían entre 20-40 mg cada 4 horas.

### Indicación

Profilaxis y tratamiento de angina pectoris y de insuficiencia cardíaca congestiva.

### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Hipersensibilidad a Isosorbida Dinitrato, nitroglicerina o a algún componente de la formulación. Pacientes con infarto, presión sanguínea marcadamente baja, shock, anemia severa.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

## ENALAPRIL MALEATO 5mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Enalapril Maleato 5 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es al inicio del tratamiento 2,5 a 5 mg una vez al día, según prescripción médica, la dosis usual esta en el rango de 10 - 40 mg una vez al día o repartida en dos dosis diaria. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca la dosis inicial es 2,5 mg dos veces al día, la dosis usual oscila en el rango de los 2,5 - 20 mg dos veces al día. La dosis máxima diaria es de 40 mg en ambos casos.

### Indicación

Tratamiento de la hipertensión esencial cuando los métodos no farmacológicos han fallado o han sido insuficientes. En combinación con otras drogas en falla cardíaca congestiva.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Enalapril Maleato, otro inhibidor de la enzima convertidora de Angiotensina (ACE) o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con antecedentes de angioedema relacionado a inhibidores de la ACE. Embarazo y lactancia.





**B** Producto Bioequivalente Cápsulas

PRODUCTO DISPONIBLE EN



ECUADOR

## TETRACICLINA HCL 500mg

ENVASE CON 8 CÁPSULAS BE

### Composición

Cada cápsula contiene:  
Tetraciclina Clorhidrato 500 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es :  
Adultos: 1 a 2 g cada 24 horas en dosis divididas cada 6 o 12 horas dependiendo de la severidad del cuadro. Niños mayores de 8 años: 25-50 mg/kg divididos en 2 o 4 tomas dependiendo de cada caso.

### Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, piel y tejidos blandos e infecciones del tracto respiratorio causadas por organismos susceptibles.

### Contraindicaciones

Alergia a Tetraciclina Clorhidrato, otra Tetraciclina o alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia. Niños menores de 8 años, ya que este medicamento puede causar decoloración permanente de los dientes en niños.





**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

## LOPERAMIDA HCL 2mg

ENVASE CON 6 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Loperamida Clorhidrato 2 mg.

### Dosificación

Adultos: diarrea aguda crónica, 4mg inicialmente y luego 2mg después de cada evacuación. Dosis máxima recomendada al día 16mg.

### Indicación

Este medicamento es utilizado en el tratamiento sintomático de diarreas agudas no específicas.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No usar si junto a la diarrea hay fiebre o presencia de sangre o mucus en las heces. Si la diarrea es por uso de antibióticos o por disentería.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

## TRIMEBUTINO MALEATO 100mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE.

### Composición

Cada comprimido contiene: Trimebutino Maleato 100 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es: Inicio: 2 comprimidos 3 veces al día antes de las comidas, durante 10 días. Mantenimiento: 1 comprimido 3 veces al día, antes de las comidas.

### Indicación

Indicado en Síndrome de Intestino Irritable (colopatías funcionales, colon irritable, colon inestable, colon espástico) y sus manifestaciones: espasmos intestinales, disfunción cólica, crisis alternante de diarrea y estreñimiento, meteorismo, dolor y distensión abdominal, constipación, secuelas de gastrectomía, dispepsias.

### Contraindicaciones

En pacientes con alergia a Trimebutino Maleato u otro componente de la formulación. Embarazo o lactancia, salvo indicación médica. Pacientes con miastenia gravis.



Jarabe

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## LACTULOSA 65%

FRASCO CON 200 ML SOLUCIÓN ORAL 65%

### Composición

Cada 100 mL contiene: Lactulosa al 65% 128,14 g (equivalente a 65 g de lactulosa).

### Dosificación

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: Constipación crónica: 15 a 30mL al día. Se requieren de 24 a 48 horas para obtener un adecuado movimiento intestinal. Encefalopatía portal: inicialmente, 30 a 45mL 3 o 4 veces al día. Luego la dosis debe ser ajustada según los requerimientos de cada paciente hasta obtener 2 a 3 deposiciones con heces blandas al día.

### Indicación

Prevención y tratamiento de la encefalopatía portal sistémica y tratamiento sintomático del estreñimiento crónico.

### Contraindicaciones

Pacientes con diabetes mellitus o que requieran baja dieta de galactosa, sangramiento rectal no diagnosticado, obstrucción intestinal, falla cardíaca congestiva, hipertensión, apendicitis o síntomas de apendicitis, hipersensibilidad. Pacientes con infarto, presión sanguínea marcadamente baja, shock, anemia severa.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## METOCLOPRAMIDA 10mg

ENVASE CON 24 COMPRIMIDOS BE.

### Composición

Cada comprimido contiene: Metoclopramida 10 mg.

### Dosificación

10-15 mg hasta 4 veces al día 30 minutos antes de las comidas y antes de acostarse.

### Indicación

Tratamiento sintomático de la pirosis pos-prandial y del vaciado gástrico retardado en adultos con reflujo gastroesofágico. Tratamiento de gastroparesia diabética y en la profilaxis de náuseas y vómitos inducida por la quimioterapia y pos-operatorio..

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la metoclopramida o alguno de sus excipientes. Lactancia, menores de 1 año, pacientes con epilepsia. Uso en conjunto con Levodopa y otros fármacos que produzcan reacciones extrapiramidales como fenotiazinas y butirofenonas.



### ALOPURINOL 100/300 mg

ENVASES CON 20 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene:  
Alopurinol 100/300 mg.

#### Dosificación

Pacientes con hiperuricemia o gota leve: 200 a 300 mg/día. Para pacientes con hiperuricemia o gota moderada a severa: 400 a 600 mg/día.

#### Indicación

Gota primaria y secundaria; hiperuricemias asociadas a discrasias sanguíneas; hiperuricemias en nefropatías primarias y secundarias.

#### Contraindicaciones

No usar durante la lactancia. Administrar con precaución en terapia de anticoagulantes o hipoglicemiantes orales.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### GLIBENCLÁMIDA 5 mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene:  
Glibenclámidia 5 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es al inicio de la terapia 2.5 a 5 mg. Al día junto con el desayuno o la primera comida del día, se recomienda entonces aumentarla dosis en intervalos de 2.5 mg. A intervalos semanales dependiendo de la respuesta del paciente, la dosis máxima recomendada es de 20 mg al día.

#### Indicación

Diabetes Mellitus del adulto, que no puede controlarse solo con dieta.

#### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Acidosis, cetoacidosis, quemaduras severas, coma diabético, infección severa. Alergia a Glibenclámidia, otras sulfonilureas, sulfas o diuréticos tiazídicos. Diabetes juvenil o insulino dependiente.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### GEMFIBROZILO 300 mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene:  
Gemfibrozilo 300 mg.

#### Dosificación

600 a 1200 mg/día media hora antes de las comidas; 900 mg en la noche antes de la comida.

#### Indicación

Regulador de lípidos séricos y todas las fracciones de lipoproteínas, indicado en hiperlipidemias asociadas a diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, xantomatosis asociada a hiperlipidemia.

Gemfibrozilo reduce los elevados niveles de colesterol total, triglicéridos, VLDL y LDL y aumenta los niveles HDL, el factor protector contra el desarrollo de aterosclerosis coronaria.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No administrar a pacientes con insuficiencia renal o hepática severa.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos



### AC MEFENÁMICO 500 mg

ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Ácido Mefenámico 500 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada es: 500 mg seguidos de 250 mg cada 6 horas, por un periodo de 2 a 3 días.

#### Indicación

Dolor leve a moderado de variada etiología. Alivio sintomático de la dismenorrea primaria y en el dolor post-inserción de DIU.

#### Contraindicaciones

No usar en: Casos de hipersensibilidad a la droga o que han sufrido reacciones de hipersensibilidad a aspirina u otros agentes antiinflamatorios no esteroideos. Pacientes con úlcera activa o con inflamación crónica del tracto gastrointestinal alto o bajo. En embarazo y lactancia. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by pass coronario.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos



### GEMFIBROZILO 600 mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE Y ENVASE CLÍNICO CON 500 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene:  
Gemfibrozilo 600 mg.

#### Dosificación

600 a 1200 mg/día media hora antes de las comidas; 900 mg en la noche antes de la comida.

#### Indicación

Regulador de lípidos séricos y todas las fracciones de lipoproteínas, indicado en hiperlipidemias asociadas a diabetes, hipotiroidismo,

síndrome nefrótico, xantomatosis asociada a hiperlipidemia. Gemfibrozilo reduce los elevados niveles de colesterol total, triglicéridos, VLDL y LDL y aumenta los niveles HDL, el factor protector contra el desarrollo de aterosclerosis coronaria.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga. No administrar a pacientes con insuficiencia renal o hepática severa.

**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN







**B** Producto Bioequivalente  Comprimitos recubiertos

## LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL 150/30

ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

### Composición

Cada estuche contiene 21 comprimidos activos de color blanco y 7 comprimidos placebo inactivos de color amarillo. Cada comprimido recubierto activo de color blanco contiene Levonorgestrel (Micronizado) 0,150 mg y Etinilestradiol (Micronizado) 0,030 mg.

### Dosificación

Tomar el comprimido recubierto sin masticar, con algo de líquido y siempre a la misma hora. El tratamiento se inicia el 1º día de su ciclo menstrual (1º día de sangrado). Comience con los comprimidos de color blanco (en total 21). Luego de la toma del último comprimido blanco, se inicia con los comprimidos

de color amarillo (en total 7) una vez concluidos los comprimidos de color amarillo debe iniciar la administración de un nuevo envase (haya o no experimentado menstruación).

### Indicación

Anticonceptivo oral.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad al levonorgestrel, en pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama, sangrado vaginal de origen desconocido, tumores hepáticos, enfermedades tromboticas, migraña, en embarazadas, durante la lactancia, pacientes con antecedentes de embarazo ectópico.





Aerocámara

## AEROCÁMARA UNIVERSAL

AEROCAMARA UNIVERSAL NIÑOS/ADULTOS

### Composición

1 cámara inhalatoria.

### Dosificación

La dosis a usar y el tiempo de tratamiento debe ser indicada por su Médico.

### Indicación

Dispositivo médico indicado para mejorar la eficiencia del uso de inhaladores en aerosol. Observaciones: Si tiene indicado más de un puf o disparo esperar 1 a 2 minutos entre uno y otro.

### Contraindicaciones

Todos los espaciadores plásticos acumulan electricidad estática, ésta atrae partículas del fármaco (Aerosol) hacia las paredes del espaciador, disminuyendo la efectividad del medicamento. Este problema se soluciona enjuagando la aerocámara universal con agua jabonosa una vez por semana, luego dejar secar. Es normal que las aerocámaras con el uso se tornen levemente opacas.



Producto Bioequivalente



Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



COLOMBIA

## CEFADROXILO 500mg

ENVASE CON 8 CÁPSULAS BE Y ENVASE CLÍNICO CON 500 CÁPSULAS BE

### Composición

Cada cápsula contiene: Cefadroxilo (como Monohidrato) 500 mg.

### Dosificación

Infecciones del Tracto Urinario: Para infecciones del tracto urinario, inferior no complicadas (es decir, cistitis), la dosis usual es de 1 ó 2 g por día en una dosis única o dividida en dos dosis iguales. Infecciones de la piel y estructura de la piel, la dosis usual es de 1 ó 2 g por día en una dosis única o dividida en dos dosis iguales. Tratamiento para la faringitis y amigdalitis causada por estreptococos beta hemolíticos del grupo A-1 g por día en una dosis única o en dos dosis iguales por al

menos 10 días. Infecciones de Tracto Respiratorio Superior e Inferior: Para infecciones leves, la dosis usual es de 1 g por día dividida en dos dosis iguales. Para infecciones moderadas a severas, la dosificación recomendada es de 1 a 2 g diarios dividida en dos dosis iguales.

### Indicación

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y su estructura y del tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

### Contraindicaciones

Alergia a Cefadroxilo, otra Cefalosporina o Penicilina, o alguno de los componentes de la formulación.



Comprimidos

## NOSCAPINA 20mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS.

### Composición

Cada comprimido contiene: Noscapina 20 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es: Adultos y niños mayores de 12 años: Ingerir 1 a 2 comprimidos cada 6 a 8 horas (3 a 4 veces al día).

### Indicación

Alivio de tos seca (sin flema) que aparece con el resfío.

### Contraindicaciones

Embarazo o lactancia, tampoco en mujeres que planeen o que estén en riesgo de embarazarse. Tos asmática o insuficiencia respiratoria (que se caracteriza por cansancio extremo o inusual). Alergia a Noscapina.



Producto Bioequivalente



Jarabe

## NOSCAPINA 5mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE BE

### Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene: Noscapina 5mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es para adultos: 15 a 20 mg cada 4 horas; y en niños: 5 mg cada 4 horas.

### Indicación

Alivio sintomático de tos no productiva debido a irritaciones leves de garganta y bronquios que aparecen con el resfío y la inhalación de irritantes.

### Contraindicaciones

No usar en alergia a noscapina o a cualquier excipiente de la formulación, si padece de tos asmática o insuficiencia respiratoria (caracterizada por cansancio extremo o inusual), enfermedad hepática.



Producto Bioequivalente



Jarabe

## OXOLAMINA 28mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE BE

### Composición

Cada 5 mL de jarabe infantil contiene: Oxolamina (como fosfato) 28mg.

### Dosificación

Niños de 2 a 11 años: 2,5 - 5 mL de jarabe Infantil cada 4 horas.

### Indicación

Tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Oxolamina o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia.





### OXOLAMINA 50mg/5mL

FRASCO CON 100 ML JARABE BE

#### Composición

Cada 5 mL de jarabe Adulto contiene: Oxolamina (como fosfato) 50mg.

#### Dosificación


Adultos y niños mayores de 12 años: 5 - 10 mL de jarabe Adultos cada 4 horas.

#### Indicación

Tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a Oxolamina o a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo y lactancia.



### SALBUTAMOL 2mg/5ml

FRASCO CON 100 ML JARABE BE

#### Composición

Cada 5 mL de jarabe contiene: Salbutamol 2 mg.

#### Dosificación


Dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 14 años es de 5 ó 10 mL 3 ó 4 veces al día. Para niños de 6 a 13 años la dosis usual recomendada es de 5 mL 3 ó 4 veces al día.

#### Indicación

Tratamiento y prevención del broncoespasmo en pacientes con obstrucción reversible de la vía aérea.

#### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Hipersensibilidad a salbutamol o algún componente de la formulación. Pacientes con arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca coronaria, enfermedad cardíaca isquémica. Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Pacientes con arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca coronaria, enfermedad cardíaca isquémica.



PRODUCTO DISPONIBLE EN







Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## ALPRAZOLAM 0,5mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Alprazolam 0.5 mg.

### Dosificación

Dosis habitual: 0.25 a 0.50 mg, 3 veces al día. Dosis máxima: 4 mg/día.

### Indicación

Ansiedad sola o asociada a depresión, intranquilidad, insomnio, irritabilidad y algunas formas de somatización como colon irritable y dispepsia.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la droga u otra benzodiazepina. Estados psicóticos. Primer trimestre del embarazo.



Producto Bioequivalente  Comprimidos

## BROMAZEPAM 3mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Bromazepam 3 mg.

### Dosificación

Tratamiento ambulatorio: 1.5-3 mg hasta 3 veces al día. Pacientes graves, especialmente los hospitalizados: 6-12 mg 2 ó 3 veces al día.

### Indicación

Ansiedad, tensión psíquica y otros trastornos somáticos o psiquiátricos asociados al síndrome de ansiedad. Las benzodiazepinas están indicadas

únicamente cuando el trastorno es grave, incapacitante o provoca una honda ansiedad.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a las benzodiazepinas. Miastenia gravis. Insuficiencia respiratoria severa. Insuficiencia hepática severa.



Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## CARBAMAZEPINA 200mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Carbamazepina 200 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es: en adultos es de 1 comprimido 2 veces al día.

### Indicación

Tratamiento y profilaxis de crisis epilépticas. Tratamiento del dolor asociado a neuralgia del trigémino.

### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Carbamazepina o a otro componente de la formulación. No administrar a personas que padecen porfiria o antecedentes de depresión de la médula ósea.



Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## CICLOBENZAPRINA HCL 10mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE RECUBIERTOS

### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Cyclobenzaprina Clorhidrato 10 mg.

### Dosificación

Adultos: 10 mg 3 veces al día. La dosis máxima es de 60 mg diarios.

### Indicación

Tratamiento sintomático y coadyuvante, tanto en la terapia de reposo como física, para el alivio del espasmo muscular, asociado a condiciones musculoesqueléticas dolorosas y agudas.

### Contraindicaciones

Alergia a Cyclobenzaprina Clorhidrato o algún otro componente de la fórmula. Hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias y otros desórdenes de bloqueo y conducción cardíaca, durante la recuperación tras un infarto al miocardio. Pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa (moclobemida, selegilina) incluso dentro de los 14 días siguientes terminado el tratamiento.



Producto Bioequivalente  Comprimidos

## CITALOPRAM 20mg

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS BE

### Composición

Cada comprimido contiene: Citalopram (como bromhidrato) 20 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada es 20 mg al día.

### Indicación

Tratamiento de la depresión y prevención de su recurrencia. Ataques de pánico con o sin agorafobia. Trastornos obsesivo-compulsivos.

### Contraindicaciones

Pacientes que están recibiendo un tratamiento con inhibidores de la MAO. Hipersensibilidad al Citalopram o a cualquier componente de la formulación. Si ha consumido un inhibidor de la MAO o tioridazina en las últimas 2 semanas.



### CLONAZEPAM 0,5mg

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Clonazepam 0,5 mg.

#### Dosificación

0.5 mg 1 vez al día, aumentando la dosis gradualmente hasta 2 ó 3 mg diarios que se reparten en 2 dosis parciales diarias..

#### Indicación

Ansiedad generalizada. Fobias. Crisis y trastornos de pánico. Ansiedad asociada a depresión y enfermedad afectiva. Ansiedad asociada a stress y trastornos del sueño. Es utilizado como profiláctico en el manejo del síndrome de Lennox-Gastaut (epilepsia Petit Mal) en ataques

mioclónicos y acinéticos. La droga puede ser usada en el manejo de ataques de ausencia (Petit Mal) en pacientes que no han respondido a succinimidas. El clonazepam también ha sido utilizado en otros ataques refractarios incluyendo ataques parciales con múltiple sintomatología. Puede ser utilizado en algunos pacientes con ataques tónico-clónicos (Grand-Mal).

#### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Clonazepam u otra benzodiazepina, así como a cualquier componente de la fórmula. Miastenia gravis, glaucoma de ángulo estrecho.

Producto Bioequivalente  Comprimidos



### CLONAZEPAM 2mg

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Clonazepam 2 mg.

#### Dosificación

0.5 mg 1 vez al día, aumentando la dosis gradualmente hasta 2 ó 3 mg diarios que se reparten en 2 dosis parciales diarias..

#### Indicación

Ansiedad generalizada. Fobias. Crisis y trastornos de pánico. Ansiedad asociada a depresión y enfermedad afectiva. Ansiedad asociada a stress y trastornos del sueño. Es utilizado como profiláctico en el manejo del síndrome de Lennox-Gastaut (epilepsia Petit Mal) en ataques

mioclónicos y acinéticos. La droga puede ser usada en el manejo de ataques de ausencia (Petit Mal) en pacientes que no han respondido a succinimidas. El clonazepam también ha sido utilizado en otros ataques refractarios incluyendo ataques parciales con múltiple sintomatología. Puede ser utilizado en algunos pacientes con ataques tónico-clónicos (Grand-Mal).

#### Contraindicaciones

Embarazo, lactancia. Alergia a Clonazepam u otra benzodiazepina, así como a cualquier componente de la fórmula. Miastenia gravis, glaucoma de ángulo estrecho.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



### DIAZEPAM 10mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Diazepam 10 mg.

#### Dosificación

Niños: 0.1-0.2 mg/kg/ dosis. Adultos: 5-30 mg/día.

#### Indicación

Estados de ansiedad. Coadyuvante en el tratamiento de síntomas de privación alcohólica. Procesos músculo-espásticos.

#### Contraindicaciones

No administrar en embarazo y lactancia.

Producto Bioequivalente  Comprimidos



### ESCITALOPRAM 10mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

#### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Escitalopram (como oxalato) 10 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos y mayores de 18 años es 10 a 20 mg al día. El tratamiento no debiera superar las 8 semanas. Periodos mayores de tiempo deberán ser supervisados estrictamente por su Médico, quien deberá evaluar la dosis y el efecto farmacológico. La dosis puede ser consumida con o sin alimentos.

#### Indicación

Antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina.

#### Contraindicaciones

Si Ud. está en tratamiento con Inhibidores de la Mono amino Oxidasa, incluso si ha dejado de tomarlos antes de 14 días. En caso de hipersensibilidad al Escitalopram o a cualquier componente de la formulación.

Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos



### FLUOXETINA 20mg

ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS BE

#### Composición

Cada comprimido contiene: Fluoxetina (como Clorhidrato) 20 mg.

#### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 20 mg una vez al día.

#### Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a Fluoxetina o cualquier componente de la formulación. Embarazo y lactancia.

#### Indicación

Tratamiento de la depresión con o sin ansiedad asociada, en desórdenes obsesivo-compulsivos y de la bulimia nerviosa.

Producto Bioequivalente  Comprimidos

PRODUCTO DISPONIBLE EN





**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## SERTRALINA 100/50mg

ENVASES CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Sertralina (como clorhidrato) 100/50 mg.

### Dosificación

Dosis usual recomendada en adultos es de 50 - 100 mg/día.

### Indicación

Tratamiento de los síntomas de depresión. Tratamiento de desórdenes obsesivo-compulsivos. Ataques de pánico con o sin agorafobia.

### Contraindicaciones

Pacientes que presenten hipersensibilidad a Sertralina. Pacientes que han recibido terapia (2 semanas) con Inhibidores de la Mono Amino Oxidasa.



**B** Producto Bioequivalente  Comprimidos recubiertos

PRODUCTO DISPONIBLE EN



## ZOPICLONA 7,5mg

ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BE

### Composición

Cada comprimido recubierto contiene: Zopiclona 7.5 mg.

### Dosificación

En pacientes adultos la dosis es de 7,5 mg a la hora de acostarse. En pacientes geriátricos, pacientes con enfermedad de la función hepática, o en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica la dosis inicial debe ser reducida a la mitad, ya que el clearance puede ser prolongado, y por lo tanto aumentar el potencial de los efectos adversos.

### Indicación

Tratamiento a corto plazo del insomnio. caracterizado por la

dificultad que tiene el paciente en quedarse dormido, despertar frecuente en la noche o despertar temprano en la mañana. Cuando comienzan los disturbios al dormir, se pueden presentar síntomas de desorden físico o psiquiátrico, por lo tanto, el paciente debe ser evaluado farmacológicamente antes de iniciar el tratamiento con zopiclona.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo. La zopiclona está contraindicado en insuficiencia respiratoria grave. No se recomienda su empleo en niños menores de 15 años.







MiLab  
Calidad para ti